

Rg Av 2.3



CATALOGUE

DES VÉGÉTAUX DE TOUS GENRES, CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES

Du Sieur AUDIBERT, Miné,...

MARCHAND GRAINETIER ET PÉPINIÈRISTE;

A TONELLE,

PRÈS TARASCON (DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE)



A TARASCON,

DE L'IMPRIMERIE D'ÉLISÉE AUBANEL, RUE MADAME.

1817.

DANS CE CATALOGUE.

Arbres fruitiers.

Arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.

Plantes d'orangerie et de serre.

Plantes vivaces pour l'ornement des jardins.

Plantes bulbeuses et oignons à sleurs.

Graines de plantes d'ornement. Graines de plantes économiques....

1,º Céreales.

Racines nourrissantes. Herbages légumiers.

Plantes potagères: Eleurs légumières.

Fruits dégumiers.

Semences légumieres.

3.º Plantes aromatiques.

4.º Plantes oleiseres.

5.º Plantes textilles.

6.º Plantes teintoriales.

7.º Plantes à fourrage.

8.º Plantes propres à divers Arts et usages.

EXPLICATION DES SIGNES ET ABBRÉVIATIONS.

† Indique les Arbres et Arbustes toujours verts ou à feuilles persistantes.

— Plantes d'agrement que l'on peut employer pour bordures.

— Un doute sur le nom de l'espèce.

G. — Arbres et arbuste dout on peut fournir des graines et des jeunes plantes de cemis

Cotures.

S — Especes sarmenteuses propres à garnir les pavillons et tonnelles.

Les différents végétaux qui ne peuvent être cultivés en pleine terre que dans le midi de la France.

Les divers végétaux d'orangerie que l'on peut, au moyen d'abris, livrer à la pleine terre dans le midi de la France.

C. — Arbustes.

A. — Arbres.

B. — Arbrisseaux.

C. — Arbustes.

(pl. t.) pleine terre; (or.) d'orangerie; (s.) de serre; (s. ch.) (Lang.) en Languedoc; (Prov.) en Provence; (Mat.) Maturité de serre chaude; (Espag.) en Espagne; (Ital.) en Italie; = Mûrit; (nov. sp.) Nova species; (vulg.) Vulgairement.

Les varietés sont indiquées par les lettres a, b, c, d, etc. Pour ne, pas répéter le nom générique des espèces, j'ai employé un — et le me suis servi du em pour liésignes les synonimes en les sabrothère les dus des lastres; dans les Arbres, fruitiers les noms français sont en romain; les noms latins et ceux des auteurs sont en italique; c'est tout le contraire dans les autres parties du catalogue. parties du catalogue.

AVERTISSEMENT.

LE CATALOGUE que je publie aujourd'hui contient la nomenclature exacte des Arbres; Plantes ou Graines, tant exotiques qu'indigènes, que les Propriétaires et les Amateurs peuvent se procurer à mon Établissement : je l'ai distribué de manière à ce que chacun puisse sacilement y choisir les objets qui seront à sa convenance.

Pour éviter des erreurs ou des doubles emplois dans les demandes, j'ai ajouté aux noms adoptés, les différens synonymes qui y correspondent d'après divers Auteurs et d'après les cultivateurs Français; je pense que ce travail ne sera pas sans utilité.

Mon Établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait en ce genre dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués. Placé entre les 22.º degrés, 19 m. de longitude, et 43.º, 48 m. de latitude; il jouit d'une température telle que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du Nord, y prospèrent en pleine terre, tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil par des abris contraires, n'y offrent pas une moins belle végétation. On peut donc regarder mon Établissement comme un point d'acclimatation pour les plantes du Nord et pour celles du Midi; sa proximité des Ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, etc., etc. Sa position topographique entre les routes de Nîmes et d'Avignon, offre les mêmes facilités par terre pour tous les points de la France, et des expéditions faites à Hambourg, Leipsick et autres Villes du Nord, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter aux arbres et aux plantes, des voyages d'un plus long cours.

Une école fruitière (collection des différentes variétés d'arbres fruitiers, indiquées au présent Catalogue), réunit un individu de chacune de ces variétés, dans un espace de terrein que j'ai consacré à cet usage. C'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté, puis distribuées sur les différens sujets de la Pépinière, et ensuite soi-gneusement enregistrées. Cette école devient chaque jour plus intéressante pour les

Amateurs; elle est, je crois, la plus complete de toutes celles qui existent.

Pour donner aux Propriétaires une idée du port ou des avantages de chaque qualité d'arbres, arbrisseaux ou arbustes que l'on cultive en France en pleine terre, je les ai (depuis 8 ans) réunis dans un même quarré et distribués par classes d'après Linné. Ce dépôt, que je considère comme une école forestière, et qui, à ce titre, intéresse le botaniste et l'agriculteur, m'offre aussi divers moyens pour multiplier les dif-

férens végétaux qu'il renserme.

Plusieurs personnes ont paru désirer que je joignisse au Catalogue des végétaux que je cultive, le prix de chaque article; mais elles n'en ont pas senti l'inconvénient. Telle plante, d'abord fort rare et fort chère, baisse considérablement de valeur par la facilité que l'on a à la multiplier, et telle autre, très-abondante et de peu de valeur, enchérit tout-à-coup par l'intemperie des saisons. Il faudroit donc un nouveau Catalogue chaque année pour suivre toutes ces variations, et celui que je présente n'est pas de nature à pouvoir être réimprimé à des époques si rapprochées; je me borne à publier, tous les ans, un supplément des espèces nouvellement acquises. Cependant, pour satisfaire, en quelque sorte et autant qu'il est en moi, les désirs de mes

Digitized by Google

Br. Jan Galler

correspondans; j'ai fixé, mais seulement d'une manière aproximative, la valeur de chaque objet, c'est-à-dire, le plus bas et le plus haut prix auquel on pourra les obtenir.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention, persuadé que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire, que le prix d'un plant qui trompe son attente et qu'il est obligé de remplacer; cependant comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, une espèce peut être épuisée, je demande, pour éviter et nouveaux ports de lettres et retards dans l'expédition, d'être autorisé à remplacer par des espèces de fruits analogues et de même saison, les qualités dont les sujets ne seraient pas d'assez belle venue: tout cela sans abus et me conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien m'accorder leur confiance; les autres espèces d'arbres et plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

Je ne saurois assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes, moyennes, basses tiges ou en quenouilles, les uns ne pouvant servir au même usage que les autres, et de faire connoître si on veut les arbres greffés sur francs ou autrement; la nature du terrein exigeant impérieusement cette distinction.

J'offre aux propriétaires qui croiroient ne pas avoir assez de connoissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits, de leur en faire moi-même le choix, d'après les vues et les goûts qu'ils m'indiqueront.

J'offre enfin à ceux qui auroient des jardins à créer et qui ne seroient pas éloignés de plus de 25 lieues de mon Établissement, de leur fournir les plants nécessaires, des desseins analogues aux différens sites, et de les leur faire planter à des prix modérés et convenus en bloc.

Un port de lettre est peu de chose, mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup; l'on est, en conséquence, prié d'affranchir celles que l'on me fera l'honneur de m'adresser, et quant au montant des envois que je fais, j'ai l'habitude de me prévaloir par des traîtes à fur et mesure des expéditions. Les personnes à qui ce mode ne conviendroit point, sont priées de m'en aviser et je suivrai pour les encaissemens telle autre voie qu'elles croiront préférable.

BOTANOPHILIS.

Summă indulgentiă mîhi opus est pro tempore brevi in hoc catalogo posito et librorum botanicorum inopiă. Auctorum judicio stare mihi necesse fuit ergă nonnulla synonyma allata; ideo dolui quod mihi copia non esset exempla cum archetypo componendi; è plurimis vero operibus, fidem libris eruditione perfectă solum modo habui, et mediocribus abstinui.

Botanicos gallicos externosque rogo et oro, quos seminum et plantarum permutationes juvarent, ut desiderata ad me mittant; petita exsequi mihi jucundissimum erit; quos etiam Botanices studium ad Provinciæ campos invisendos inducet, ad collectanea mea invito; ut herbarium eorum augeam sive plantis indigenis aut exoticis meis, usque eo felicem me futurum esse spero.

Herbarium meum amplificandi facultatem ademerunt occupationes quibus implicatus sum; sed magna mihi spes est in fratre sedulo et actuoso, quo adjuvante, faciam ut septentrionales botanici australium plantarum indagationis, in hâc regione, juxtà meam potes-

tatem, participes fiant.

CATALOGUE

DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES, CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES

Qu Sieur AUDIBERT, Siné,

MARCHAND GRAINETIER ET PÉPINIÈRISTE;

A TONELLE,

PRÈS TARASCON (DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE)

FRUITIERS.

ARRICOTIERS.

ABRICOTIERS.	Abricotier de Portugal. Duh. = Roy. = Armeniaca lusitanica. Duna Cours. (Mat. Juillet.)
wwww	— De Provence. Duh. (Mat. Fin-Juin.) — Rouge. = A. Angoumois, Duh. = Roq. (Mat. Fin-Juin.)
Abricotier d'Alexandrie. Duh. ed. nov. (Mat. Mi-Juin.) d'Alexandrie, petit tardif. (Mat. Juillet.) Albergier. Duh. ed. nov. = Alberge. = A. Alberge Duh. = Armeniaca dulcis. H. P. (Mat. Mi-Juillet.) Albergier de Tours. F: B.	ABRICOTIERS, hautes tiges
 Blanc musqué, de Provence. (Mat. Mi-Juillet.) De Briançon. = Prunier de Briançon. Duh. ed. nov. = Armeniaca brigantiaca. Pers. = Prunus brigantiaca. Vill. 	Amandier commun. = Am. cultivé. = Amygdalus communis. Lina - A truit doux. = A. duleis.
 Commun. Duk. = Armeniaca vulgaris. Lam. = Prunus armeniaca. Lin. (Mat. Juillet.) C. à feuilles panachées. = A. V. variegata. (Mat. Juillet.) Gros précoce. A. de la S.t Jean. = A. gros d'Alexandrie. Prov. = A. de la S.t Jean rouge. Lang. (Mat. Juin.) Hâtif. Duh. ed. nov. = A. précoce. = A. hâtif musqué. Duh. = Abricotin. Vulg. armeniaca precox. (Mat. Juin.) De Hollande. = A. Amande-Aveline. Duh. ed. nov. = A. de Breda. F. B. (Mat. Fin-Juin.) Noir. Duh ed. nov. = A. de Bruxelles. Dum. Cours. = A. du Pape. = A. Violet. = Armeniaca davycarpa. Pers. = Prunus davycarpa. Ehrh. = Armeniaca atro-purpurea. Duh. ed. 	Aberame donce naturelle. Boutière. Farisienne. i flots douce. Grosse verte. Petite verte. De la race. Materonne. Ronde mi-fiue. Ronde dure. Balotte. Grosse à confire donce.
nov. = A. nigra. H. P. (Mat. Juillet.) A. feuilles de pêcher. = Armenia atro-purpurea persicosfolia. Duh. ed. nov. (Mat. Fin-Juillet.) Pêche, Duh. ed. nov. = A. de Piémont. = A. de Nancy, Duh. = A. de Nuremberg ou de Wurtemberg. = Armeniaca persicoides. Pers. A. macrocarpa. H. P. Var. à très-gros fruit. (Mat. Juillet) , 1 f. 25.6.	A gros fruits amers. Très-grosses amères à confire. Amande aberame, demi-amère. Afrayilis.

	4)
Amandier sultane. — Amande princesse. = A. dcs dames. = Abiélam. Prov. — Amande pistache. — A noyau tendre amer. ! — De Corse. = Grosse à coque tendre. Amandier pèche, = Amygdalus hybrida. Pers de 75 c. à 1 f. — Argenté. = A. d'Orient. = A. orientalis. L.	Cerisier bigarrautier. = Cerasus Bigarella. = C. Duracina. D. C. — Petit Bigarreau blanc hâtif. Duh. ed. nov. (Mat. Mi-Juin.) — Gros bigarreau blanc. Duh. ed. nov. = Bigarreautier à gros fruit blanc. Duh. (Mat. c. Juillet.) — Bigarreau cœur de pigeon. = Gros bigarreau hâtif. Duh. ed. (Mat. Mi-Juin.) — Bigarreau couleur de chair. Duh. ed. nov. (Mat. Juillet.)
= A. argentea. Lam. de 75 c. à 1 f Nain. = A. de Perse. = A. Nana. Pall. de 75 c. 1 f. 25c.	- Bigarreau commun. = Belle de Rocmont. = Cœur de pigeon. Duh. (Mat. Juillet.)
AMANDIER, Commun de 40 à 60 f. le l' — A gros fruits de 50 à 75 f. id. — à coque tendre de 50 à 80 f. id. AZÉROLIERS.	 Blgarreau hâtif de Bâle. = Richemer. F. B. (Mat. Mai.) Bigarreau de May. F. B. (Mat. Mai.) Bigarreau noir. = C. de Norwège. Duh. ed. nov. (c. Juillet.) Bigarreau noir tardif ou de Lory. F. B. (Mat. Août.) Bigarreau rouge (gros.) Duh. ed. nov. (Mat. Juillet-Aout.) Petit bigarreau rouge. Duh. ed. nov. = Cœuret. = B. à fruis rouge, hâtif. Duh. (Mat. Mi-Juin.)
MANA.	- Bigarreau tardif. d'Hildesheim. F. B. (Mat. Août.)
Azérolier à gros fruit rouge. = Nessier zzérole. = Azérole. = Epine d'Espagne. = Cratægus aqarolus. Lin. = Mespilus aqarolus. Lam. = Pyrus aqarolus. Scop de 60 à 75 c à fruit blanc. = A. à fruit jaune. = A. à fruit d'un blanc jaunâtre. Duh. ed. nov. (Mat. 7.bre.) de 75 c. à 1 f de Montpellier. = A. sauvage. = (Poumettes de duos closses. Lang:) = Mespilus aronia	- Guigner. = Gruffion. Vulg. Prov. = Cerasus juliana. D. C. = Prunus Cerasus juliana. Lina Guigne blanche. Duh. ed. nov. = Guigner à gros fruit blanc. Duh. = C. cayette. Prov. (Mat. Juin.) - Guigne Jaune. Christ. (Mat. Juin.) - Guigne écarlatte. F. B. (Mat. Juin.) - Guigne de Montfrin. = Cerise de Montfrin. Lang. (C. Juin.) - Guigne noire. Duh. (Mat. c. de Juin.) - Guigne noire luisante. Duh. ed. nov. = G. à gros fruit luisant. Duh Guigne polive. = Cerise de Besson. Lang. (Mat. Mi-Juin.) - Guigne plive. = Cerise de Besson. Lang. (Mat. Mi-Juin.) - Guigne piquante. = G. à piquet. Duh.ed. nov. = C. pointue. Lang.
CERISIERS.	Guigne précoce = G. de la Pentecôte. Duh. ed. nov. = Cerisier de Barbentane. Vulg. (Mat. Fin-Mai.)
Cérisier Vilgaire. = Griottier. = Cerasus vulgaris. Mill. = C. caproniana. D. C. = Prunus cerasus. Lin = C. sativa. Tourn. belle de Choisy. = C. doucette. Duh. ed. nov. = Griottier de Palembre. (Mat. Juillet.) blanche de Bourges. Prov. (Mat. mi-juin) à bouquet. Duh. = Cerasus polygyna. (Mat. mi Juin.) brune de Bruxelles. F. B. (Mat. Juillet.) à courte queue. = Gobet. Le Berr. (Mat. c. Juillet.) double natte. Christ. (Mat. c. Juin.) à fruit ambré. = Guindoux blanc. Duh. ed. nov. (M. Juillet.) Griotte d'Allemagne. = Griotte de chaux. Duh. = Cérise de M. le Comte de S.t Maur. F. B. (Mat. c. Juillet.) Griotte d'Espagne: Mayer. = Le Berr. (Mat. Mi-Juin.) Griotte d'Espagne: Mayer. = Chery. (Mi-Juin.) Griotte d'Altaina. = Cérisier à petit fruit noir. Duh. (Juillet.) Griotte royale. Duh. ed. nov. = Cherry-duke Duh. = Cerasus	Guigner de quatre à la livre. = Guigner à feuilles de tabac. Duh. ed.nov. = Bigarreau tardif. = Cerasus decumana. De Launay. = C. nicotanœfolia. Pall. (Mat. Juillet.) de 1 f. 50 c. à 3 f. Guigne rouge tardive. Duh. = G. de fer. = G. de S.t Gilles. (Mat. 7.bre.) Guigner à rameaux pendants de 1 f. à 2 f. Cerisier à feuilles luisantes. Duh. ed. nov. = C. de Siberie. = Cerasus chamæcerasus. Jacq. Prunus cerasus pumilla. Lin. (Mat. 7.bre.) de 1 f. à 2 f. C. — de la Toussaint. = Ceraseus semperforeus. (Mat. 7.bre
suavissima. H. P. (Mat. c. Juillet.) Griotte royale, hative. = May-Duke. = Cerise d'Angleterre.	WWW
hâtive. Mayer. (Mat. Fin-Mai.) gros gobet. = Gobet à courte queue. = Cerise de Kent. Duh. ed. nov. = Montmorency. à gros fruit. Duh. = Cerisier con- lard. Vulg. (Mat. Fin-Juin. de Hollande. Duh. ed. nov. = C. Coulard. Duh. (Mat. Mi-Juin.) Var. à feuille de balsamine. marasquin. Duh. ed. nov. = Griottier marasquin. (Mat. Juillet.) de Montmorency, Duh. = Cerasus ruberrima. H. P. (Mat.	Cognassier commun. = Cydonia vulgaris. = Pyrus cydonia. Lin. i fruit en pomme. = Comg pomme. = Cydonia muliformis. i fruit en poire. = Coin poire. = C. ablongu. i petit fruit. de Portugal. = Cydonia lusitanica. de la Chine. = Cydonia sinensis. CHATAIGNERS.
c. Juillet.) nain à fruit rond. Duh. = Cerasus nana. H. P. (Mi-Mai.)	Chataigner. == Fagus castanea, == Castanea vesca. Lam.
 nouvelle d'Angleterre. F. B. = Grosse cerise rouge pâle. Duh. (Mat. Fin-Juin.) à noyau tendre. Duh. (Mat. Fin-Juin.) d'Ostheim. Christ F. B. (Mat. Mi-Juillet.) rouge tardive. Prov. (Mat. Août.) de Soissons. F. B. (Mat. Juillet.) à trochet. Duh. = C. trés-fertile. (Mat. Fin-Juin.) turkine. Christ. (Mat. Juillet.) Cerisier merisier à gros fruit noir. = Grosse merise noire. Duh. = Prunus avium. Lin. = Cerasus silvestris. J. B. = C. nigra. 	- ordinaire. — du Dauphiné. — du Dauphiné. — du Dauphiné. — d'Ambrai. — d'Agen. — d'Amérique. — Chincapin. — Fagus pumilla. Liu. — Castanea pumila. Lam: — de 5 à 8 f. FIGUIERS.
Mill. = C. avium. D. C. M. — a fruit blanc. Duh. ed. nov.	Figuier commun. == Ficus carica. L. 50 c. — caprifiguier. == F. sauvage. == Ficus c. sylvestris.
M. a fruit jaune. Duh. éd. nov.	— sulavé = Ficas c. sativa. — aubique

7!	5)
Figue aubique noire. = F. grosse violette longue. Duh. ed. nov. = Roz. = F. longane. de Suff blanche (grosse.) Duh. ed. nov. = F. blanche commune. Prov.	
— bourgeassote blanche. Lang. — bourgeassote grise. — F. de Bellegarde.	— épineux. — G. à maquerau. — Epine d'Angleterre. — Ribes uva crispa. L. — R. grossularia. L.
— bourgeassote noire. — F. barnissote. — F. bourjassoto. Prov.	á fruit jaune. 20 G. á fruit violet. 40
clémentine. de Suff. coucourelle brune. Duh. ed. nov.	— 40 variétés de groseillers d'Angleterre, à fruits verts, jaunes, blancs et violets assortis.
— concourelle gavote. de Suff. — datte. Lang.	— à fruit noir. — Cassis. — Poivrier. — Ribes nigrum. Lin à 2 f. 40 c. la douraine.
— franque paillarde. Lang. — de Jérusalem. Lang.	— des Alpes à fruit doux. — Ribes alpinum. L. (mâle et femelle) 3 f. la douzaine.
— de Lipari. — F. petite blanche ronde. Roq. — F. blanquette. — F. esquillarelle. Prov. — de Marseille. Duh. ed. nov. — F. marseilleso. Prov.	JUJUBIERS.
— napolitaine de Suff. — F. aubique blanche. Lang. — negrotte. Lang. — F. negrone. Duh. ed. nov.	AAAAA
 Obil de perdrix. Prov. peau dure. = F. verte brune. Roz. = Troumpe-cassaire. Prov. pied de bœnf. Labrousse. 	Jujubier cultivé. = J. commun. = Chinchourlier. = Ziziphus vulgaris. Pers. = Z. sativa. Desf, = Rhamnus ziziphus.
— pistache. Lang. — poulette. Labr. (La meilleure de toutes.)	Lin. de 75 c. à 1 f. 50 c. de 7 à 2 f. de 7 à 2 f.
recousse noire. de Suff. rose. = F. peyrouno. de Suff. = F. rose-blanche. Duh. ed. nov. = F. rousse. Roz.	MURIERS.
- rougette. Labrouss servantine. = cordélière. Duh. ed. nov. = F. grise. = F. de la St. Jean. Lang.	AAAAA
- vernissenque. = F. petite bourgeasscre. = F. martinenque.	Murier blanc. = Morus alba. de 1 à 2 f. 75 c.
— de Versailles. — Figue royale. Dun. ed. nov. — Figue d'or. ProvLang.	Var. A fruit blanc. Romain. — feuille romaine. d grandes feuilles. — Grosse reine. —
grosse verte. grosse verdale. Lab. petite verte. petite verdale. Lang.	Feuille d'Espagne. a feuille longue.—Langue de bœuf. Lang.
- violette Duh F. mouissoune F. perruquine. Lang. PRIX DES FIGUIERS, de 50 c. à 1 f. 25 c.	d'Italie. — M. feuilles roses. — Morus italica. — M. rosea. — à fruit rouge. — Morus rubra. L. de 1 f. 50. à 2 f. Var. du Canada à larges feuilles. — M. Canadensis. 2 f.
FRAM BOISIERS.	noir. = Mûrier de présent = Mûrier des dames. = Morus nigra. (Mâle et femelle.) de 2 à 6 f. noir à feuille de figuier?
AARAAA	de la Chine femelle. = Broussonetia papyrifera. L'Herit. = Morus papyrifera. Lin. de 1 50 c. à 3 f.
Framboisier commun. = Rubus idaus. de 3 à 5. f. °10. — des Alpes. = F. de tous les mois. = Rubus J. serotinus. de 4 à 6 f. °10.	NEFFLIERS.
- à fruit blanc. = à fruit jaune. 50 c. pièce couleur de chair. 75 c. pièce.	
GRENADIERS.	Nefflier d'Allemagne. — Mespilus germanica. — à gros fruit. — Nefflier de Hollande. Mespilus g. maxima. de 50 à 75 c.
	sans pepin. = Mespilus abortiva. 75 a petit fruit. = Mespilus g. minos. 50
Grenadier commun. — Punica granatum, — à fruit doux. de 40 à 50 c. — à fruit aigre. 40	NOISETIERS.
— à fruit mi-aigre. — Grenadier murce. Vulg. 40 — de Malte à gros grains. — punica melitensis. 75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- à fleurs blanches G. à fleur d'un blanc jaunâtre Punica alba P. flava. de 2 f. 3 f nain des Antilles Punica nana P. semperflorens P.	- a petits fruits. = Noisetier des bois. = Coryllus silvestris. 1 f. 50 c. la douz.
americana. de 2 f. à 4 f. Le 100 replants de 2 ans de Grenadier commun, de 8 à 15 f.	— à gros fruit. = C. maxima. 5 f. la douz!
GROSEILLERS.	— à fruit rouge. = Coryllus rubra. de 1 à 1 f. 50 c. — de Bizance. = Noisetier de Constantinople. = C. Colurna. = C. bizantina. de 1 f. 50 à 2 f.
MM	- d'Amérique, = C. rostrata.
Groseiller à grappes rouges. = Ribes rubrum. L. = R. officinarum.	·
Dum. Cours. a grappes blanches ou jaunes, G. perlé. Ribes album. H. P. de 25 à 50 c.	
H. P. , de 15 à 50 c.	i

WWW

Noyer Commun. = Juglans regia. Lin. . . de 75 c. à 2 f. à fruits ronds. à fruits allongés. à fruits anguleux. = Juglans angulosa. à coque tendre. = noix Mésange = J. fragilis. 5 f. à Bros fruit. — noix de jauge. — noix à gands. — Juglans ma-xima. — J. macrocarpa. — J. caballina. de 3 à 5 f. Tardif. = N. de la Saint Jean. = N. des Miracles. = Juglans serotina. H. P. de 1 f. 25 c. à 2 f.

OLIVIERS.

MANA

Olivier d'Europe. = Olea europæa. Lin. (suivant la force. de 1 à 4 f. d'Europe sauvage. = Aulivastre. = Aulivier de fer. Prov. Olea silvestris. Duh. ed. nov. - Amygdalin. Duh. ed. nov.—Amenlaudo.— Raymet-Bécu. Prov. Olea sativa major angulosa. Garid. 5. Blanquet. = Blacau. = O. a fruit blanc. Duh. ed. nov. = O. latiore folio fructu albo. Garid. 10. - O. Bouquetier Lang. == Boutellian. == Rouget. == Rapugnier. = Caion à grappes. == Boutignan. Olea racemosa. Gouan. Olea minor rotunda racemosa. Garid. 9 -O. Burruguet. Prov. = Prouvensaleto. Lang. - De chien. = O. à bec. Duh. ed. nov. = O. bécu. Prov. = O. a fruit doux? Duh. ed. nov. -O.Cournau. -O. pleureur. Duh. ed. nov. -O. de grasse Bernard. = Tagliasca. Gênes. = O. Carniomorpha. Gouan. = media oblonga fructu cornis. Garid. 6. O. Long-poil. Prov.=Lang. - O. Moureau. Lang. = O. hâtif. Duh. ed. nov. = O. Precox. Gouan. = O. media rotunda precex. Garid. 8. O. Petite noire. = Negreto. Prov. - O. à petit. fruit panaché Duh. ed. nov. = O. pigale. = pigau = Olea variegata. Gouan. O. a fruit arrondi. Duh. ed. nov. = gros redounau. Prov. = ampoulau. Lang. — Olea spharica. Gouan.

O. à petit fruit rond. — aglandaü. — Caïone.— petit redounau. - Picholino. — O. à petit fruit oblong. Dnh ed. nov. — Couyasso — Couyas. Lang. — Pignola. Genes. — Olea oblonga. Gouan. = 0. fructu oblonga. Garid. 1. = Orchites? columnelle. De salon. — Plant de salon. Duh. ed. nov. — Salounen. Prov.

ORANGERS.

- Vermillau.

Duh. ed. nov.

MANA

(prix. de 1 f. 50 à 100. fr. Citronier orange = Citrus aurantium. O. du Portugal. = Citrus aurantium lusitanicum. Duh. ed. nov. - O. a fruit rouge. = Orange de Malte. = O. de grenade. = =Citrus aurantium hierocunthicum. Duh. ed. nov.= cruentum. = arango sanguigno Ital. = = aur. philippinum Ferr. Hesp. - O. riche depouille. = C. aurantium multiflorum. Duh. ed. nov. O. Turc. = O. à feuille panachée. = Culotte de suisse = Citrus aurantium fructu variegata. Duh. ed. nov. Citrouier big radier = Citrus bigaradia. - Bigarradier à fruit coniculé. = Hermaphrodite. C. B. Corniculata. = aurantium hermaphroditum, sive corniculatum. Ferr. llesp. = Arango cornuto, è hermaphrodito. volc. hesp. C. Bigarradier bouquetier. = Citrus bigaradia crispa Duh ed. nov. - C. Bigarradier à fleurs doubles. - Citrus bigaradia flore duplici.

Citronier Bigaradier petit chinois. — C. Bigaradia sinensis Duh.
ed. nov. — Auranțium sinense. — chinotti. Ital. C. Big. à feuille de mirthe. — Chinois nain. — C. B. myrtifolia.

Duh. ed. nov.

Limonier .- citrus limonium. Duh. ed. nov. - Citrus medica. Lin == Limonier.

C. Limonier ordinaire. = Citrus limonium vulgare. Duh. ed. nov. - C. Limonier à fruit aigre. — Citrus limonium acre. Duh. ed. nov. - C. Poncire. = Citrus limonium ponzinum. Duh. ed. nov.

- C. Bergamotte-perette = C. Berg. peretta. Duh. ed. nov. - C. Cédratier à gros fruit Duh. ed. nov. = Cédrat. = Cedrone. Ital. = Citrus medica. L.

C. Limettier. = Citrus limetta. Duh. ed. nov.

— C. Limonier à fruit doux. — Lima dulcis.

(6)

- C. Limetier-bergamotte. = Citrus limetta bergamia. D. ed. n. - C. Mela-rosa. = Citrus limetta mela-rosa. Duh. ed. nov.

- C. Pampelmous. = chaddock. = schaddeck: = Citrus de cumana. Lin.

- C. Herisson. = Citrus histrix. D. C. de 20. à 100. fs

PECHERS.

MMM

Pecher commun. = Persica vulgaris - Mill. = amygdalus persica. Lin.

Admirable belle de vitry. Duh. ed. nov. Belle Bausse. Admirable tardive. Duh. cd. nov. (Mat. Septembre.) Alberge jaune précoce. = admirable-jaune. = pavie jaune (Mat. Juillet.) Alberge jaune tardive. == Pavie de cavaillon. = = melocoton jaune. = grand myrecoton jaune. (M. Sept.)
Alberge blanche tardive. (Mat. c. Octobre.) - Avant-pêche jaune. — Saint Laurent jaune. (Mat. Juillet.)
- Avant-pêche blanche. (Juin.)
- Id. Id. pavie (Juin.) Avant-peche rouge. = Saint Laurent rouge. (Mat. Juin.) Avant-précoce, pavie. Prov. (Mat. Juin.) Belle chevreuse. (Mat. Août.) Belle de Beaucaire. (Juillet.)
Belle-garde ou Galante. — Galande. (Août.) Belle de tillemont. (Septembre.) Blanche tardive à confire (Septembre.) Brugnon jaune, (Août.) Brugnon violet musqué, Mayer. (Août.)
Bourdine. Bourdine. Narbonne. Duh. (Mat. Août.) Cardinale de Fustemberg. (Fin. Août.) Chanchelière. Duh. (Août.) Chevreuse hâtive. Duh. (Août.) Chevreuse hâtive d'Italie. (Août.) Chevreuse tardive. Duh. = Fausse mignone. = mal-nommée. Double de troyes. = petite mignone. (Mat. Août) De Favier. Prov. (Mat. Août.) - à fleurs doubles. (prix 50 c. à 1 fr.) Grosse mignone. = veloutée de Merlet. = mignone veloutée. Hâtive des Tours, Prov. (Juin.)

- d'Ispahan. Thouin. (Type primitif.) (Mat. Septembre.)

- Jaune. — Alberge jaune. Duh. — petite roussane. — Saint Laurent jaune.

Jaune lisse. = roussane tardive. Duh. (Septembre.) Incomparable en beauté. F. B. (Aost.) Magdelaine blanche. = montagne blanche. Duh. (Août.)
Mugdelaine de Bollwiller. F. B. (Mat. Août.) Magdelaine rouge, = Magd. de Curson. = Paysanne, Duh, Magdelaine rouge tardive. = Magd. a petites fleurs. (fin Août.) - De Malte. — Belle pêche de Paris. (Mat. Aout.)

- Monstrueuse. — Pavie rouge de Pompone. — pav. camus.

— grand persèque rouge. — grand melocoton. (Septembre et Octobre.) - Montagne précoce. (la grosse) F. B. (Août.) - Montfrin. F. B. (Septembre.) - Nain d'Orléans. — Persica pumilla. prix. de 75 c. à 1 f. 2006.

(Mat. Septembre.)

7 .	
	7)
Pechers. Nivette hative. Prov. (Mat. Juillet.) — Nivette. == veloutée tardive. (Mat. Septembre.)	Poiriers Bezi de Chaumontel. == Beurré d'hiver. Duh. ed. nov. (Décembre et Mars.)
— Pavie de Jalaguier. = pavie à têtons. (Mat. Septembre.)	- d'Héry. Duh. (Octobre et Décembre.)
Pavie de la Magdelaine première saison. (Juillet.)	— de Montigny. Duh. (Septembre et Octobre.)
Id. Id. deuxième saison. (mi-Août.)	de la Motte. Duh. (Octobre et Novembre.)
Id. à gros fruit dont le noyeau se partage. (Mi-Août.) Pavie de Newington. F. B. (Octobre.)	— Beurré d'Angleterre. — Angleterre. Duh. (Septembre.) — de Bollwiller. F. B. (Avril et Mai.)
Persique. = gros persèque. Duh. (Octobre.)	- Capiomont. Van-mons.
Pourprée hative à grandes fleurs, Duh. (Juillet.)	— Colmart de printems. Van-mons
Pourprée vineuse. Ďuh. (Août.) Ronde de Vallabregues. Lang. (Mat. Août.)	C. d'automné. Van-mous. — blanc. — Doyenné. — Saint Michel. — bonne - ente.
Ronde (grosse.) d'Août. Prov.	Duh. = Poire signore. = de monsieur. = de neige.
Pourprée tardive (Septembre.)	à courte queue. = Citron de Septembre. = Pyrus
Rossane. (Mat. Septembre.)	liquescens. H. P.
Sanguinole ou Betteravo. — Druselle. Duh. (Septembre.) Id. à chair adhérente (Mat. Octobre et Novembre.)	— Diel. Van-mons. — Fourcroy. Van-mons.
Teint doux. Duh. (Septembre.)	Gris. Duh. (Septembre.)
Téton de Vénus. (Août et Septembre.)	Ardempont. Duh. ed. nov.
Transparente ronde. (Mat. Septembre.)	Ardempont de Printems. Van-mons.
Violette hâtive. (La petite.) (Août.) Violette hâtive. (La grosse.) (Août.)	Romain. Christ. (fin Septembre.)
restrict manyer (Las grosses) (Route)	Thouin. Van-mons.
mAnnana tana da ma	Blanquette à longue queue. Duh. (Juillet.)
PECHERS, hautes tiges, greffés sur francs ou sur amandiers. 60 c. Mi-tiges Id. 1d. 50 c.	Grosse blanquette. Duh. (Juillet.)
— Mi-tiges Id. Id. 50 c. — Basses-tiges. Id. Id. 40 c.	Petite blanquette. Poire à la perle Petit roi louis, Duh. Blanquette à houquet. B. de la St. Jean. Prov. (Juin.)
- Hautes et basses tiges, greffé sur prunier 75 c. à 1 fr.	- Grosse blanquette ronde. Duh. (Juillet:)
	Bonchreinen d'Auch. Duh. ed. nov. = Pyrus pompeiana. H. P.
POIRIERS.	Bonchrétien d'Automne. Prov. (Octobre et Novembre)
	d'Espagne. Duh. (Novembre et Décembre.) d'été = Gratioli. Duh. = Duchesse. (Juillet et Aoft)
MMM.	- d'été musqué. (Juillet.)
,95555	— d'hiver. Duh. = Poire d'Angoisse. (Février et Mars.)
POIRIERS Ah! mon Dieu! P. d'ah! mon Dieu. Duh. (fin Août.)	— Turc. = Poire Turque. Duh. ed. nov. — Bourdon musqué. Duh. (Juillet.)
	- Brunnen - Birne. F. B. (Octobre.)
- Amiré Joannet. = Poire de St. Jean. Duh. = Trompe valet.	— Calebasse - Bosc. Van-mons.
= Beurré de Saint Jean. Prov.	- Cassolette. = Friolet. = Muscat vert. = Lechefrion. Duk.
Angélique de Bordeaux. Duh. == Saint Marcel == gros fran-	(Août et Septembre.) — Cassolette jaune. F. B. (Août.)
réal. (Mat. Décembre.) Angélique des Chartreux. H. P.	- Catillac. Duh. = Rateau gris. (Décembre.)
- Angélique de Rome. Duh. (Décembre et Février.)	— Catilina rosa. H. P.
— Angleterre d'hiver. = P. d'Angleterre. Duh. (Avril.)	— Cheminette. F. B. (Décembre-Janvier.) — Chair à dame. — Chère adame. Duh. (Mi-Août.)
- Aurate Duh. Poire dorée. P. Saint Jean doré. Prov. (Mat. Juin.)	- Chât-brûlé. = Poire de Saintonge. = Petit Tarquin, Duh,
Belle et bonne. Christ. (Septembre.)	
	ed. nov. (Octobre et Novembre.)
- Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.)	- Citron de sierens. Christ. (Juillet.)
— Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) — Belle d'été. Duh. ed. nov. — Bellissime d'été. H. P.	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.)
— Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) — Belle d'été. Duh. ed. nov. — Bellissime d'été. H. P. — Bellisime d'automne. — Vermillou. Duh. — Petit Certeau.	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prov. (Août.)
 Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) 	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prov. (Août.) — Cuisse medame. Duh. (fin Juillet.)
 Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. = Bellissime d'été. H. P. Bellisime d'automne. = Vermillon. Duh. = l'etit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. = Cremesine rousse. Prov. (Juin.) 	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prev. (Août.) — Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) — Colmart reul. Van-mon.
 Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. = Bellissime d'été. H. P. Bellisime d'automne. = Vermillon. Duh. = l'etit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. = Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. = Téton de vénus. = Catillac. (Décem.) 	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prov. (Août.) — Cuisse medame. Duh. (fin Juillet.)
 Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellisime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) 	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prev. (Août.) — Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) — Colmart reul. Van-mons. — d'Ardempont. Van-mons. — Souverain. Vans-mons. — Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Handen. Calv. (Septem. et Octobre.)	— Citron de sierens. Christ. (Juillet.) — Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Crémesine d'Août. Prev. (Août.) — Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) — Colmart reul. Van-mons. — d'Ardempont. Van-mons. — Souverain. Van-mons. — Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) — Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A, et S.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellisime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufilet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg unotte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Van-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno.
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellisime d'été. H. P. Bellisime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) 1 Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (Adet. Duh. (Octobre.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) 1)ouble Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellisime d'été. H. P. Bellisime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (Ladet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov.	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) 1)ouble Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Echassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Judilet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Handen. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de Cadet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière.	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Echassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Epargne. — Beau présent. — Saint Samson. — grosse cuisse
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg unotte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (adet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. Souverain. Van-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Fehassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Fepargne. — Beau présent. — Saint Samson. — grosse cuisse madame. Duh. — Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Judilet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Handen. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de Cadet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière.	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) 1 Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Fchassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Fpargne. — Beau présent. — Saint Samson. — grosse cuisse madame. Duh. — Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) Febragne de Tonelle. (Juillet.) Petite épine d'été. Duh. ed. nov. — Epine d'été. — Fondante
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellisime d'été. H. P. Bellisime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprème. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de Cadet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice ? F. B.	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) F chassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) F pargne. — Bean présent. — Saint Samson. — grosse cuisse madame. Duh. — Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) F petite épine d'été. Duh. ed. nov. — Epine d'été. — Fondante musquée. Duh. — Satin vert. (C. Août.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg umotte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (.adet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice ! F. B. Non pareille. Christ. (Novembre.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. = Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. = Armenie. = Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Echassery. = Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Epargne. = Beau présent. = Saint Samson. = grosse cuisse madame. Duh. = Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) Epargne de Tonelle. (Juillet.) Petite épine d'été. Duh. ed. nov. = Epine d'été. = Fondante musquée. Duh. = Satin vert. (C. Août.) Epine d'été de Toulouse. Duh. ed. nov. (C. Août.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufilet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vérus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (adet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice ? F. B. Non pareille. Christ. (Novembre.) de Paques. == Bergamotte d'hiver. Duh. (Avril et Juin.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) F chassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) F pargne. — Bean présent. — Saint Samson. — grosse cuisse madame. Duh. — Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) F petite épine d'été. Duh. ed. nov. — Epine d'été. — Fondante musquée. Duh. — Satin vert. (C. Août.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg umotte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (.adet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice ! F. B. Non pareille. Christ. (Novembre.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. Armenis. Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Echassery. Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Epargne. Bezan présent. Saint Samson. grosse cuisse madane. Duh. Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) Fpargne de Tonelle. (Juillet.) Petite épine d'été. Duh. ed. nov. Epine d'été. Fondante musquée. Duh. Satin vert. (C. Août.) Epine d'été de Toulouse. Duh. ed. nov. (C. Août.) Epine rose. Poire de rose. Poire de Malte. Poire tulipée. Caillot rosat. Poire d'eau rose. (Juillet.) Epine d'hiver. Duh. (Novembre et Fevrier.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprême. Duh. (Jufilet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg unotte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de (adet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice? F. B. Non pareille. Christ. (Novembre.) de Paques. == Bergamotte d'hiver. Duh. (Avril et Juin.) Rouge. Duh. Crassanne d'été? (Octobre.) Rayée. == B. Suisse. Duh. (Octobre.) De soulers. == bonne de soulers. Duh. (Février et Mars.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prev. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mons. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. — Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. — Armenie. — Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Fehassery. — Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Fargne. — Beau présent. — Saint Samson. — grosse cuisse madame. Duh. — Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) Fpargne de Tonelle. (Juillet.) Petite épine d'été. Duh. ed. nov. — Epine d'été. — Fondante musquée. Duh. — Satin vert. (C. Août.) Fpine d'été de Toulouse. Duh. ed. nov. (C. Août.) Epine rose. — Poire de rose. — Poire de Malte. — Poire talipée. — Caillot rosat. — Poire d'eau rose. (Juillet.) Epine d'hiver. Duh. (Novembre et Fevrier.) Etrangle. — Poire de fusée. (à cuire.) manger. (Sep. et Oct.)
Belle de Bruxelles. Calv. (Octobre.) Belle d'été. Duh. ed. nov. == Bellissime d'été. H. P. Bellissime d'automne. == Vermillon. Duh. == Petit Certeau. (Mat. Septembre et Octobre.) Bellissime d'été suprème. Duh. (Juillet.) d'été. == Cremesine rousse. Prov. (Juin.) Bonne d'hiver. Duh. == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.) Bequesne. Duh. (Octobre et Janvier.) Berg motte d'Angleterre. == B. de Hamden. Calv. (Septem. et Octobre.) d'automne. Duh. (Octobre.) de Bussy. F. B. (Janvier et Mars.) Cadette. == Poire de Cadet. Duh. (Octobre.) Crassanne. Duh. (Octobre.) C. panachée. Duh. ed. nov. d'été. == Milan blanc. == Milan de la Benvrière. Duh. (Juillet.) de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. Duh. (Février et Mai.) de Nice? F. B. Non pareille. Christ. (Novembre.) de Paques. == Bergamotte d'hiver. Duh. (Avril et Juin.) Rouge. Duh. Crassanne d'été? (Octobre.) Rayée. == B. Suisse. Duh. (Octobre.)	Citron de sierens. Christ. (Juillet.) Grosse Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Petite Crémesine. Duh. ed. nov. (Juillet.) Crémesine d'Août. Prov. (Août.) Cuisse madame. Duh. (fin Juillet.) Colmart reul. Van-mont. d'Ardempont. Van-mons. Souverain. Vans-mons. Deux fois l'an. Christ. (Juillet et Octobre) Double Calice. Poire à deux têtes. Pom. Austri. (A. et S.) Double fleur. Duh. Armenis. Pyrus communis flore pleno. Lin. (Février et Avril.) Double fleur panachée. Duh. Doyenné gris. Duh. (Septembre et Octobre.) Echassery. Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.) Epargne. Bezan présent. Saint Samson. grosse cuisse madane. Duh. Poire des tables des Princes. Christ. (Juil.) Fpargne de Tonelle. (Juillet.) Petite épine d'été. Duh. ed. nov. Epine d'été. Fondante musquée. Duh. Satin vert. (C. Août.) Epine d'été de Toulouse. Duh. ed. nov. (C. Août.) Epine rose. Poire de rose. Poire de Malte. Poire tulipée. Caillot rosat. Poire d'eau rose. (Juillet.) Epine d'hiver. Duh. (Novembre et Fevrier.)

Poirlers Franc-faran.	Poire d'Oignon. = Epine rose d'été. Duh. (Août.)
- Franc-réal. Duh. (Octobre et Novembre.)	— D'or. Prov. (Août.)
— Franchipane. Duh. (Septembre.) — Gros muscat d'hiver. = Muscat d'hiver. Christ. (Décembre.)	- Passans ou du Portugal. Calv. (Cctobre.)
Gros rateau. (Janvier.)	— De P.être. Duh. (Février.) — De quarante onces. Duh. ed. nov. (Novembre et Décem.)
- Hativeau. Dah. (Mi-Juillet.)	— De saint François. Duh. ed. nov. (Novembre et Décembre.)
_ Gros hativeau de la forêt. Duh. (Mi-Août.)	- De Saint Pierre, T. Obseg. (mi-fuillet.)
- Hennen-birne, F. B. (Octobre et Novembre)	— De Saint Pierre. Langlois. (Juillet.)
Jmmen-birne. F. B. (Septembre et Octobre.)	- Sans peau. = Fleurs de guignes. Duh. (C. Août.)
Impériale à feuilles de chêne. Duh. (Mars et Avril.)	— De Septembre, la grosse. Christ. (Septembre.)
Inconnue chenau. = Fondante, cassaute de Brest. D. (fin. A.) Julienne de Carpentras. (Août.)	Tonneau. Duh. (Octobre et Novembre.) Vierge. Manger.
Jalousie. Duh. ed. nov. (fin Septembre)	- De vigne. = Poire de demoiselles. Cah. (Octobre.)
Jaune de merveillon. Prov. (Juin.)	- De vitrer: Duh. (Novembre et Décembre.)
- Kron-Birne. Christ. (Mars et Mai.)	- Présent Royal de Naples. Christ. (Mars et Avril.)
- Louise bonne. Duh. (Novembre et Décembre.)	- Reine d'hiver. Christ. (Novembre et Mars.)
Mansuette. Solitaire. Duh. (Août.)	- Robine. = Royale d'été. Duh. (Août.)
- Marquise. Duh. (Novembre et Décembre.) - Martin sec. Duh. (Novembre et Décembre.)	— De Provence. Duh. ed. nov. (Juillet et Août.) — Royale d'hiver.—Duh. — Spina di christi. Des Italiens.
- Martin sire. = Ronville. (Novembre et Décembre.)	- Rousselet hâtif. = Poire de chypre. = Perdreau. Duh. =
- Merveille d'hiver. = Petit-oin. Duh. (Décembre.)	Pyrus ruffescens. H. P. (fin-Juillet.)
- Messire Jean doré. Duh. = Chaulis. (Octobre et Novem).	- Rousselet, le gros. = Rois d'été. Duh. (fin-Août.)
Muscadelle à calice caduque. Duh. ed. nov. (Juin et Juillet.)	- Rousselet d'hiver. Duh. (Février et Mars.)
— Grosse muscadelle. Duh. ed. nov. (Juillet.) — Petit muscat. — Sept en gueule. Duh. (Juin.)	— Rousselet de Rheims. Duh. (C. Septembre.) — Rousselet de Stouttgard. Christ. (mi-Août.)
- Muscat Jalleman. Duh. (Fevrier et Mars.)	- Rousseline. Duk. (Septembre.)
- Muscat fleuri. Duh. (fin-Juillet.)	- Saint Augustin. Duh. (Décembre et Janvier.)
Muscat robert. P. d'ambre. P. à la Reine. Duh. (fin-Juil.)	— Saint Gal. — Poire au vin. F. B. (Décembre et Mars.)
- Muscat Royal. Duh. (C. Septembre.)	- Saint Germain = Inconnue la fare. Duh. (Nov. et Avril.)
— Ognonet, = Archiduc d'été. = Amiré roux. Duh. (C. Août.)	- Saint Germain d'été. Duh. ed. nov. = Jargonelle. Prov. (Août.)
- Ognonet de Provence. (Duh. ed. nov. (Juillet.) - Orange d'hiver. Duh. (Février et Avril.)	— Saint Germain jaune. Manger. (Novembre et Avril.) — Saint Germain panaché. F. B. (Novembre et Avril.)
- Orange musquée. Duh. (Août.)	- Saint Lezin. = Saint Lezain. Duh. ed. nov. (C. Octobre.)
- Orange rouge d'été. Duh. (Mi-Août.)	- Saint père. = Saint Pair. Duh. (Mars.)
- Orange tulipée. = Poire aux mouches. Duh. = Grosse orange	
d'automne. (Septembre.)	- Sanguine. Poire d'Italie. Duh. ed. nov. (Août.)
- Orange tulipée de Tonelle. (Août.) - Orange tulipée. Dupy.	— Sanguinole. Duh. (mi-Août.) — Sarrazin. — Poire Sarrazin. C. de char. (Mat. D. an à l'autre.)
- Parfum d'Août. Duh. (Août.)	- Sarrazin de Duhamel. (d'un an à l'autre.)
Passe colmart vineux. Van-mons.	- Schoeubler-birne. F. B. (Octobre.)
- Passa-tutti, F. B.	- Seile-birne. F. B. (Octobre.)
Pastorale. = Mansuette d'automne. Duh. (Novem. et Décem.)	Stadel-birne. F. B. (Octobre.)
— Payency. — Poire de Périgor. Calv. (Octobre.) — Poire d'amiral. Duh. ed. nov. (fin-Septembre.)	— Stümpfler-birne T. Obstg. (fin-Août.) — Stümpfling, F. B. (fin-Juillet.)
— D'amour. — Trésor. — Amour. Duh.	- Sucré vert. Duh. (Octobre.)
au lard. Manger. (Août et Septembre.)	- Sucré d'hoyesrwerda. (hrist. (Août.)
- D'ange. Duh. (Août.)	— Sucré de zuric. F. B. (fin-Août.)
 D'ange d'hiver. F. B. (Décembre.) Belle Audibert. Duh. ed. nov. (Novembre et Décembre.) 	— Suprême. == Suprême de Merlé. Duh. — Tarquin. Duh. (Avril et Mai.')
- A bouquet.	
- Brutte bonne. = Grise bonne. = Malconnaître. =	
Dittle Dutile Gine boiling tarteeninger	Truite. Christ. Novembre et Décembre.) Vallée d'été. (Août.)
Trompe chasseur. (Août.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P.	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'italie. Duh. (Décembre et Janvier.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.)	- Vallée d'été. (Août.) - Vallée. (Septembre.) - Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) - Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) - Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) - Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrages haute tige sur cognassier de 50 à 80 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.)	- Vallée d'été. (Août.) - Vallée. (Septembre.) - Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) - Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) - Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) - Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c mi-tige d. 50 à 60 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov.	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — hasse-tige id. 30 à 50 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. — bergamotte crassanne?	- Vallée d'été. (Août.) - Vallée. (Septembre.) - Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) - Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) - Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) - Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizss haute tige sur cognassier de 50 à 80 c mi-tige id. 50 à 60 c basse t.ge id. 30 à 50 c haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. — bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — hasse-tige id. 30 à 50 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. — bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. — Grise bonne. Duh. (Août.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'autonne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. 80 à 75 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. — bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. — Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.)	- Vallée d'été. (Août.) - Vallée. (Septembre.) - Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) - Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) - Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) - Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizss haute tige sur cognassier de 50 à 80 c mi-tige id. 50 à 60 c basse t.ge id. 30 à 50 c haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. — Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. — bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. — Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — basse tige id. 30 à 50 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. POMMIZRS.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh.	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'autonne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. 80 à 75 c.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De kienzheim. F. B. (Septembre.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'autonne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. 80 à 1 f. 25. c. POMMIZRS.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh.	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potries haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — basse-tige id. 30 à 50 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. PO HHIERS. PO HHIERS.
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh. De kienzheim. F. B. (Septembre.) De lansac. == Dauphine. == Satin. Duh. (Oct. et Janv.) De livre. Duh. == Gros râteau gris. (Décembre et Fevrier.) De Magdelaine. == Citron des carmes. Duh. (fin-Juillet.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potries haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — hasse-tige id. 50 à 50 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25 c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. POMMIZRS. POMMIZRS. Pommier commun. — Malus communis. D. C. — Pyrus malus. — Lin. — Sorbus malus. Cramtz. — Agetie rouge. F. B. — Christ. (Mat. Fevrier-Mars.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh. De kienzheim. F. B. (Septembre.) De lansac. == Dauphine. == Satin. Duh. (Oct. et Janv.) De livre. Duh. == Gros râteau gris. (Décembre et Fevrier.) De Magdelaine. == Citron des carmes. Duh. (fin-Juillet.) De Malte. == Caillot rosat d'hiver. F. B. (Déc. et Jany.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potries haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25 c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. POHMIZRS. POMMIZRS. POMMIZRS. POMMIZRS. Pommier commun. — Malus communis. D. C. — Pyrus ma'us. Lin. — Sorbus malus. Cramtz. — Augtje rouge. F. B. — Christ. (Mat. Fevrier-Mars.) — blanc. — Sæte enkhuisser aagtje. F. B. — Christ. (Mat.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh. De kienzheim. F. B. (Septembre.) De lansac. == Dauphine. == Satin. Duh. (Oct. et Janv.) De livre. Duh. == Gros râteau gris. (Décembre et Fevrier.) De Magdelaine. == Citron des carmes. Duh. (fin-Juillet.) De Marcenay. F. B.	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potrizes haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25. c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. POMMIERS. POMMIERS. Pommier commun. — Malus communis. D. C. — Pyrus ma'us. Lin. — Sorbus malus. Crantz. — Angije rouge. F. B. — Christ. (Mat. Fevrier-Mars.) — blanc. — Sæte enkhuisser aagtje. F. B. — Christ. (Mat. Fevrier-Mars.) — Fevrier-Mars.)
Trompe chasseur. (Août.) Des Chartreux. (fin-Août.) Poire des champs des Chartreux. H. P. Champ riche d'Italie. Duh. (Décembre et Janvier.) Chaptal. Duh. ed. nov. (Février.) De Colmart. == Poire manne. Duh. (Janvier et Mars.) Cramoisi. Calv. (Octobre.) A deux têtes. Duh. (fin-Juillet.) A deux yeux. Duh. ed. nov. Douce des basses Alpes. H. P. == bergamotte crassanne? De fer. (à cuire.) Manger. (Décembre et Février.) Figue. Duh. (Septembre.) De la forêt. == Grise bonne. Duh. (Août.) A gobert. Duh. ed. nov. (Décembre et Juin.) Jalvé. F. B. (Mars et Avril.) De jardin. Duh. De kienzheim. F. B. (Septembre.) De lansac. == Dauphine. == Satin. Duh. (Oct. et Janv.) De livre. Duh. == Gros râteau gris. (Décembre et Fevrier.) De Magdelaine. == Citron des carmes. Duh. (fin-Juillet.) De Malte. == Caillot rosat d'hiver. F. B. (Déc. et Jany.)	— Vallée d'été. (Août.) — Vallée. (Septembre.) — Verte longue d'automne. — Mouille bouche. Duh. (Septem.) — Verte longue panachée. — Culotte suisse. Duh. (Septembre.) — Verte d'hiver. Henne - F. B. (Décembre et Avril.) — Virgouleuse. Duh. — Poire glace. (Décembre et Janvier.) Potries haute tige sur cognassier de 50 à 80 c. — mi-tige id. 50 à 60 c. — haute-tige sur franc. 80 à 1 f. 25 c. — basse-tige id. de 50 à 75 c. POHMIZRS. POMMIZRS. POMMIZRS. POMMIZRS. Pommier commun. — Malus communis. D. C. — Pyrus ma'us. Lin. — Sorbus malus. Cramtz. — Augtje rouge. F. B. — Christ. (Mat. Fevrier-Mars.) — blanc. — Sæte enkhuisser aagtje. F. B. — Christ. (Mat.)

	2		· norma ga ng
	(-)	9 _)	
Pou	amier api panaché. (Mat. Décembre-Janvier.) 1 f. 25 c.	Pon	nmier Merveille de Portland. F. B.
	noir. Duh. Pomme noire. (Mat. OctDec.)	-	Museau de lievre. Duh. ed. nov. = Petit pigeonet? (Mat:
_	d'Été, gros. Duh. ed. nov. = P. magdeleine? Calv.	1	Septembre - Novembre.)
	(Mat. Juillet.)	_	Negre doré. Christ. (Mat. Décembre - avril.)
	Baidane. H. P.		Paradis. Duh. (Mat. Juillet.)
	Belle Reur. F. B. = Manger.		Passe pomme rouge d'automne. Duh. (Mat. Octobre.)
	Belle d'Hervey. H. P.	-	Passe pomme rouge d'été. Duh. = Calville rouge d'été. =
	Benzler. F. B. (Mat. Décembre-Fevrier.)	l	Pomme de Chateau-Renard. Prov. (Mar. Juillet - Aout.)
	Bohnapfel grand. F. B.	_	Pater noster. Christ. (Mat. Décembre - Feyrier.)
	Borsdorfer. = Reinette de Misnie. = R. bâtarde. F. B.	_	Pepin argenté d'Angleterre. F. B.
	- T. Obst. (Mat. Décemble-Avril.)	_	d'été. Christ.
	le grand Bohémien. F. B. Christ. (Mat. id em.)	_	Franche. Manger. (Mat. Décembre - Fevrier.)
_	Ognoniforme. F. B. Christ. (Mat. id.)	_	Noble. Christ. (Mat. Décembre - Avril.)
	Rouge. F. B. Christ. (Mat. Décembre.)	_	d'or ou pomme d'or. Duh. = Reinette d'Angleterre.
	Bouquet-preuve. Duh. ed. nov. (Mat. Janv. Avril.)	I	= R. de Cantorbery. = Gold pippin. (Mat. DécMars.)
	Bredine. H. P.	_	Parmain Loan's. Christ. (Mat. Septembre.)
	Breitaer. F. B. (Mat. 9.bre. Mars.)	_	Royal. Christ. (Mat. Novembre - Décembre.)
	Calville d'Angleterre. Christ. (Mat. Mai.)		Petit bon. = Courtpendu sanguin. F. B. (Mat. 9.bre - Mars.)
_	Blanche d'été. Christ. = Passe-pomme. = Grosse	_	Pigeonnet rouge. F. B. (Mat. Novembre - Mars.)
	pomme magdeleine = Malus calvillea. H. P.		Pomme d'Adam. F. B. (de 1 à 3 années.)
	(Mat. Mi-Juillet.)	_	Ananas. H. P. (Mat. Janvier - Mars.)
-	d'hiver. Duh. ed. nov. = Bonnet carré. = P.	_	d'Andène. H. P.
	glace. (Mat. Décembre avril.)	_	d'Astems. = Striffing d'hiver. F. B. (Mat. Décem-
	Rouge d'Automne. Duh. = Poinme violette. Duh. ed.		bre - Mai.)
	nov. (Mat. Décembre.)	_	d'Astracant. == P. transparente. (Mat. Août.)
	d'été, Duh. (Mat. Juillet.)		d'Avent? F. B. (Mat. d'un an à l'autre.)
	d'hiver. Duh. (Mat. Décembre et Mars.)	_	de Bâle. F. B. (Mat. Décembre - Mai.)
	de Normandie. == Cœur de bœuf.	_	de Barberin. Duh. ed. nov. (Mat. Janvier - Avril.)
	. Cardinal rouge. Christ.	_	de Canada grise.
_	Chemise de soie blanche. Christ. (Mat. 9.bre et Décembre.)	-	Chataigne du Léman. F. B. (Mat. Décembre - Juin.)
	Rouge. T. Obst. (Mat. Décembre et Feyrier.)	_	Chaudron. Jacq. B.
	Citron, F. B. (Mat. Décembre et Fevrier.)	_	de Cierge d'hiver. H. P. = Wachs - apfel ? F. B.
-	Couchine, petite, d'hiver. Duh. ed. nov. == Petit paradis.		(Mat. Décembre-Avril.)
	Pomme de St. Michel. Prov. (Mat. Janvavril.)	_	de la Chine à fleurs doubles. = Pyrus spectabilis. Willd.
	d'hiver grosse. Duh. ed. nov. = gros Paradis. Prov.	_	Concombre. Duh. ed. nov. (Mat. Nov. et Déc.)
	d'été. Duh. ed. nov. == Paradis d'Août. Prov.	_	Concombre des chartreux. H. P.
	= Pomme de Duplessis. Lang. (Mat. Août.)	_	Dioique. = Sans fleurs et sans pepins. Prov. = Malus
	de Deymier. Duh. ed. nov. (Mat. Janvier et Avril.)	1	dioica. Duh. ed. nov. = Pyrus dioica. = Malus non
	Rouge. Duh. ed. nov. = Paradis rouge. Prov.		florens. Bauh. (Mat. Juillet.)
	(Mat. Octobre et Janvier.)		double rouge de paradis. Christ. (Mat FevMars.)
	Cœur de pigeon. = Jérusalem. Duh. (Mat. Novembre et		Douce de Bollwiller. F. B. (Mat. Nov Mai.)
	Décembre.)		de Doyen. = Prost-apfel. F. B. (Mat. 9.bre - Mai.)
	Courtpendu blanc. F. B. (Mat. Décembre et Avril.)		de drap d'or. == Vrai drap d'or. Duh. (8.bre - Déc.)
	Gris le gros. = Pomme de Berlin. F. B. (Mat. Décem-	_	de Durand. Lang. (Mat. Juillet.)
	bre - Avril.)		Figue. Duh. (Mat. Novembre - Décembre.)
	Plat. Christ. (Mat. Décembre - Mai.)	_	Franche,
	Rouge. Christ. (Mat. Decembre - Mai.)		Gélée d'été. Duh. ed. nov. (Mat. Aost.)
	Demi-lilen. Jacq. B.		Gelée d'hiver. Prov. Lang. (Mat. Décembre - Mai.)
	Doucin. Duh. (Mat. Juin.)		de glace. = Transparente. Duh. (Mat. Août.)
	Fenouillet gris. = Pomme d'anis. Duh. (Mat. DécFevrier.)		Græfenstein. Christ.
_	Rouge. Duh. ed. nov. = Bardin. = Azérolly.		Hâtive avant toutes. Christ. (Mat. Juillet.)
	—Court-pendu de la Quirtinye. (Novembre-Mars.)		Hâtive de Pézenas. = Caremille. Duh. ed. nov. (Juill.)
	Jaune Drap d'or. Duh Pomme de caractères.		de haute bonté. Duh. (Mat. Décembre - Juin.)
	(Mat. Septembre et Octobre.)		de Mulecarle. Duh. ed. nov. = Pomme de Charles.
	Fleiner d'été. F. B.		Noire d'Amérique. Calv.
	Francatu.		Non pareille. Duh. (Mat. Janvier - Mars.)
	Cranch la douce. F. B. (Mat. Décembre - Mars.)		Panachée. F. B.
	Aigre. F. B. (Mat. idem.)		Poire. Calv. (Déc Mars.)
	Gros api d'hiver. = Pomme de rose. = Passe rose. Duh.		Poire la grossse. F. B. (Mat. Décembre - Feyrier.)
	(Mat. Novembre - Feyrier.)	_	Quarrée.
_	Gros bon. Christ. (Mat. Décembre - Avril.)		de St. Jacques. F. B. (Mat. Mi-Août.)
	Gros-faros. Duh. (Mat. Décembre - Fevrier.)		de St. Jean. Duh. ed. nov. (Mat. Juin.)
	Herrn apsel. F. B. = Pomme de Monsieur.		de St. Jean gros. Duh. ed. nov. (Mat. Juin.)
	Ignonette. Jacq. B. (Mat. Décembre - Mars.)		de St. Louis. F. B. (Mat. Août.)
	Juncker apfel. F. B. == Pemme de cadet.		de St. Michel. H. P.
	Lookriecher, F. B.		de S.t Nicolas. F. B. (Mat. Décembre - Mai.)
	Maderée d'été acide, Duh. ed. nov. (Mat. Juin - Juillet.)		Romarin blanche. Christ. (Mat. Novembre - Fevrier.)
	d'Août. Duh. ed. nov. (Mat. Août.)	_	R. rouge. Christ. (Mat. Août.)
_	d'hiver. Prov. (Mat. Octobre - Janvier.)		de Sibérie. = Malus baccata. Pers. (Mat. Août - Sept.)
_			
_	de Tonnelle. Duh. ed. nov. (Mat. Septembre.) Malzer noble. F. B.		de Stettin la jaune. Christ. Transparente de Zuric. F. B. (Mat. Fin-Août.)
	Marguerite, Manger. (Mat. Juillet.)		
_	Mætapfel a fleurs tardives. Christ. (Mat. Nov. et Décembre.)		id. de Moscovie? F. B. Postophe d'été. Duh. (Mai: Fin-Octobre.)
_	Maucher rouge. F. B. (Mat. Décembre - Fevrier.)	_	
_	Menzeère R R (Mas Novembra et Descrier)	_	d'hiver. Duh. == Moyeuye. F. B.
	Menagere. F. B. (Mat. Novembre et Fevrier.)		Présent royal. Manger.
			3

50 C.

70

50

40

- Streiling. — Sträumerling. T. Obstg. (Mat. Nov. Pév.)

- Valreas le gros. Lang. (Mat. Octobre - Avril.)

- le petit. Lang. (Mat. Octobre - Avril.)

- Vässerlinger. F. B. (Septembre - Avril.)

sur franc

id.

ROMMIERS hautes tiges

id. de premier choix

Mi-tiges.

Basses tiges.

Nains greffés sur paradis.

Sauvageons de pommiers; plants de 1 à 3 ans. Pemmiers paradis, pour nains, les 100 replants

PRUNE domestique = P. commune. = Prunus domestica, L. = Belle de Riom. H. P.
Bricette. Duh. (Septembre.)
Damas ambré — Prunus damascena. H. P. (Août.) Dronet. Duh. (Août.)
d'Espagne. Duh. ed. nov. (fin-Août.) Le gros.

Musqué. — P. de Malthe. — P. de Chypre Duh. (mi-A.) Rouge tardif. Duh. ed. nov. (mi-Septembre.) De Septembre. == Prune de vacanoes. Duh. (Septem.) — Dame Aubert jaune. — Grosse luisante. Duh. (fin-Aodt.) - Diaprée rouge. - Robe de sergent. - Roche-Corbon. Duh. Prunus diaprea (mi-Août.) Grosse noire hâtive - Precoce de tours. - Noire de Montreuil. Duh. (mi-Juillet.)

Ileverte. Duh. (fin-Août.)

Impératrice violette. Duh. (Septembre.)

blanche? Duh. (fin-Août.)

Impériale Otomanne. F. B. (Juillet et Août.)

violette Prune d'euf. Prunus Imperialis. id. à feuilles panachées. (Août.)

Jacinthe. Duh. (Août.)

Jaune hâtive. — P. de Catalogne Duh. — P. de Saint Bernabé. Mirabelle grosse. — Drap. d'or. — Mirabelle double. Duh.

— Prunus cereola. H. P. (Août.) Petite. = M. perlée. (mi-Août.)
Rouge. Prov. (C. Août.)
Mirobolan. = Prunus cerasifera. Willd. (Juillet.) ı f. Moyeu de Bourgogne. Calv. (mi-Septembre.)
Perdigon blanc. Duh. — Prune rognon. — Prunus amygdalina H. P. De Saint Michel. Prov. = P. tardive. Lang. (Sept.) Abricotée blanche. Duh. ed. nov. = Prunus maliformis. (mi-Août.)
Ronge. Duh. ed. nov. (mi-Août.)
Cerisette. — Prunier ceriset. Duh. If. A fleurs semi doubles (Août.)
De Jérusalem. Duh. ed. nov. (fin-Juillet.) De monsieur. Duh. (fin-Juillet.)

Id. hatif. Duh. (C. Juillet.) Pêche Calv. (Août.) Précote de tours. Duh. Qui fructifie deux fois l'an. = Prunier de deux saisons Duh. = Prunus bifera. (Août et Septem.) I f. Sans noyeau. Duh. ed. nov. = Prunus enucleata. I f. De Saint Martin rouge Duh. (Octobre et Novembre.) Suisse. H. P. = P. de monsieur tardive Duh. ed. nov. Virginal à fruit blanc Duh. ed. nov. (fin-Août.) Rouge. Id. (C. Août.)

Prune Reine claude, Dauphine Abri	icot vertVerte bonne.
Sucrin vert. Damas vert	. Duh. == Prunus Clau-
diana. H. P.	
- Petite. Duh.	
— Id. nouvelle espèce.	
— Id. nouvelle espèce. — Semi double. Duh.	
Tardive nou elle espèce.	
Violette. Duh. ed. nov.	^
- Royale. Duh.	
— Ordinaire.	
- Royale. Duh Ordinaire De Tours. Duh. = Prune Roi. =	= P. regia. (fin-Juillet.)
- Saint Julien. Duh. (Août.)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Panaché. (Août)	
- Sainte Cathérine. Duh. = Prunus co	erea. H. P. (Septem.)
- Violette. Prov. (Nov.	embre et Décembre.
- Tardive de Chalon. Dh. (Octobre.)
- Zwetschen. = Prune d'Allemagne. =	Cuetche. == Ouetche.
Duh. ed. nov.	
De brême F. B. (Août et Oc	tobre.)
La grosse. F. B. (Août, et Oc	ctebre.)
d'Italie, nouv. esp. F. B. (Aoc	it et Octobre.)
Prunier haute tige	de 50 à 75 c.
— Id. greffé en tête.	de 90 c. à 1 f. 25 c.
- mi-tige	de 40 à 60 c.
basse tige	40 C.
-	40 00

SORRIERS

888888

Sorbier cultivé. = Cormier. = Sorbies domestica. L. de 75. c. à 1 fr. Var. a gros fruits. nouvelle espèce de - 2 2 3 fr. de 2 à 2 f. 50 c.

VIGNES.

Variétés à Grains ronds noirs.

```
Raisin Aramon noir. Gard.
Bourboulenque noire. = Negrette. = Noiret. Gard.
Calitor noir. Saure, d St. Gilles. Quenoise, d Avignon.

Moustardie, d Tarascon.
                       à grappes serrées.
          Var.
                       a grappes laches.
Doucinelle noire.
Espar. = Mourvés noir. Gard. = Benadu, d Tarascon. = Bé-
        rardi, à Avignon.
Grenache. Gard. — Teinturier. Roy. — Teinteau. — Gros noir.

Mouré. — Noir d'Espagne. — Portugal. — Alicante. —
Plan de Manosque. — Romé noir. — Bretoneria. St. Rox.
       Clem. = Vitis acino nigro. etc. Garid. 28.
Iraguan noir. Gard.
Maroc. = Raisin d'Afrique. = R. d'Espagne. = Materot.
Marroquin. Gard. = Espagnin. Prov. = Vitis duracina. Garid. 27.
Morillon hatif. = Raisin de la Magdeleine. = Raisin de la S.t
       Jean. - Maurico. - Pineau en Bourgogne. - Vitis pre-
       cox. Garid. 10.
Moulan. Gard.
Muscat noir. = u. rouge. = uoscatel menudo violet. = Vitis
       moschata. S. Rox. Clem. = Vitis apiana Nigro-acino.
       Garid. 40.
Panpegat. = Le Provençal. Lang.
Peyran noir. - Spiran. - Pyran. - Aspiran. Lang.
Picardan noir.
Piquepoule noir.
Terre moureau noir. Lang.
   De Barri noir. Lang.
```

Ugne noir. - Uni negre. Prov-Lang. - V tis. etc. Garid. 33.

Variétés à grains noirs allongés.

Raisin Augibert noir, Lang. Grand Guillaume. - Crête de cog. - Rognon de cog. - Pinis wa maxima, etc. Garid. 34.

Muscat violet. Duh. — M. long violet. Liger. — Moscatel splans obovata. Sim. Rox. Cl. Garid. 5.

Olivette noir. — Cornichon noir. — Vitis acino-obl. etc. Garid. Ulliade. Prov. Verius. = Grev. = Grégeoir. = Bourdeles.

Variétés à grains blancs ronds.

Augibert blanc. Lang. - Plan de la Barre. - Raisin de madame.

Assadoule bouvier. Lang. || Prov. Chasselas doré. = Bar-sur-Aube. Duh. = Raisin de Champague. id. musqué. Duh. Ciotat. = Raisin d'Autriche: Duh. = Malvoisie. Prov. = Vieis laciniata. Lin. Clairette ronde. Corinthe blanc. = = RaisIn de S.t Roch. == R. sans pepin. == Vitis corinthiaca. Garid. 2. Vitis apyrena.

Doucinelle blanche. Prov. Douceagne. Doucet blanc précoce. Gard. = Roussane. Comtat. = Vitis precox. Garid. 11. Granache blanc. Lang.

Muscat blanc.

M. de Frontignan.

Moscatel menudo blanco.

Esp.

V. generosa. S. Rox. Clem.

Vitis acinis albidis. etc. Garid. 5. Ugne blanche. Prov. = Matinié. = Sauvagnien blanc. = Vitis

Variétés à grains blanes allongés.

ARCA3A

Calitor blanc. Clarette longue. Prov. = Sanvignon. Chap. = Sueria. = Manrillon blanc. = Fié. Columbau. Gard. Cornichon blanc. Duh. = Crochu. = Doigt de Donzelle, à Maroc. Ebn.-Elbeithar. = Teta de vaca. Espag. = Paula de Grenade. - Bumasti longissima. S. Ross. Clem. == Vitis ablongo acino. etc. Garid. 36. Galet blanc. Gard. Jouanen blanc. = magdelenen. = Vitis precox. erc. Garid. 8.

Muscat d'Alexandrie. = M. d'Espagne. = M. de Rome. = Panse longue musquée. = Moscatel gordo blanco. Espag. Uva isidori. S. Rox. Clem. — Vitis pergulana, esc. Garid.
Olivette blanche. — Crête de coq blanche. Prov. — Tena de vaca Dilverte Biancie. — Crete de cod Disoche. Prov. — I dea de vace blança. Espag. — Bumasti gracilis. S. Ros. Clem. — Kitis acinis albidis acuminatis. etc. Garid. 22.

Penduleau. — Rin de panse. — Panse musquée. Prov. (Passes.) — Passa larga. Esp. — Almunecar. — Bumasti longa. S. Rox. Clem. = Kitis pergulana. etc. Garid. 17. Picardan blanc. Prov. — Pineau blanc. — Melé. — Gueche blanc = Monu, = Feuille ronde, Chap.

acino rotundo albido. Garid. 16.

Variétés à grains rouges, reses ou grisatres.

Clairette rose. Prav. Grec. Prov. = Royal. Espagn. = Gré rouge. = Perrupo noir. = Rosierii? S. Rox. Clem. = Vitis acino rubro. Garid. 35. Martinen, = Raisin de la S.t Martin.

VINETIERS.

Raisin Musent gris. 7.2. Pineau g ris. — Auvergnat gris. — Pique poule bourre — Le griset blanc. Chap. — Rin gris. Prov. — Vitis acinis griseis. etc. Garid.

Très-dur.—Russin de poche.—Teta de vaca leonada.—Bumassi.
Sulcata, S. Rox. Cl.

VIGNES

de 50 à 75 c.

MMM

— Commun. — Epine-vinette. — Berberis vulgaris. L. 25 c. — Sans pepins. — B. abortiva. 1 f. 50 — Du Canada. — Canadensis. 50 Les 100 replants de 2 ans de vinetier commun, 10 f. (Voyez pour les autres espèces la rection suivante.)

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

ABIRS alba. Mich. = A. picea. Duh. = Pinus alba. Ait. = P.	Acer Succharinum I E
ABIES alba. Mich. A. picea. Dun. Pinus alba. An. 11	Acer Saccial hum. L
Canadensis. Wangenh. Epicea blanc. Sapinette blanche.	- Spicatum. Lam. = A.
GA+ 1 4 3 f.	tanun. Ait. == A.
— b. orientalis. Poir. = Pinus orientalis. L. = Sapin	tagne. = E. à épis.
blanc. A † de z à 4 f.	— Tartaricum. L. = E. a
- Balsamea Mill A. balsamifera. Mich Pinus balsamea.	G B
T C C 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2	
L. = Sapin baumier. = Sapin argente. = Baumier de	Adelia acitodon. = Adelia
Gilead. GA† de 1 à 4. f.	Æsculus coccinea. D C=
- Canadensis. Mich. = Pinus canadensis. L. = Sapin du Canada.	Hort. Angl. == M
Duh. ed. nov. = Hemelot sprusse. = Pérusse. GA+	espèce. A
de 1 å 4 f. 50 c.	- Flava. Ait. = Æ lutea
— Cedrus. Poir.—Pinus cedrus. L.—Larix cedrus. Mill.	- Hybrida. Bosc. = Æ
= Cèdre du Liban. = Sapin cèdre. G A † de 2 à 8 f.	B
- Excelsa. Poir. = A. rubra. Trag. = A picea. Mill. =	— Hippocastanum, L. = I
Pinus abies. L. = P. excelsus. Lam. = Sapin eleve. G A +	ronnier d'Inde. = Ch
de z à 3 f.	b. Foliis variegatis. ==
- Larix, Lam. = Larix decidua, Mill. = L. europea. D. C. =	— Macrostachia. Mich. =
Pinus larix. L. = Méléze. = Sapin mélèze. G A. de 1 à 3 f.	Hortul. = Pavia
- Microcarpa, Duh. ed. nov. = A. americana, Poir. = Larix	=== Marronnier nain.
microcarpa. = L. nigra. Marsch. = L. americana. Mich.	
Pinus microcarpa. Will. = P. laricina. Du Roi. = Me-	- Pavia. = Pavia rubra. =
	b. Villosa. = Pavia
- Nigra. Poir. A. denticulata. Mich. = Pinus nigra. Ait. =	Agave americana: L. == Ag
Sapin noir. = S. double. = Epinette noire. = Epinette	b. Picta.=A. variegata.:
à la bière. A † de 2 à 4 f.	Ailanthus glandulosa. Desf. :
- Pectinata. D C = A. vulgaris. Poir. = A. alba. Mill. = A.	Ehrh. == R. sinense
Candida. Trag. = Pinus picea. L. = P. pectinatus. Lam.	
Candida. 174g. Finus picea. L. F. pectinatis. 2011.	Ailanthe. = Vern
= Sapin en peigne. = Sapin Argente. = Sapin Com-	
mun, GA† 1 à 3 fr.	Almus glutinosa. Gaert. A. v
Acen campestre. L. Erable des champs, B n G. 6 à 30 fr. le 010	Aune commun. ===
b. Villosa. = d semence velue. 1 à 2 f.	
- Croeticum. L. = A. trilobatum. Lam. = Erable	- b. Laciniata. = Au
	- Incana. = Betula ir
— Dasycarpum. Ehrh. — A. rubrum mas. L. — A. Pallidum.	
air. = A. glaucum, Marsch, = A. Eriocarpum, Mich.	- Serrulata. mich. = Bei
= A. Tomentosum. = Erable tomenteux. = E. coton-	Aune d fewilles
neux. A 2 2 4 f.	Alyssum saxatile. L. =
- Heterophyllum? Willid. = A. Sempervirens, L. = Erable	125/10-11 011-1110 2
	C
toujours vert.	— Spinosum. L. = Alys.
- Hybridum Bosc. = Erable hybride. 2 2 4 f.	Amorpha fruticosa L. Amorp
- Monspessulanum. L. = A. Trilobatum. Lam. = A. trifolium.	
Bauh. = Erable à 3 lobes. = E. de Montpellier. = Agas.	- Glabra. Desf. = A.
Lang. G A. » 75 c. à 2 f.	*
- Negundo. L. = Erable à feuilles de frêne. = E. faux à	Amygdalus Communis. L. =
sucre. G A 1 à 2 f.	G. A.
- Opalus A. rotundifolium. Lam. A. Italum. Lauth. Erable	— b. Amara. == .
Opale. Duret. G.A. 1 à 2 f.	- c. Fragilis. =
b. opulifolium. Vill. = E. d feuilles d'Aubier. A 2 à 3 f.	- Hybrida Pers. Amande
Peneylvanicum. H. K. = A. Striatum. Lam. = A. canadeuse.	- Nana. L. = Amandie
Dub - Fable land - F de Boundanie D de a de f	
Duh. = Erable jaspė. = E. de Pensylvanie. B. de 2 à 3 f.	— Orientalis Ait. — A ar
- Platanoides. L. = A. latescens. = Erable plane. = E. d	
larges feuilles. G A de 1 à 2 f. 50 c.	- Persica. L. = Pécher.
- Laciniatum E. d pattes d'oie. E. d main crochue. A. 1 à 3 f.	- Sibirica F. B. = An
- Pseudoplatanus. L. = Erable sycomore. GA de 1 à 2 f.	Amyris polygama. Cav. ==
h Folis argenten magulatie — Cusanana nauschi A A	
b. Foliis argenteo maculatis.—Sycomore panaché. A: 1 à 3 f.	polygame.
- Rubrum. L. = A. coccineum, Ait, = Erable rouge. = E.	Anagyris foetida. L. = A. for
de Virginie, A de 2 à 3 f.	l
•	

Erable à sucre. A de 2 à 5 f. pensylvanicum. Wangenh. = A. monparviflorum. Ehrh. = Erable de mon-. = E. de Pensylvanie. B de 1 à 3 f. de Tartarie. = E. à feuilles de Murier. de 1 à 2 f. e épineuse. * C de 1 50 à 2 f. = Æ. carnea. F. B. = Æ. pavia rosea? Marronier à fleurs écarlates. Nouvelle de 3 à 8 f. ea. G B de i à 4 f, pallida ? Mich. = Marronnier hybride. de 3 à 6 f. Hippocastanum vulgare. Gært. = Marhattignier båtard. de 122f. 50 c. = Marronier panachė. B. de 2 à 3 f = E. parvinora. Walt. = E. spicatae Duh. ed. nov. = P. dulcis. n. = Pavia nain à longs épis. G. C. de 2 à 3 f. == Pavia à fleurs rouges. G. B. de 2 à 5 f. rouge velu. G. B. de 3 à 5 f.

1gavé d'Amérique. C. † * de 50 c. à 3 f.

— Agavé panaché. C. † * de 75 c. à 4 f.

— A. sinensis — Rhus cacodendrum. se. Ellis. = R. succedaneum? L. = nis de la Chine. == Vernis du Japon. A. de 1 à 2 f. 25 c. vulgaris. Pers. = Betula alnus. L. = A. visqueux. = Verne. Prov. G. A. de 75 c. à 2 f. Sune à seuilles découpées. B. de 2 à 3 f. incana. L. = Aune blanchatre G. A. de 1 à 2 f. 50 c. etula serrulata. Ait. == B. rugosa. du Roi. de 2 à 3 f. en scie. A. Alysse jaune == Corbeille d'or. † C. de 30 à 75 c. de 50 c. à 1 f. sse épineux. †. C. rpha frutiqueux.== Indigo būtard G. B. de 50 c. à 2 f.
pseudo-anis. — Amorpha glabre C. de 2 à 3 f. == Amandier commun. (vide pag. 4.) de 40 à 60 f. 010 Amandier à fruit amer. G. A. Amandier à coque tendre. G. A: de 75 c. a 1 f. le péche. G. A. lier nain des Indes. C. de 75 c. 2 1 f. argentea. Lam. = Amandier argenté. B. de 75 c. à 1 f. r. (vide pag. 6.) G. B. de 40 c. à 1 f. Imendier de Sibérie. C. Schinus dependens. Orteg. = Amyris

* B. de 2 à 4 f. at. = Bois puant. G. * † B. de 75 c. az f. **▲**ndromeda

C. † de 1 à 3 f
- Caliculata. L. = A. Caliculée. C. † de 2 à 3 f.
— Lucida, — A. coriacea. Ait. — A. nisida, Bartram. — A.
myrtifolia. Hortul. = Andromede luisante. C. † de 2 à 3 f.
— Mariana. L. = Andromède du Maryland. C. de 2 à 4 f. — Polifolia. L. = Andromède d feuilles de germandrée C. †
de 1 à 2 f.
b. Latifolia. = Andromède à larges feuilles. C. † de 1 à 2 f.
- Race osa, Lam. = A. paniculata, Walt. = Andromède à
grappes. C. de 1 à 2 f.
Annona triloba. L. — Orchidocarpum arietinum. Mich. — Porcella triloba. Pers. — Asiminier. — Corossol. B. de 6à 10 f.
Anthyllis barba jovis. L. Anthyllide argentée = Barbe de Jupiter.
† C. 1 å 2 f.
— Cytisoides. L. = Anthyllide à fleurs de cytise. = A. faux-
cytise † C. de 1 à 2 f.
— Hermaniz. L. = Aspalanthus eretica. = Anthyllide d'orient. G. C. de 1 à 2 f.
Aralia spinosa. L. = Angélique épineuse. = A. en arbre C. de 1 à 3 f.
Arbutus andrachne. L. = Arbousier du levant. = A. à panicules.
* + B. G. ' de ç à 15 f.
- Unedo. L. Arbousier fraisier en arbre. * † B. G. de 75 c. à 2 f.
b. Flore rubro. = A. d fleurs rouges. * † B. de 2 d 4 f. - Uva ursi. L. = Marania uva ursi. Desv. = Arctostaphyllos.
Adanson. = Arbousier Busserole. = Raisin d'Ours. † C.
de (o c. à 2 f.
Aristolochia sempervirens. = Aristoloche toujours verte C. † § *
de 1 à 2 f.
- Sipho. At. = A. macrophylla. Lam. = A. frutescens. Marsch. Aristoloche d grandes fleurs B. \$ de 2 2 3 f.
Aristoloche à grandes fleurs B. \$ de 2 à 3 f. Aristotelia mcqui. L'Hérit. = Maqui du chili. * B. de 2 à 4 f.
Armeniaca vulgaris. Lam. — Prunus armeniaca. L. — Abricotter
commun. G. B. de 60 c. 1 f.
b. Macrocarpa. H. P. A. percicoides. Pers. = Abricotier
peche. G. B. de 60 c. à 1 f. 25 c. c. Nigra. H. P. A. dasycarpa. Pers. A. atropurpurea.
Duh. ed. nov. = Pru us dasycarpa. Ehrh = Abricotier d
fruit noir. = A. de Bruxelles. Dum. Cours. = A. du Pape.
== A. violet. G. B. de 1 à 1 f. 50 c.
d. Persicxfolia. Duh. ed. nov. = Abricotier noir d seuilles
de pécher, B. de 1 à 2 f. Brigantiaca Pers. Prunus Brigantiaca Vill. Prunier
de Briançon, Duh. ed. nov. = Abricotier de Briançon G.
B. de 50 c. a 1 f.
Artemisia abrotanum. L. = Armoise aurone. = Citronelle † C.
Arundo donay. L. = Roseau des jardins * B. de 25 à 75 c.
Arundo donay. L. = Roseau des jardins * B. 25 c. b. Variegata — d feuilles panachées * B. de 50 à 75 c.
Asclepias fruticosa. L. = A. glabra. Mill. = Asclépiade à feuilles
de saule. * † C. G. de 50 à 75 c.
Asparagus acutif lius. 1. = A. corruda Vill. = Asperge d seuilles
aigues * † C. G. de 50 à 75 c. Aster carolinianus. Willd. A. scandens. Balbis A. serotinus.
Hort. Telon. = Aster de la caroline. de 75 c. 1 f. 50 c.
Astragalus massiliensis. Lam. = A. tragacantha. = Astragale
burbe de Renard. C. de 1 à 2 f.
Atragene alpina. — Clematis alpina. Lam. — Atragene des Alpes. G. de 1 à 2 f.
Ait. = Atragené de Mahon. §. de 1 à 2 f.
— Cirrhosa. Pers. = Clematis cyrrhosa. L. = Clematite d
vrilles. S. de 2 h 3 f.
Atraphacis spinosa L. = Polygonum frutescens. Dum. Cours. = Atraphace épineuse G. † ? C. de 1 à 2 f.
Atriplex halimus. L. Arroche frutiqueuse. = Pourpier de mer.
G. » † de 5 à 20 f. 010
- Portula oides. L. = Arroche pourpière. » † 50 c.
Aucuba japonica. L. = Aucuba du Japon. * † de 1 à 4 f.
Azalea glauca, Willd. = Azalée. Glauque. C. de 3 à 5 f. Nuditiora. L. Azalée à fleurs nues. C. de 2 à 4 f.
b. Carnea. = Azalée d fleurs carnées. C. de 2 à 4 fr.
c. Coccines. — à fleurs écarlates. C. de s à 10 f.
- Pontica. Schreb. = A. arborea. = Azalee à fleure jaunes
= A. du Pont. C. de 3 à 6 f.

Azalea Viscosa. = Azalée visqueuse. C. Baccharis halimifolia. L. = Bacchante de virginie. = Senegon
en arbre. B. * † G.

Location de 50 c. à 1 f. 50 c.

Location L. = Conyza iveefolia. H. P. = Baccharis de feuilles d'iva. G. * C. Berberis ilicifolia? Willd. = Vinetier à feuilles de Houx. G. C. 1 f. = Vinetier de la Chine. G. C. 1 f. 50 c. = Vinetier commun.G. C. » de 10 à 75 c. - Sinensis. Desf. - Vulgaris. L. a. Rubra. - d fruit rouge. b. Violacea. — à fruit violet. 1 f. c. Asperma. — B. arbortiva. — Sans pepins. 1 f. 50 c. d. Canadensis. Desf. = V. Du Canada. G. » C. 50 c. Betula alba. L. Bouleau blanc. G. A.
b. Pendula drameaux pendants.
c. Verrucosa verruqueux. de 50 c. à 2 f. de 1 à 2 f. de I à 2 f. Lenta. L. = B. Carpinifolia. Ehrh. = B. Nigra. du Roi = Bouleau merisier. A. de 1 à 3 f. — Nana L. — Bouleau nain. C.

— Pubescens. Ehrh. — B. Broecembergensis. G. A de 1 à 2 f.

Bignonia capræolata. L. — Bignone orangée. * S. de 1 à 2 f.

— Catalpa. L. — C. rernifolia. Cav. — C. communis. Dum.

— cours. — C. syringifolia. Air. — Le Catalpa. G. A. de 1 à 2 f.

— Radicans. L. — Tecoma radicans. Juss. — Jasmin de Virginie. = J. à fleurs en trompette. §. de soarf. b. Minor. = Bignone de virginie d fleurs rouges. S. de 1 à 2 f. Broussonetia papyrifera L'Hérie. — Morus papyrifera. i. — Márier de la Chine — márier d papier. (male et femelle.) G. A. de i à 3 f. Brunnichia cyrrhosa. Gært. = Brunnichia à vrilles S. de I à 2 f. Budleia globosa Lam. Budleje globuleux. * † de 1 à 2 f. Bumelia tenax. W Sideroxylon tenax. L. = S. Chrysophylloides. Mich. = Chrysophyllum carolinense, Jacq. Argan dore. = Bois de fer. G. * B. de i à 4 f: - Lycioides, = Sideroxylon lycioides. L. = S. læve. Walt. = Argan à feuilles de saule = Bois laiteux du Mississipi. G. * B. de rasf. Buphthalmum frutescens. L. = Buphthalme de Virginie. = B. Arbrisseau. + de soà I f. Buplevrum fruticosum. L. Buplèvre frutiqueuse. = B. d'Ethiopie. G· * C. de socaif. b. Angustifolia. = var. à feuilles étroites.
Spinosum. L. = Buplèvre épineux. * C. de I a z f. Buxus balearica. Lam. = Buis de Mahon. * + B. de 75 c. à 2 f. = Buis commun. † B. Sempervirens L. b. Arborescens. Lam. = Buis en arbre. - Variegata. = Buis panaché. † C. de 50 c. à 1 f. 50 c. c. Angustifolia. Mill. = Buis à feuilles de myrthe. † de 1 à 2 f. d. Suffruticosa. Lam. = Buis nain. = B. d'Artois. = B. d bordures. Callicarpa americana. L. = Spondylococcos. = Burchardia. Duh. = Johnsonia americana. Mill. = Anonymus baccifera. Pluk. = Callicarpe d'Amérique. G. * C. de 1 à 3 f. Calycanthus ferax. Mich. C. fertilis. Walt. = C. lævigatus. Willd. = Calycanthe fertile. = C. à feuilles lisses. * C. de 1 à 4 f. Floridus. L. = Basteria. Mill. = Buttneria. Duh. = Beureria. Erhet. = Calycanthe de la Caroline. = Pompadour. = Arbre aux annemones. B. de 1 à 3 f. - Nanus. Cels. = C. oblongatus? Ait. Calycanthe nain. C. de 1 44f. - Precox. L. = Calycanthe du Japon. = C. précoce. * B. de 1 à 4 f. Capparis spinosa. L. = Caprier cultivé. = C. Commun. G. * C. de 40 c. à 1 f. Carrgana. (Vide Robinia) Carpinus betulus = Charme commun = Charmille G. » A » C. de 4 f. le 010 à z f. pièce. b. Quercifolia. H. P .= Charme à feuilles de chéne A. de 1 à 3 f. Ostrya. I. . = Ostrya vulgaris. Willd. = Charme à fruits de houblon. G. A. de 1 à 2 f. de houblon. G. Á. Virginiana. Lam. - Ostrya virginiana. Willd.: = Charme de Virginie. A. de 1 à 3 f. Cassia corymbosa. L. = C. falcata. Hortul. = Casse de Buenos-Ayres. + * G. de 50 c. à 1 f. Ceanothus americanus. L. = Ceanothe d'Amérique. de 1 à 2 f. Celastrus pyracauthus. Lycium Ethiopicum. Comm. C. * † 1 à 3 f.

4

Oelastrus Scandens. L. = C. punctatus? Thumb. = Celastre gri pant. = Bourreau des Arbres G. S. de 1 à 2	m
Celtis australis. = Micocoulier de Provence. = Alisier. vui	lg
— Falabreguier. Prov. G. A. de 1 à 2 — Cordata, H. P. = C. crassifolia. Lam. = Micocoulier	6
feuilles en cour G. A. Occidentalis, L. = Micocoulier de Virginie. = M. d'Am	ŀ.
rique. G. A. de 1 à 2 f. 50 — Orientalis. Mill. = C. tournefortii. Lam. = C. lutea. Pei	C
Micocoulier du levant. * B. de 2 à 2	f
— Sinensis. Pers. = Micocoulier de la Chine. * B. de 3 à 5 Cephalanthus occidentalis. L. = Céphalanthe d'Amérique. = Bo	ii
bouton. C. de 1 á 3 Cerasus avium. Manch. = C. nigra. Mill. = C. Sylvestris	f. J.
Bauh. — Prunus c. avium. L. Cerisier-merisier. (via	le
b. Flore pleno. = Merisier d fleurs doubles. de 75 c. à 1 f. 50 c. Bigarella, H. P. = C. duracina. D C. = Bigarreautie	c.
A. de 40 c. à 1 f. 25	c.
d. Juliana D C. = Guigner. A. de 40 c. a 1 f. 25 — Caproniana. D C. = C. vulgaris. Mill. Prunus. Cerasus. L. =	c. =
Cerisier commun. = C. vulgaire. (vide pag. 4.) A. b. Flore pleno. = Cerisier à fleurs doubles. A. de 75 c. à 1 f. 50	c.
c. Suavissima. H. P. = Cerisier Royal. = Cherry-Dub. Duh. A. de 40 c. à 1 f. 25	e.
d. Ruberrima, H.P. Cerisier de Montmorency, de 40 c. à 1 f. 25	c.
e. Polygyna, N. = C. racemosa hortensis. Bauh. = C. plun ferens. J. Bauh. = cerisier à bouquet. A. de 50 c. à 1 f. 50	c.
- Bracteata. Lois. Ined. = Padus bracteata. = Cérisier bractées. G B de 1 à 2	f.
- Chamæcerasus. Duh. ed. nov. = C. pumila. Bauh. = Prum chamæcerasus. Jacq. = Cerisier à feuilles luisantes. = C	15
nain de Sybérie. G C de 1 à 2 : Laurocerasus. Duh. ed. nov. Prunus laurocerasus. L.	f.
Padus laurocerasus. Mill. = Cerisier laurier-cerise. = 1	١.
amandier. G † B b. foliis argenteo maculatis. Laurier cerise panach	ė.
de 2 à 2 :	f.
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus Iusitanica. L. Padu Iusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de	s:
Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padu lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. » † B 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	:s :s f.
— Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padu lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. » † B 2 2 4 4 4 — Mahaleb. mill. — Prunus odorata. Lam. — P. Mahaleb. L. — Cerisier de Ste. Lucie. — Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 f	:s :s :.
— Lusitanica. Duh. ed. nov.	18 : S. E. E. E. F.
de 2 à 3 Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 à 4 Maltaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 f b. fructu luteo. Mahaleb d fruits jaunes. I à 2 f Nicotianefolia. Pall. C. Decumana. De Launay. Cerisie de quatre d la livre. Guigner d feuil. de tabac. B I f. 50 à 3 Padus. D. C. Prunus padus. L. P. racemosa. Lam	is is fire to the fire to
Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padus lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. »† B — Mahaleb. Mill. — Prunus odorata. Lam. — P. Mahaleb. L. — Cerisier de Ste. Lucie. — Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 f. b. fructu luteo. — Mahaleb à fruits jaunes. — 1 à 2 f. — Nicotianœfolia. Pall. — C. Decumana. De Launay. — Cerisie de quatre à la livre. — Guigner à feuil. de tabac. B I f. 50 à 3 f. — Padus. D. C. — Prunus padus. L. — P. racemosa. Lam. — P. rubra. — Padus avium. Mill. — P. theophrasti. Dalech — Cerisier d grappes. — Merisier d grappes. — Laurier	15 : s. f. r. f. i
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. » † B 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	is is fire to the control of
Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padu lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. » † B — 2 à 4 4 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	is is fine for the first terms of the first terms o
— Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padu lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. » † B 2 4 4 4 5 4 6 6 Portugais. » † B 2 4 4 6 6 Portugais. » † B 2 4 4 6 6 Portugais. » † B 2 4 4 6 6 Portugais. » † B 2 4 4 6 6 Portugais. » † B 2 6 7 Portugais. — Prunus odorata. Lam. — P. Mahaleb. L. — Cerisier de Ste. Lucie. — Bois de Ste. Lucie. G. » A 50 C. à 2 6 8 6 fructu luteo. — Mahaleb di fruits jaunes. — 1 à 2 6 7 Portugais. Pall. — C. Decumana. De Launay. — Cerisier de quatre de la livre. — Guigner deuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 1 9 Padus. D. C. — Prunus padus. L. — P. racemosa. Lam. — P. rubra. — Padus avium. Mill. — P. theophrasti. Dalech. — Cerisier de grappes. — Merisier de grappes. — Laurier putiet. — Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 C. à 1 f. 15 7 0 Portugais. — de feuilles panachées. G B 1 à 3 6 0 Persicoefolia. Duh. ed. nov. — Prunus persicoefolia. H. P. — Cerisier de feuilles de pécher. A 2 à 3 6 Pumila. Mich. — Cerasus Canadensis. Mill. — Prunus pumila. L.	
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 4 4 4 4 4 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	is is the entire to the entire
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 4 4 4 4 4 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	is is a second of the second o
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padus lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 ½ ¼ ¼ 1 2 ½ ¼ ¼ 2 ½ ¼ ¼ 2 ½ ¼ ¼ 2 ½ ½ ½ 6. Mahaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 ½ ½ b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ 6. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ 6. Micotianœfolia. Pall. C. Decumana. De Launay. Cerisie de quatre à la livre. Guigner à feuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 ½ 6. Prunbra. Padus avium. Mill. P. theophrasti. Dalech Cerisier à grappes. Merisier à grappes. Laurier putiet. Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 25 € 6. rubra. Cerisier à grappes rouges. 25 c. à 2 ½ € 6. Variegata. de feuilles panachées. G B 1 à 3 ½ 6. Persicœfolia. Duh. ed. nov. Prunus persicœfolia. H. P. Cerisier à feuilles de pécher. A 2 à 3 ½ 6. Pumila. Mich. Cerasus Cansdensis. Mill. Prunus pumila. Ecrisier nain. Ragoumenier. Nega. Minel d. Canada. G C 50 c à 2 ½ 6. Sempersforens. D C. C. racemosa. Bauh. Prunus sem persforens. Willd. P. Serotina. Roth. Cerisier toujour fleurissant. C. de la Toussaine. C. d la feuille. C. d.	sselent of the selection of the selectio
Lusitanica. Duh. ed. nov. — Prunus lusitanica. L. — Padu lusitanica. Mill. — Laurier du Portugal. — Azazero de Portugais. » † B 2 4 4 4 4 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	set and a set of the s
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 ½ ¼ ¼ ¼ Mahaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 ½ ½ b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ 6 ½ fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ Mahaleb. L. Micotianœfolia. Pall. C. Decumana. De Launay. Cerisie de quatre à la livre. Guigner à feuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 ½ Padus. D. C. Prunus padus. L. P. racemosa. Lam P. rubra. Padus avium. Mill. P. theophrasti. Dalech Cerisier à grappes. Merisier à grappes. Laurier putiet. Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 25 € 0. rubra. Cerisier à grappes rouges. 25 € c. à 2 ½ € 0. variegata. 4 feuilles panachées. G B 1 à 3 ½ € 1 € 1 ½ ½ € 1 € 1 ½ € 1 € 1 ½ € 1 € 1	is a file of the second of the
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 ½ ¼ ¼ Mahaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 ½ ½ b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ Mahaleb. L. Micotianœfolia. Pall. C. Decumana. De Launay. Cerisie de quatre à la livre. Guigner à feuil. de tabac. B I f. 50 à 3 ½ Padus. D. C. Prunus padus. L. P. racemosa. Lam P. rubra. Padus avium. Mill. P. theophrasti. Dalech Cerisier à grappes. Merisier à grappes. Laurier putiet. Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 15 € 0 d. rubra. Cerisier à grappes rouges. 25 c. à 2 € c. Variegata. de feuilles panachées. G B 1 à 3 ½ € Persicœfolia. Duh. ed. nov. Prunus persicœfolia. H. P Cerisier de feuilles de pécher. A 2 à 3 ½ € Pumila. Mich. Cerasus Canadensis. Mill. Prunus pumila. Ecrisier de feuilles de pécher. Nega. Minel de Canada. G C 50 c à 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c à 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c à 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c à 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel de Canada. G C 50 c a 2 € 0 c. Minel	is a section of the s
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 ½ ¼ ¼ Mahaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G » A 50 c. à 2 ½ ½ b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ 6 b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 ½ 6 m. Nicotianœfolia. Pall. C. Decumana. De Launay. Cerisie de quatre à la livre. Guigner à feuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 ½ Padus. D. C. Prunus padus. L. P. racemosa. Lam P. rubra. Padus avium. Mill. P. theophrasti. Dalech Cerisier à grappes. Merisier à grappes. Laurier putiet. Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 25 € 0. rubra. Cerisier à grappes rouges. 25 c. à 2 ½ € 0. variegata. de feuilles panachées. G B 1 à 3 ½ € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €	is is a first that a second of the second of
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 4 4 4 4 5 4 4 6 Portugais. "† B 2 6 P. Mahaleb. L. — Cerisier de Ste. Lucie. — Bois de Ste. Lucie. G 3 A 50 c. à 2 6 p. fructu luteo. — Mahaleb di fruits jaunes. I à 2 6 P. Micotianoefolia. Pall. — C. Decumana. De Launay. — Cerisie de quatre de la livre. — Guigner deuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 1 P. Padus. D. C. — Prunus padus. L. — P. racemosa. Lam — P. rubra. — Padus avium. Mill. — P. theophrasti. Dalech — Cerisier de grappes. — Merisier de grappes. — Laurier putiet. — Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 25 c. b. rubra. — Cerisier de grappes rouges. — 25 c. à 2 1 c. Variegata. — deuilles panachées. G B 1 à 3 f. Persicœfolia. Duh. ed. nov. — Prunus persicœfolia. H. P. — Cerisier de feuilles de pécher. A 2 à 3 f. Pumila. Mich. — Cerasus Canadensis. Mill. — Prunus pumila. L. — Cerisier nain. — Ragoumenier. — Nega. — Minel de Canada. G C 50 c. à 2 f. 50 c. à 2	is is a few of the control of the co
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 6 5 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	is is a contract of the contra
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	ss se = C. C. T. C.
Lusitanica. Duh. ed. nov. Prunus lusitanica. L. Padu lusitanica. Mill. Laurier du Portugal. Azazero de Portugais. "† B Mahaleb. Mill. Prunus odorata. Lam. P. Mahaleb. L. Cerisier de Ste. Lucie. Bois de Ste. Lucie. G "A 50 c. à 2 f. b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 f. St. Martin. Cerisier de Ste. Lucie. G "A 60 c. à 2 f. b. fructu luteo. Mahaleb à fruits jaunes. 1 à 2 f. St. Martin. Cerisier de quatre à la livre. Guigner à feuil. de tabac. B 1 f. 50 à 3 f. Padus. D. C. Prunus padus. L. P. racemosa. Lam. P. rubra. Padus avium. Mill. P. theophrasti. Dalech Cerisier d grappes. Merisier d grappes. Laurier putiet. Faux bois de Ste. Lucie. G B 50 c. à 1 f. 25 c. b. rubra. Cerisier de grappes rouges. 25 c. à 2 f. c. Variegata. — d feuilles panachées. G B 1 à 3 f. Persiccéfolia. Duh. ed. nov. Prunus persiccéfolia. H. P. Cerisier de feuilles de pécher. A 2 à 3 f. Pumila. Mich. — Cerasus Canadensis. Mill. — Prunus pumila. L. Cerisier nain. — Ragoumenier. — Nega. — Minel d. Canada. G C 50 c à 2 f. Semperstorens. D C. — C. racemosa. Bauh. — Prunus pumila. L. — Cerisier nain. — Ragoumenier. — Nega. — Minel d. Canada. G C 50 c d 2 f. Serotina. — Prunus serotina. Roth. — Cerisier toujour fleurissant. — C. de la Toussaint. — C. d la feuille. — C. d. St. Martin. — C. tardif. B 1 à 2 f. Serotina. — Prunus serotina. Willd. — P. virginiana. Mill. — P. rubra Ait. B 1 à 2 f. Serotina. Mich. — Prunus virginiana. L. — P. rubra Ait. B 1 à 2 f. Serotina. — Prunus serotina. Willd. — P. sirginiana. Mill. — Cerisier tardif. B 1 à 2 f. Serotina. — Cerisier blanches. A 2 à 3 f. Siliquastrum. L. — Gainier commun. — Arbre de Judée. G A 5 f. Gestrum parqui. P. Herit. — C. Jamaïcence. Lam. — Cestreau d. Cestreau d. Cestreau d. P. P. Cestrum parqui. P. Herit. — C. Jamaïcence. Lam. — Cestreau d.	is is a control of the control of th

Cheiranthus scoparius. Willd. Giroflee des Canaries. G * † 50 c. à 1 f. b. Cameleo. D C. = Giroflée à fleurs changeantes. G * 50 c. à I f. 50 - Cheiri. = Girostée des Murailles.=Violier jaune. = Muret. à fleurs doubles orangées et ponceau. Var. idem, jaunes .= Baguette d'or. Chionanthus Virginica. = Chionanthe de Virginie. = Arbre de Neige. B Cissus ampelopsis. Pers. = Ampelopsis cordata. Mich. = Achit d feuilles en caur. § 75 C. & 2 f. Hederacea. Willd. = Ampelopsis. Mich. = Hedera quinquefolia. L. = Vitis hederacea. = Vigne vierge. = Achie grimpant. G S 25 C I f. Orientalis. Lam. = = Achit d'Orient. G* § de so c. a r f. Cistus albidus. L. = Ciste blanchatre. Badaffre. Prov. † * C G de 75 c. à 1 f. Crispus. L. = Ciste crépu. † * C de 75 c. à 1 f. Ladaniferus. L. = (iste ladanifere + * C de 2 à 3 f. C de 1 à 2 f. - Laurifoliis. L. = Ciste d feuilles de laurier. † * - Ledon Lam. == Ciste ledon, † * C de 1 à 2 f. 50 c. à 1 f. Monspeliensis. L. == Ciste de Montpellier. † * C G Purpureus. L. = C. creticus. Ait. = Ciste pourpre. +. *. C. de 2 à 3 6.
Salviæsolius. L. = Ciste d seulles de sauge + *. C.derà 2 f. Clematis flammula. L. = Clematite odorante. G. *. S. de 50 c. à f. Maritima L. = Clematite maritime. *. 6. de 50 c. à I f. Orientalis. L. == Clématite orientale. S. de 75 c. à 1 f. Viorna. L. = Clématite viorne. S. Virginiana. L. = Clématite de Virginie. S de z a z fa de 50 c. à i f. Vitalba. L. = Clématite des haies. = Herbe aux gueux. Vulg. b. Sylvestris.—Clém. des naies a seuis. comme de 1 f. 50 c. Viticella. L. — Clém. à fleurs bleues. G. S. de 75 c. à 1 f. 50 c. v. Pulchella. — Clém. d fleurs rouges. § de 1 50 c. d 2 f. d. Flore pleno. — Clém. d fleurs rouges doubles. §. de 2 d 4 f. Clethra alnifolia. L. = Clethra glabre. C. de 75 c. à 3 f. - Incana. Pers. = C. tomentosa. Lam. = C. pubescens. Ait. = C. alnifolia. Willd. = Cléthra blanchatre C. de 2 à 3 f. Cneorum tricoccoon. L. = Camelée d 3 coques. G. *. C. 50 c. à 1 50 c. Colutea arborescens. L. = Baguenaudier commun. G. B. 50 c. a 1 f. b. Hybrida. = C. intermedia. H. P. = Bag. hybride. G. B. de z à z f. Cruenta. L. = C. orientalis. Lam. = C. sanguinea. Pall. = C. humilis. Scop. = Baguenaudier du levant. C. 50 c. à 1 f. Halepica. Lam. — C. istria. Mill. — C. pocokii. Ait. = Bag. d'Alep. G. B. de 50 c. à 1 de 50 c. á I f. Comptonia asplenifolia. L'Hérit. Liquidambar asplenifolium. L. = Comptone à feuilles de cétérach. C. de 2 à 4 f. Conyza sordida. L. = Baccharis sordida. H. P. = Conyse d fleurs ternées. C. Coriaria myrtifolia. L. = Fustet des eorroyeurs. = Redoul d feuilles de mirthe. ». G. * C. de 25 c. à 1 f. Coris monspeliensis. L. = Coride de Montpellier. *. †. C. 50 c. Cornus alba. L. = C. tartarica. Mill. = Cornouiller d fruit blanc. de 50 c. à 1 f. Alternifolia. L. = Cornouiller à feuilles alternes. B. - Circinalis. L'Hérit. = C. rugosa. Lam. = C. virginiana. H. P. = C. tomentosa. Mich. = Cornoullier ride. B. 2. f. 50 c. Cœrulea. Lam. = C. ferruginea. H. P. = C sericea. Ait. = C. Lanuginosa. Mich. — C. rubiginosa. Eh. — C. amomum. Mill. = Cornouiller soyeux. = C. d fruit bleu. G. B. de 25 c. às f. - Florida. L. == Cornouiller de la floride. = C. à fleurs. B. Mascula. L. = C. arborea. = Cornouiller Mâle. G. B. b flava. = C. m. d fruit jaune. G. B.

2 f.
Paniculata. L'Hérit. = C. racemosa. Lam. = C. citrifolis H. P.
= C. albida. Villd. = Cornouiller à grappes B. 2 f. 25 c. Sanguinea. L. = Cornouiller sanguin. = Bois-punais. = Puine. ». B. b Variegata. = Cornouiller panaché. Stricta. L'Herit. = C. canadensis? H. P .= Cornouiller élance, G. B. Coronilla coronata. L. = C. montana. Scop. = Coronille couronnée.

Coronilla emerus. L. Securidaea. Hortul. Coronille des jardins, de 25 à 75 c.	
- Glauce. L. = Coronille glauque. = Trifolium. Vulg. +. » C. G. de 25 C. a f f.	
Juncea. 2. = Coronille effilée. *. †. G. C. de 75 c. à 1 f. 25 c. Valentina. L. = C. stipularis. Lam. = Coronille stipulaire.	
C. *, †, G. de 1 à 2 f. Coryllus avellana. L. = Noisetier. n. B. (Vide p.1g. 5.)	
a. Silvestris. = Noisotier des bois. ». B. 1 f. 50 c. la douz. b. Ovata. = N. à fruits allongés. B.	
c. Maxima. = C. grandis. = Noisetier à gros fruits. n. B.	i
d. Alba. — Noisetier blanc de Piemont. B. 3 f. la douz.	
Colurna. L. — C. bizantina. Seb. — Noisesier de Constantino- ple. A. de 1 f. 50 c. à 2 f. la pièce.	١
- Rostrata Ait. = Noisetier cornu. B. 2 f. la pièce.	
Tubulosa. Willd. = C. maxima. Mill. = Noisetier tubule. G. B.	
b. Rubra. = Noisetier à fiuit rouge. = Noix de St. Gratien. B. de 1 à 1 f. 50 c.	
Gratoegus amelanchier. Desf. = C: rotundifolia. Lam. = Mesp. Amelanchier. L. = Pyrus rotundifolia. Willd. = Aronia	
rotundifolia. Pers. == Amelanchier. G. C. de so à 75 c.	
- Arbutitolia, Lam Mesp. arbutifolia. L Pyrus arb. Willd Aronia arbutifolia. Pers Amelanchier d feuille d'ar-	
bousier. G. B. de 75 c. à 1 f. Aria. L. Pyrus aria. Willd. Sorbus aria. Crantz. Alou-	
chier de Bourgogne. = Drouiller. = Allier. = Alisier. A.	
b. Longifolia. == Alisier à longues scuilles. de 1 à 1 f.	ļ
- Chamœ-mespibus. Duh. ed. nov. = C. humilis. Lam. = Aronia chamœ-mespilus. Pers. = Sorbus frutivosa. Cranez.	
= Mesp. chamos-mespilus. L. = Alisier nain. = Faux nefflier. = Alisier du mont d'or. C. de 1 à 2 f.	l
- Latifolia. Lam. = Cratægus dentata. Thuill. == Pyrus latif.	l
Willd. Sorbus latif. Pers. Alisier de Fontainebleau. G. A. de 1 à 2 f.	l
b. Suecica. Air. — C. intermedia. Willd. — Pyrus intermedia. Ehrh. — Sorbus intermedia Pers. — Alisier de Suède. A.	
de 1 50 à 2 f. — Pyrifolia. Lam. — Pyrus arbutifolia. a. Willd. — Atonia	l
pyrifolia. Pers. = Amelanchier à feuilles de poirier. C. 1 à 2 f.	ı
Racemosa. Lam. = Aronia racemosa. Pers. = Amelanchier de Choissy. B.	l
b. Botryapium.—Pyrus botry. Villd.—Mespilus canadensis. L. — Amelanchier du Canada. B. de 75 c. à 1 f. 50 c.	
— Torminalis. L. = Pyrus torminalis. Willd. Sorbus tormina-	
lis. Crantz. = Alisier des bois. A. de 75 c. 2 f. Cupressus disticha. L. = Cyprès de la Louisiane. = C. chauve.	ĺ.
= C. à feuilles d'acacia. G. A. de 2 à 6 f. - Fastigiata. Mill. = Sempervirens. Willd. = Cyprès pyramidal.	
"". G. †. A. *. Horizontalis, Mill. C. expansa. Cyprés étalé. C. hori-	
zontal. = Cédre de Montpellier. *. G. †. A. de 50 c. à 2 f.	•
Thuyoïdes. 1 = Cyprès à feuilles de thuya. = Cèdre blanc. Thuya-cyprès. †. *. C. de 1 à 2 f.	
Cydonia communis. — C. vulgaris. Willd. — Pyrus cydonia. L. — Sorbus cydonia. Crantz.—Cognassier commun. (Vul. pag. 4.)	٠
b. Lusitanica. — Cognassier du Portugal. B. de 40 à 75 c. — Lagenaria. Duh. ed. nov. — C. Japonica. Pers. — Pyras japo-	
nica. Thumb. = Malus japonica. Dum. Cours. = Cognassier	
d fruit en gourde. *. C. de 3 à 6 f. Sinensis. Thouin. = Cognassier de la Chine. B. de 1 f. 50 à 3 f.	
Cynanchum erectum. L. = Cynanque droite. C. de 50 c. à 1 f. Cytisus argenteus. L. = Cytise argenté. *. C. de 50 c. à 1 f.	
- Austriacus. Jacq. = C. d'Autriche. C. de 1 à 2 f.	
— Biflorus? — C. glabes. L. F. — C. Sibiricus? F. B. C. 2 f. — Candicans. Lam. — C. monspessulanus. Tournef. — Genista	l
candicans. L. = Cytise blanchatre. = C. de Montpellier. G. *. C. †.	ĺ
- Capitatus, Jacq. = C. supinus? L. = C. hirsutus. Crantz. =	
— Complicatus. D C = C parvifolius, Lam = C divarigatus.	
L'Hérit. = Spartium complicatum. L. = Cytise d feuilles	l

Cytisus Telonensis. Lois. == Cytise de Toulon. *. C. · Laburnum. L. = Spartium laburnum. Cav. = Cytise des Alpes. C. a grappes. = Faux ébenier. = Aubours. G. A. 50 c. 22 f. b. Latitolia. Pers. = Cytise à larges feuilles. = C. à fleurs odorantes. G. A. de 2 à 3 f. c. Flore albo. = Cytise des Alpes d flours blanches. de 3 à 4 f.

Nigricans. L. = Cytise noirâtre. = C. d épis. C. de 1 f. 50 à 2 f. - Purpureus. Jacq. = Cytise pourpré. C. de 2 à 3 f. - Sessilifolius. L. = Spartium sessilifolium: Cav. = Cytise à feuilles sessilles. = Trifolium. des jardiniers G. C. de 50 à 75 c. = Cytise epineux. – Spinosus. Lam. == spartium spinosum. L. = de 75 c. a 1 f. Triflorus. l'Herit. = C. villosus. Pourr. = C. tertius. Clus. = Cytise d fleurs ternées. * † C. de r à 2 f.
Daphne collina. Smith. = D. sericea. Vahl. = D. olezfolia. Lam. D. buxifolia? = D. villoss. Hortul. = Laureole des collines * † C. de 3 à 4 f. - Gnidium. L. = Lauréole paniculée. = Garou = Saint-bois. de 75 c. 2 2 f. G. * † C. - Laureola. — Lauréole commune. — L. toujours verte. G. C. † - Mezerum. L. — Lauréole gentille — Mézéréon. — Boisde 50 c. a I f. gentil. C. b. Album. = Mézéréon à fleurs blanches. C. Decumaria barbara. L. = D. sarmentosa. Bosc. = de 2 & 3 f. = D. forsythia. Mich. = forsythia scandens. Walt. = Decumaria de Caroline. * C. de r à 3 f. Diervilla humilis. Pers. = D. lutea. H. P. = D. tournefortii. = D. acadiensis. Dum. Cours. = Lonicera diervilla. L. = Dierville d'Acadie. C. de 50 c. à 1 f. 50 c. Dillenia scandens. Willd D. humilis. Doun. D. turneræflora. Grawler. — D. volubilis, Vent. — hibbertia volubilis.

Andrews. — Dillénia sarmenteux. * † C. de 1 à 3 f. Diospyros calycina. N .== Plaquemenier à grandes fleurs. de 10 à 20 f. Lucida. N. = D. kaki. Hort. Telon. = Plaquemenier glabre. de 5 à 10 f. A. b. Augustifolia: N. = Plaquemenier à feuilles étroites. A. de 6 à 15 f. de 6 à 10 f. - Intermedia N. Plaquemenier hybride. A. - Kaki. L. F. = Plaquemenier figue caque. * de 3 à 8 fi - Locus. L. = Guaiacana. Tournef. = Plaquemenier d'Europe de 3 à 8 fr de 50 c. a i f. G. A. Virgini ma L. = Plaquemenier d'Amérique. G. A. de 50 c. à 3 f. Dirca palustris. L. = Dirca des marais. = Bois de plomb. = B. de cuir C. de 2 à 3 f. Dorycnium monspeliense. Willd. = D. suffruticosum. Vill. = D. parvislorum. Savi. — Lotus dorycnium. L. — Aspalathus dory. Lam. Dorynic fructescent.—Lotier digité. * C. 50 à 75 c. Eleganus angustifolia. L. — Ch lef. — Olivier de Bohéme. — Saule odorant. — S. de Paradis. A. de 75 c. à 2 f. de 1 à 3 f. Orientalis. L. == Chalef d'Orient. A. Empetrum nigrum. L. = Camarine d fruit noir. C. 2 f. Ephedra dist chya. L. = Ephedra à deux épis. S. - Altissima. Desf. = Ephedra élevé. * S. de 75 c à 2 f. de 2 14f. Erica arborea. L.= E. procera. Salisb. = Bruyère en arbre. * † B. de 1 à 3 f. – Cilieris. *L. == Bruyère ciliée*. - Cinerea. L. = E. mutabilis. Salisb. = Bruy. cendrée * + C. 2f. - Herbacea. L. = E. saxatilis. Salib. = E. carnea. Curt. = de 1 à 2 f. Bruyère précoce. Mediterranea. L. = E. lugubris. Salib. = Bruyère lugubre. * † C. Multicaulis Salib. = E. stricta. Willd. = E. viridi purpure Hortul. = Bruvere à tiges nombreuses. * † C. Multiflora. L. = Bruvere multiflore. * † C. 2 f. 2 f. - Scoparia. L. = E. fucata. Thumb. = Bruyere d balais * de 50 c. a 1 f. - Tetralix. L. = E. hotuliformis. Salib. = Bruyere quaternée. * † C. b. Rosea.
c. Alba.
Var. \{ \hat{a} \text{ fleurs roses.} \\ 2 \text{ f.} \\
Vagans. L. = F. vaga. Salib. = E. purpurascens. Willd. = Bruyère pourprée. = B. étalée. * † C.
Vulgaris. L. = E. Europea. = Calluna. = Bruyère com-= Bruyere commune. † C. de 50 t. à 1 f.

Euphorbia characlas. L. = Euphorbe à fleurs pourpres	= \
Titymale. == Chuscle, Prov. * † G. 50 C	.
— Dendroides. L. = Euphorbe arborescente. " C. de 1 a 2 f	٠ ٠
Evonymus atropurpureus. Jacq. = E. carolinensis. Marsch. =	=
Fuerin A Henre nournres. B. ue za 3 1	•
_ Latifolius. Mill. = Fusain à larges feuilles. = F. d'Autriche	• •
C D de 1 a 1	
- Vermicosus. Scop. = Fusain galeux. = F. verruqueux. 1	• '
tie I a 3 i	•
- Vulgaris. Pers. = E. europœus. L. = Fusain commun. =	=
Bonnet de Prêtre. G. B. de 25 c. a 1	
b. Fructus albo. = Fusain d fruit blanc. de 1 à 2	
Fagns castanea. L. = Castanea vulgaris. = C. vesca. Gart. =	-
Chataigner commun. A. (vide pag. 4)	ا ہ
— Pumila. L. — Castanea pumila. Lam. — C. americana. Bos — Chataignier nain d'Amérique. — Chincapin. C. 5 à 8	7
Sylvatica. L. Hêtre commun A. de 75 (. à 2	f.
- Sylvatica. L. = Hêtre commun A. de 75 (. à 2 b. Variegata. = Hêtre panaché. de 3 à 6	
c. Purpurea. H. P. = F. sanguinea. Du Roi. = Het	re
pourpre. de 3 à 6	f.
d. OEnea. Dum. Cours. = Hêtre cuivre. de 5 à 8	f.
e Cristota - Hêtre crête de con. de 5 d 8	f.
£ Asplenifolia. Hort. == Hêtre à teuilles de ceterach de 628	f.
Ficus carica. L. = Figuier cultive. A.* (vide pag. 4) de 50c. à 1 f. 25	c.
h Silves ris - Carrificular.	- 1
Fontanesia phillyrœoides La Bill. = Fontainese à feuilles de filari	×2.
+ 15. ae 50 a 1 1. 50	٠. _ا
Fothergilla alnifolia. L. = F. gardeni. Jacq. = Fothergile	a
feuilles d'aune. C. de 2 à 3	
Fraxinus acaminata. Lam. = F. americana. Willd. Fre	<i>""</i>
acuminé. = Frêne blanc. = F. de la nouvelle Angleter. de 1 à 2	
A.	,;; l
- Atrovirens. Hort. = F. atra. = F. crispa. Willd. = Frêne crép de 1 à 2	ř.
- Aurea Willd. = Frêne doré. B. de 1 à 2	
— Caroliniana. Lam. — Fréne de la caroline A. de 1 à 2	
- Elliptica. Bosc. = F. elliptique. A. de I à 2	
Excelsior. L. = Frêne commun. A. de 40 c. à 1 f. 50	c.
h. Argentea. = Frêne argenté. B. de 1 à 3	f.
e Inenides Frèue taspé. A. Qe I il 2	f.
d Nigricane - I rêne noiratre. = F. pyramidal. A. de I a 2	f.
e. Oxyphylla? Marsch. Frêne de Provence. G. A. de 1 a 2	Ι.
C Dandala - France paraceol 15. Ge 1 2 3	
8. Simpliciforia. Willd. = 1. heterophylla. Vant.	
g. Simplicifolia. Willd. = F. heterophylla. Vahl. = diversifolia. Air. = F. monophylla. Hortul. = Frênce fouille.	
feuilles survies A.	
h. Striata. Descemet. — Frêne strié. A. de 1 à 1 i. Verrucosa. — Frêne graveleux. — F. verruqueux. A. de 1 à 1	2 f.
Juglanditolia. Lam. = Fréne à feuilles de noyer. A. de 1 à	f.
Lentiscifolia. Desf. = 1. tamariscifoli ? l ahl. = F. halepen	is.
Herm. = Frêne à feuilles de lentisque. A. de 1 à 2	. f.
- Orong I - I'. florifera, Scop I. paniculata, Mul.	=
Ornus europæa. Pers. = Frene à fleurs. = F. polypéte	ılé.
A de la 7	. I.
Parvifolia, Lam.=F. à petites feuilles.=F. à mêche. A. 1 à	ı f.
Disting Mich == Frene a larges fruits. A. de 1 a 2	. r.
Polemoniifolia. Duh. ed. nov. = F. nan. H. P. = F. apen	ai-
Culata. Pers. — Frene nam. C. Fubescens. Lam. — F. epiptera. Mich. — F. villosa. Hort F. nigra. Du Roi. — Frêne pubescent. G. A. de 1 à 3 b. longifolia. — Frêne pub. à longues feuilles. de 1 à 3	-
F. nigra. Du Roi. = Frene puvescent. G. A. de l'a	, F
b. longifolia. = Frêne pub. à larges feuilles. de 1 à :	• f
c. Latifolia. = Fréne pub. à larges feuilles. de 1 à	ı f.
e. Latifolia. = Frêne pub. à taiges flentes. Rotundifolia. = Frêne de Calabre. = F. à manne. A. de 1 à : Sambucifolia. Lam. Frêne à feuilles de sureau. A. de 1 à : Tetragona. Mich. = Frêne bleu. = F. tetragone. A. de 3 à : Tetragona. de la canada + C. de 2 à :	f.
Sambucifolia. Lam. Frene a jeunite de settagone. A. de 3 a	6 f.
Gaultheria procumbens. 1. Gaulthéria du Canada. † C. de 2 à	3 f.
Garries unglica I == Genet anglican, T C. ue so a 7)	c.
The second of th	c.
	в.
. The star Confe d'Eon à flevre doub 1 à 2 f. so	c.
Monosperma, Lam. — Genét monosperme. * C. de 1 de . Pilosa. L. — Genét d feuilles de renouée. C. de 50 c. d 1 f. 2	ţt.
Pilosa. L. = Genet d feuilles de renouée. C. de 50 c. à 1 l. 2	5 C.
Scoparia. L. == spartium scoparium. L. == Gener somman.	_
Genet à balais, B. G. de 25 c. à 1 f. 2	, c.

genista Scorpius. D.C. = spartium. L. = Genista spinistora. Duk. ed. nov. Genet spinistore. † C. *
Tinctoria. L. Genet des Teinturiers. de so ci à I £ = Herbe à jaunir. C. † G. de 50 c. à 1 f. b. Sibirica. L. = Genét de Sibérie. C + G. de soc. à 1 f. - Sphærocarpa. Lam. = Spartium. L. = Genét sphærocarpe. de 2 2 3 f. Ginkgo biloba. L. = Salisburia adianthifolia. Willd. = Gingo d deux lobes. = noyer du Japon. = arbre aux quarante écus. de 3 à 10 f. Gleditsia macrocanthos. Desf. = Février d grosses épines. A. G. de 2 à 3 f. - Monosperma. Mich. = G. aquatica. Marsch. = G. carolinensis. de 2 à 3 f. Lam. = Fevier monosperme. A. de 1 à 2 f. - Sinensis. Lam. == l'évier de la Chine. A. G. b. Horrida A. G. de z a z f. Triacanthos. L. = G. spinosa. Duh. = G. meliloba. Walt. = Févier épineux. = F. d'Amérique. = Acacia de la de 1 à 2 f. 25 c. Passion. vulg. A. G. b. Latisiliqua. = Févier d'Amérique d larges siliques. A. G. de 2 à 3 f. Id. à siliques jaunes. A. G. e. Siliqua flava. === ,de 3 à 4 f. Globularia alypum. L. = G. fruticosa. Garid. = hippogio.sum valentinum. Clus. == empetrium phocoides. Dulech. == Globulaire turbith. † * C. de 1 à 2 f. de 1 à 2 f. Glycine frutescens L. = Glycine frutescente. = haricot en arbre. de 5 f. 50 c. a 2 f. Gnaphalium steechas L. = Elychrysum steechas. = Gnaphale citrine. † C. * de 25 c. à 1 f. Grewia occidentalis. L. = Greuvier occidental. * C. de 1 à 2 f. Gymnocladus canadensis. Lam. - hyperanthera dioica. Vahl. = Guillandina dioica. L. = bonduc. = Chiquier. = chicor. de 1 à 3 f. du Canada. A. Halesia tetraptera. — Halesie à quatre ailes. C. de 2 à 3 f. Hamamelis virginica. — Pistacia virginiana. Plub. — Humamelis de 3 à 5 f. de virginie. C. Helianthemum mutabile. Jacq. = Helianthême à fleurs changeantes. de soc. à 1 f. C. t 20 C. Hedera helix. L. = Lierre rampant. G. S. † de 1 à 2 f. b. Variegata. = Lierre panache. S. Hibiscus mutabilis. L. = II. sinensis. Mill. = Keimie rose de de Cayenne, vulg. C. *
Syriacus L. Ketmie des jardins. = Althea. B. G. de 25 à 75 c. de 5 à 25 t. à fleurs doubles rouges. b. Multiplex di fleurs doubles blanches. 75 à 1 f. (d fleurs doubles couleur de chair. à feuilles panachées. C. c. Variegata Hippophae rhamnoides. L = Argousier rhamnoide. = Griset. = Saule épineux. B. G. de 50 c. à 2 f. Hortensia opulo.des. Lam. = H. rosea. Desf. = H. japonica. Comm. = Hydrangea hortensia. Lort. Lond. = Hyd. hortensis. Willd .= Viburnum serratum. Thumb. == Primula mutabilis. Loureiro. = Hortensia. = rose du Japon. C. * de 75 c. à 4 f. Hydrangea arborescens. L. = H. vulgaris. Mich. = Hydrangee de i à z f de virginie. C. Nivea. Mich. = H. radiata. Walt. = H. glauca? = Hydrangle de z a 3 f. blanche. C. Quercifolia. Batram. = H. radiata. Smith. = Hydrangee d feuilles de chêne. C. de 3 . 6 f. Hypericum androscemum. L. = Millep. toute-saine. C.G. de 50 c. d 1 f.

Balearicum. = Millepertuis de Mahon. C. † * G. de 1 d 2 f. Calycinum. = Millepertuis à grandes fleurs. * C.d † de 1 à 2 f. Flatum? F. B. = Millepertuis élevé. C. de 1 à 2 f. - Hircimum. L. = Millepertuis fatide. C. G. de 50 c. à 1 f. Prolificum. L. = Millepertuis polifère. C. dé 1 à 2 f. Iberis semperflorens. L. = Ibéride de Perse. = Taraspi. = Tlaspi. C. de 25 c. à 1 f, Sempervirens. L. = Ibéride toujours verte. C. * † de 50 c. à 1 f.

đe 25 c. à 2 f. 1 Ilex squifolium. L. = Houx commun. B. G. † b. Fol. aureis. = Houx panaché de jaune. B. † de 2 à 4 f. c. Fol. argenteo maculatis. = H. panaché de blanc. B. de 2 à 4 f. d. Balearica. = I. heterophylla. = Houx de Madère. B. e. Echinata. = I ferox. = Houx herisson. B. † de 2 24 f. Variegata. = Houx herisson panache. B. + de 3 à 5 f. f. Serrata. Thumb. = Houx à dents de scie. B. † de 3 à 6 f. Cassine L. = I. Caroliniana. Mill. = I. Dahoon. Walt. = Houx. à feuilles de laurier. B. de 3 45 £ Prinoides. Ait, = I. decidus. Walt. = Houx d'été. = : H. a feuilles caduques. B. de 2 à 4 f. Vomitoria. Ait. __ I. ligustrina. Jacq. __ I. floridana. Lam. __ de 2 à 4 f. Cassine peragua. Mill. = Houx Emétique. = Thé du Paraguay. = Cassine toujours verte == yapon de virginie. == L'apalachine. + B. de 3 à 6 f. Itea virginica. Mich. = Itéa de Virginie: C de 1 à 3 f. Iva frutescens. L. = Kinkina du Mexique. C. * de 1 à 2 f. C + * de 25 à 75 f. Jasminum fruticans. L. = Jasmin d'Italie. Hunile. L. = Jasmin d feuilles de cytise. C. * de 50 à 1 f. Jkory. A. de 3 à 6 f. Cinerea. L. _ J. oblonga. Mill. = Noyer cendre. = N. d fruit visqueux. A. de 3 à 6 f. Fraxinifolia. Lam. = J. loevigata. Hortul. = Noyer d feuilles de Frêne. B. * de 3 à 8 f. Mucronata. Dum. Cours. . J. squamosa. Lam. . J. Sulcata.
Willd. . J. alba acuminata. Marsch. . Noyer écailleux. N. mucrone. A. Nigra. L. == Noyer d'Amérique. == N. noir. A. G. de 1 à 3 f. b. Angustifolia. — Nover noir à feuilles étroites. A. de 2 à 5 f. Olivætormis. Mich. — J. Cylindrica. Lam. — J. rubra. Gære. __ J. pecan. Mühlemb. __ J. angustifolia. Ait. __ Noyer pacanier. A. G. de 2 à 5 f. Regia. L. — Noyer commun. (vide pag. 6) A. de 50 c. à 2 f. b. Maxima. = J. cabalina. = J. macrocarpa. = Noyer a gros fruit. = noix de jauge. = N. de gands. A.G. 3 à 5 f. c. Serotina. H. P. = Noyer tardif. = N. des Miracles. = N. de la Saint Jean. A. G. de 1 f. 15 c. a 2 f. = N. de la Saint Jean, A. G. de 1 f. 25 c. 2 2 f. Juniperus communis. L. = Genevier commun + B. G. de 50c. 2 f. 25c. b. Suecica. = G. de Suede. + B. de 1 à 2 f. c. Montana. = J. Prostratu. = G. de Montagne. † B. 2 å 3 f.
Oxycedras, L. == Genevrier oxycèdre. == Cade. Prov. † B.
G. * de 75 c. å 1 f. 50 c. G. *

de 75 c. à 1 f. 50 c.

b. Drupacea. = G. ox. d gros fruits. + B. * de 2 a 3 f.

Phænicea. L. = G. de phænicie. = Cedre phænicien + B. de 1 2 2 f. de 3 à 4 f. b. Lycia. = Genevrier de lycie. + B. G. * Sabina. L. := Genevrier sabine. † B. de 75 c. 2 1 f. b. Cupressina. := G. Sab. a feuill. de cyprés. † B de 2 a 3 f. c. Tamariscifolia. = Sabine à fleuill. de Tamaris. † B. 1 2 2 f. d. Repens. = Sabine rampante. † C. de 1 à 2 f. e. Variegata. = Sabine panachée. † C. de 2 à 3 f. Thurifera, L. 1. hispanica, Lam, Genevrier d'Espagne, C'édre d'Espagne, B. † de 3 à 4 de 3 a 4 f. Irginiana. L. = J. Caroliana: Mill. = Genevrier cèdre de Virginie. A. † G. de 75 c. à 3 f. Justicia coccinea. Cav. = J. quadrifida. Vahl. = J. superba. H. Lond. = Carmentine écarlate. * C. G. de 1 à 3 f. de 2 à 3 Kalmia angustifolia L. = Kalmia d seuilles étroites. † C. de 2 à 3 s Glauca. Ait. = K. rosmarinifolia: Dum. Cours. = K. polifolia. Wangh. = Kalmia glauque. = K. de Miquelon † C. 224f. Latifolia. L. = Kalmia d larges feuilles † C. de 4 d 15 f. Oleifolia. Dum. Cours. = Kalmia polifolia? Hore. Angl. = Kalmie à seuilles d'olivier C. de 2 à 3 f. Keria japonica, flore pleno. D C. = Corchorus japonicus. L. C. Kælreutheria paniculata. Lam. = K. paulinoides. PHérit. = Sapindus paniculata, Dum. Cours. S. sinensis. L. Paulinia aurez. Savonnier paniculė. B. G. de 75 c. à 3 f. Lagerstreemia indica. L. = L. chinensis. Lam. * B. de 4 à 6 f.

Laurus benzoin. L. = L. pseudo-benzoin. Mich. = Laurier benjoin. de 2 4 6 f. Nobilis. = Laurier d'Apollon. = L. des guerriers : = L. franc. = L. d sauce " B. G. * = L. d sauce " B. G. * Ede 23 & 75 f. le 10 b. Latifolia. = Laurier franc d larges feuilles. + * B. de 75 c. à 1 f. c. Latifolia undulata = Laurier franc à feuilles ondulées. de 75 c. à 1 f. d. Angustifolia. = L. n. salicifolia. = Laurier franc e. Ovata. = L. pyrifolia. = Laurier franc d feuilles arrondies. † * B. de 2 4 4 f. f. Crispa. = Laurier franc d feuilles crépues * † B. 3 d 6 f. afras. L. = Laurier sassafras. B · Sassafras. L. = Laurier sassafras. B. Lavandula Spica. L. = L. latifolla. Vill. = D.C. = Lavande commune. = Aspic. † C. G. *
b. Angustifolia. N. = vraie lavande † C. G. 30 c. Stechas. L. = Stechas pedunculata. Mill. = Lavande stachade. de 50 à 75 c-Lavatera arborea. L. = Lavatère en arbre. † * G. 50 2. - Maritima. Gouan. = L. africana. Cav. = Lavatère maritime. † C. G. * de 75 c. à 1 f. Micans. L. == Lavatère brillante. * † C de 75 c. 1 f. Olbia. L. = Lavatère à feuilles pointues. * † C. G. de 75 c. à 1 f. Triloba. L. = Lavatere pluste. * † C. de 75 c. à 1 f. Ledum latifolium. = L. Groenlandicum. Retz. = = Ledier à larges feuilles. == The du Labrador, C. + de 1 à 3 f. Palustre L. = Ledier d feuilles étroites. C. + de I à 3 f. Ligustrum vulgare. L. Troëne commun. C.G. +? » 3 f. à 25 c. le 1 b. Album. = Troëne à fruit blanc. C. G. † ? de 50 à 75 c. Liquidambar styracifiua. L. = Xochiocotzo-quahuiel. Hernand. Liquidambar copal. = L. d'Amérique. A. de 2 16 f. Liriodendum tulipifera. L. = Tulipier de Virginie: A. G. de 1 à 10 f. b. Integrifolia. = Tulipier à feuilles entières A. de 6 à 10 f. Lithospermum fruticosum. L. = Anchusa arborea. = Buglossum fruticosum. Garid. = Anchusa angustifolia. Bauh. = A. Lignosior. Barr. = Gremil frntescent. de 75 c. à 1 f. Caprifolium. L. = Caprifolium hortense. = Chevre-feuille des jardins. † § G. de 30 à 50 c. Dioscoridis. Roubieu. = Chevre-feuille de Dioscoride. § † G. de so c. a i f. Dioica. Ait. = L. media. Murr. = L. parviflora. Lam. = L. glanca. Burgsdorf. — Caprifolium glaucum. — C. bracteosum. Mich. — Cheyre-feuille glauque. † S. de 1 à 2 f. Etrusca. Savi. Caprifolium Etruscum. = Chevre-feuille de Toscane. S. G.

Crate: Ait.

Caprifolium americanum. de 40 à 75 c. = periclymenum americanum. Mill. = Chevre-feuille toujours vert. Dum. Cours. — Chevre-feuille du Canada, Lam. † S. G. 50 à 75 f.
Periclymenum. L. — Caprifolium periclymenum. — Chevrefeuille des bois. S. G. de 30 à 50 c. b. Quercifolium. = Chev. à feuill. de châne. § de 50 à 75 c.
c. Serotinum. = Chev. à feuirs tardives. §, 50 c. à 1 f.
d. Germanicum. = Chev. à feuilles glabres §, 50 c. à 1 f.
Sempervirens. L. = L. coccinea. Pers. = Periclymenum sempervirens. Mill, = Caprifolium sempervirens. = Chevrefeuille écarlate = Chevre-feuille de Virginie. a. Foliis ovatis == Chevre-feuille écarlate à feuilles de 75 c. 1 f. 50 c. ovales. 9. + b. Foliis oblongis. = Chevre-feuille écarlate à feuilles oblongues. S. † 75 c. 1 f. 50 c.
Lonicera alpigena. L. = Xylosteon alpinum. = Camécerisier des Alpes. C. de 50 c. à 1 f. Coerulea. L. = Xyl. Coeruleum. = Camécerisier à fruit bleu. C. » G. de 30 c. 1 f. Xylosteum L. = Xylosteum dumetorum. = Camécerisier des haies. C. » G. de 30 c. à 1 f. a. Fruetu nigro. = Cam. des h. à fru. noirs. b. Fructu rubro. = Cam. des h. d fru. rouge.

Nigra. L. = Xylosteum nigrum. = Periclymenum rectum, Clus. = Camécerisier d fruit, noir C. de 1 à 2 f.
 Tartarica. L. = Xylosteon tartaricum, Pers. = Chevre-feuille de Tartarie = Camécerisier,

Lon. tart. a. Rosea. = Chevre-feuille de Tartarie à fleurs roses. C. de 40 c. à 1 f. b. Rubra = Chevre-feuille de Tartarie à fleurs rouges. C. de 75 c. à 1 f. 50 c. e. Alba. = Chevre-feuille de Tartarie à fleurs blanches. de 40 à 75 c. Lotus hirsutus. L. = Lotier velu. = L. Hémorroïdal. † C. G. de soc. a r f. Lycium afrum. = Jasmin d'Afrique. † * C. de 75 c. à 1 f. 50 c. Barbarum. L. = L. inerme. = Liciet jasminoïde B. §. ? G. de 40 à 75 c. = Ehretia - Boerhaaviœfolium. L. == L. heterophyllum. Murr. = de ragf. halimifolia. l'Hérit. = Lyciet glauque. B. Chinense. Lam. = Liciet de la Chine. C. de 75 c. à 1 f. — Europœum. L. — Liciet d'Europe. B.
Magnolia discolor. Vent. — M. obovata. Willd. de 40 à 75 c. = M. denudata. Lam. = M. purpurea. Curtis. = Magnolier discolore. B. de 3 à 10 f. - Glanca. L. = Magnolier glauque. = M. bleu. = M. de marais. = Arbre du Castor. A. de 5 à 10 f. Grandissora. L. = Magnolisr à grandes steurs. = Laurier Tulipier. A. + G. de 2 à 10 f. b. Elliptica. Ait. = Magnolier à seuilles Elliptiques. A. de 2 à 10 f. c. Obovata. Ait. = Magnolier à feuilles obovales. A. de 3 à 10 f. d. Lauceolata. Ait. == Magnolier à feuilles lanceolées. de 3 à 10 f. A. † 6. Ferriginea. = Magnolier à feuilles ferrugineuses. A. de 5 à 10 f. f. Crispa. Magnolier à feuilles crépues. A † de 10 à 15 f. · Umbrella. Lam. = M. Tripetala. = Magnolier parassol. de 6 à 12 f. Malus baccata. Desf. = Pyrus baccata. L. = Pommier cerise. = P. de Sibérie. = P. baccifere. B. G. de 50 c. à 2 f. Communis. B C. = Pyrus malus. L. = Sorbus malus. Crantz. == Pommier cultivé. (vide pag. 8)
a. Sylvestris. == Pommier sauvageon. de 3 à 5 f. le %. b. Sativa. = Pommier cultivé. A. (vide pag. 8) c. Prasomila. == Pommier de Reinette. d. Paradisiaca. = M. pumila. = Pom. nain de Paradis. e. Castanea == Pommier de chataignes. f. Calvilea. = Pommier de calville. g. Aplosa. = Pommier d'api. Id. Nigra. == Pommier api noir. de 75 c. à 1 f. Id. Variegata. = Pommier api panaché. de 75 c. à 1 f. - Coronaria. Mill. = Pyrus coronaria. L. = Pommier odorant. B. de zà 3 f. Dioïca. Duh. etl. nov. === Pyrus apetala? === Malus non florens. Bauh. = Pommier dioique. = Pommier sans fleurs et sans pepins. = Pomme figue? A. de 75 c. à 1 f. - Hybrida. Desf. = Pyrus prunifolia Willd. = M. sinemis: Horsul. = Cratægus cerasifolia. Mill. = Pommier hybride. = Pommier de Sibérie. = Nefflier de la Chine. B. G. de 75 c. à 2 f. - Sempervirens, Desf. = Pyrus coronaria. Wangenh. = Angustifolia. Ait. = Pommier toujours vert. B. If. 50 c. à 3 f. Spectabilis. Desf. = Pyrus spectabilis. Ait. = Pommier & bouqueti Pommier de la Chine à steurs doubles. B. 50 c. à 2 f. Upsula. = Pyrus Upsula ? F. B. = Pommier d'Upsal. 1 à 2 f. Medeola asparagoïdes. L. = Dracena medeoloïdes. = = Asparagus medeoloides, Thumb. == Médéole à larges feuilles. §. 1 à 2 f. Medicago arborea. L. == Luzerne arborescente. C. * † de 75 c. à 2 f. Melia azedarach. L. = Azédarac bipinné. Duh. ed. nov. = Lilas des Indes = Faux sycomore. = Arbre à chapelets. = Arbre-saint. * A. G. de 75 c. à 2 f. Sempervirens. Sw. = Azedarac toujour vern = = Lilas des Indes. * B. de rast. Melianthus comosus. Willd. = M. minor. Hortul. = Mélianthe velu. = Fleur de miel. + B. * G. de 1 à 3 f. Major. L. = Mélianthe pyramidal. † * B. 1 à 2 f. Memispermum canadense. L. Menisperme de Virginie. S. de 1 à 2 f. Menziesia polifolia. Juss. = Andromeda daboecia. L. = Erica dahoecii. Id. — Mentiesia à feuille de polium. † C. de 2 à 3 f. Mercurialis tomentosa. L. = Mercuriale cotonneuse. † * C. de 1 à 2 f.

Mespilus audiaris. Pers. = Craugus parvifolta. Willd. = C. uniflora? Du Roi. = C. Tomentosa. L. = Nefflier axillaire. == Pinchaw. B. de 1 à 2 f. Azarolus: — Cratægus azar. L. — Azérolier cultivé.
a. Fru. albo — Azérolier d fruit blanc. A. de 75 c. à 1 f. b. Fru. rubro. = Azérolier à fruit rouge. A. de so c. à 1 f. c. Monspellensis. = Arérolier sauvage. A. de 50 c. à 1 f. Corallina. H. P. = M. cordata. Mill. = M. acerifolia.

Burgsdorf. = Crateegus cordata. Air. = C. populifolia. Walt. = C. phœnopyrum. = Nefflier petit corail. B. G. de 1 à 2 f. Coccinea. H. P. = Cratægus coccinea. L. = Nefflier écarlate. de razf. Cotoneaster. L. = M. Tomentosa. Schleicher. = Nefflier cotonier. B. G. de 50 c. à 1 f. 50 c. Crus-galli. L. Mesp. lucida. Ehrh. Cratæg. crus-galli. = Nefflier ergot de coq. B. G. de 75 c. à 2 f. b. Splendens. Ait. == mesp. crus-galli ovalis. B. G. 1 à 2 f. Germanica. L. = Nefflier d'Allemagne. (vide pag. 5) a. Sylvestris. = M. Stricta. Ait. = Nefflier des bois. Meslier. A. b. Minor. F. B. = petit nefflier d'Allemagne. B. 75 c. 1f. c. Domestica. = M. macrocarpa. D C. = M. diffusa. Ait. = M. laurina. Bauh. = Nefflier cultivé. A. 50 à 75 c. d. Apyrena. D.C. = M. abortiva. Delaunay. = Neffier à fruit sans noyeaux. B. de 75 c. åi f. Japonica. Thumb. = Nefflier du Japon = Bibacier. + B. de ragf. Latifolia. Poir. = Nefflier d larges feuilles. B. G. de 1 à 2 f. Linearis. H. P. = Cratæg. crus-galli. e. Ait. B. G. de 1 a 2 f. Lucida. = Cratæg. pyracantifolia. Ait. = Nefflier luisant. B. G. de razf. Oxyacantha. Gort. = Cratoegus-ox. L. = Epine blanche A. G. n = Aubépine. = pine blanche A. G. n

b. Major. = Aubépine à gros fruit. A. G. de 50 c. à 1 f.
c. Aurea. = Aubépine à Guite fruit. c. Aurea. = Aubepine d fruit jaune. A. G. de 75 c. à 1 f. d. Rosea. = M. ox. nigra. = Aubépine d fleu s roses. A. de 75 c. à 1 f. 50 c. Id. Semi plena = Aubepine à fleurs roses semi doubles. В. de zázf. e. Plena. = Crat. oxyacanthoides. = Aubepine à fleurs doubles. B. de 75 c. à 1 f. 50 c. Prunifolia. H. P. = Nefflier à feuilles de prunier B. de 1 à 2 f. Punctata. Ait. = M. cuneifolia. Ehrh. = Nefflier ponetue. = Azérolier du Canada. A. G. de 75 c. à 1 f. b. Flava. = Azer. du Canada à fruit jaune. A G. 1 à 2 f. Pyracantha. L. = Neffier buisson ardent. B. † G. 50 c. à 1 f. 50 c. b. Multifera. = Buisson ardent nain à gros fruit. C. † 1 à 3 f. Sanguinea. Bosc. = Crat. sanguinea. Pall. = Cratæg. glandulosa. Ait. == Nefflier sanguin. B. Tanacetifolia. Poir. = M. pinnata. Dum. Cours. = Nefflier du levant. A. de 1 a 2 f. Tomentosa. Desf. = Nefflier tomenteux. B. de 1 à 2 f. Mimosa acanthocarpa. Willd. = M. aculeaticarpa. Orteg. = Acacie à fruits épineux. » * B. G. de 75 c. à 2 f. Julibrizin. L. = Acacia arborea. Forsk. = = Acacia de Constantinople. == Arbre de soie. A. * G. de i à 3 f. Morus alba. L. = Murier blanc. (vide pag. 5.) A. G. 75 c. à 2 f. 50 c. Constantinopolitana. Desf. = Murier de Constantinople. B. de 2 à 3 f. Italica. Desf: = M. rosea. = Múrier d'Italie. = M. rose. de 1 à 2 f. 50 c. A. G. Nigra. L. = Murier à fruit noir. = M. de présent. = M. de 3 à 6 f des Dames: A. G. Rubra. L. = Murier à fruit rouge. A. de z à 3 f. b: Canadensis. Lam. = Murier du Canada. A. de 2 à 3 f. Myoporum debile. Brow. = Pogonia debilis. Andrews. = Andrewsia debilis. Vent. + * B. de ràzf. Ellipticum. Brow. = Pogonia glabra. Andrews. = Andrewsia glabra. Vent. + * B. de 2 à 3 f. Myrica cerifera = Galet de la Louisiane. = Cirier de la Caroline. C. G. de 1 à 3 f. Gale. L. = Galé. = Piment Royal. C. de r à z f. Pensylvanica. Lam. = M. Carolinensis. Willd. = Cirier de Pensylvanie, = Arbre do cire. G. † B. de ras i.

Pinus altissima. L. = P. laricio. Desf. = Pin élevé. - P. de Corse. A. + G.

Cembra. L. = Pin de Siblrie. = P. Cembro. = Alviey.
A. †

Halepensis. Mill. = Pin d'Alep. = P. le Jérusalem. A. † G.

50 c. á I f.

50 c. à 2 f. 25

de lion. C. *

de 1 à ? f. | Pinus Inops. Lambert. = P. virginiana. Mill. = Pin chétif. = Pin de Jersey. † A:

Maritima. Lam. — P. pinaster. Willd. — P. silvestris. L.

P. maritima major. Duh. — Pin pinastre. — P. maritime. rà3f. Mitis. Mich. = P. variabilis. Willd. = P. Toeda. b. Poir. = Pin variable. † Mugho. Poir. = P. uncinata. D C. = P. montana. Mill. Pin mugho. = P. de montagne. = P. crin. = P. du
Briançonnois. = P. sufis. = Torche-pin. † A. 50 c. à 2 f. Pinea L. = P. Sativa. Bauh. = P. domestica. Math. = Pin pinier. = P. pignon. = Pin-bon. = P. cultive. A. + G. Strobus, L. = Pin du Lord Weymouth, = P. blanc du Canada. † A. G.
Sylvestris. L. = P. Genevensis. D C. = Pin sauvage.= 1 4 4 f. de Genève. † A. G. 50 c. & 2

b. Rubra. Mill. = Pin rouge d'Ecosse. † A. G. 1 à 3 Tæda. L. = Pin d'encens. † Variabilis. Lamb. = P. echinata. Mill. = Pin herisse. + A. Pistacia lentiscus. L. = P. massiliensis. Mill. = Lentiscus ex chio. Tournef. = Therebinthus lentiscus. Juss. = Pistachier lentisque. + B. G. * r a 2 f. Reticulata. Willd. = P. Narbonemis. L. = Pistachier dit de Narbonne. A. G. * Therebinthus, L. = P. vera, Mill, = Therebinthus vulgaris. Tournef. = Pistachier therebinthe. = Pudis. Prov. B. G. 50 c. à 2 f. Trifoliata. = P. vera. L. = P. macrophylla. Pers. = Therebinthus pistacia. == Pistachier du Levant. A. G. * 3 à 6 f. Planera Richardi. Mich. - Ulmus polygama. Rich. - U. crenata. Hort. Lugd. = Rhammus carpinifolius. Pall. = Planera de Hichard. A. Ulmifolia. Mich, P. Gmelini. Pl. aquatica. Pers, Planéra à feuilles d'orme. A. Plutanus acerifolia. Willd .= Platune d feuilles d'Erable. A. G. 1 à 2 f. · Occident ilis. L. = Platane d'Occident. = P. d'Amérique. A. G. b. Macrophylla. F. B .- Pl. d grandes feuilles. A. 2 à 4 f. Orientalis. L. = Platane d'Orient. A. G. Polygonum acetosæfolium. Vent. = Cocoloba Sagitifolia. Orteg. Renouce à feuilles d'oscille, §. *. Populus alba. L. = Peuplier blanc. = Abèle. = Ypreau franc Picard. = Aube. A. G. 50 c. a 2 f. b. Grisea. P. Canescens. IVilld. Grisard. A. 50 c. a 2 f. c. Nivea. Dum. Cours. = Bois blanc de Hellande. A. - Angulata. Ait. - P. Angulosa. Mich. = P. heterophylla. du Roi. = Peuplier de la Caroline. A. 1 à 2 f. Populus halsamifera. L. = P. Tacamahaca. Mill, = Peuplier baumier. B. 1 à 2 f. Fastigiata. H. P. P. pyramidalis. Ait. Peuplier d'Ha-lie. P. pyramidal. P. de Lombardie. A. 15 à 65 f. le % Grandidentata. Mich. Peuplier à grandes dents. A. 1 à 3 f. Græca. Ait. P. cordata: H. P. P. cordifolia. Hortul. Peuplier d'Athènes. P. à feuilles en cœur. A. 1 à 2 f. Heterophylla. L. = P. balsamifera? Mill. = P. argentea. Peuplier argenté. A.

Hudsoniana. Mich. = Peuplier d'Hudson. A.

Hudsoniana. Mich. = Peuplier d'Hudson. A.

Monilifera. Ait. = P. Caroliniensis. Moench. = P. Canadensis. Burgsdorf. = Peuplier du Ganada. A. 40 c. 1 f.

Nigra. L. = P. flexibilis. Koz. = Peuplier noir. = P. sauvage. = P. du pays. valg. A. Tremula. L. = Peuplier tremble. A. 20 à 50 f. le % 75 C. a 2 1. Tremuloides. Mich. = P. lœvigata. Ait. = Peuplier fauxtremble. A. Vimines. = P. Candicans, Ait. = Peuplier liard. = Grand Baumier. A. 1 à 2 f. Virginiana. L. = Peuplier de Virginie. A. 30 à 75 f. % Potentilla fruticosa. L. = Quinte feuille-arbuste. C. 50 c. à 1 f. 50 c. Prinos glaber. L. = Apalachine glabre. † C. 2 i 3 f. - Verticillatus. L. = P. Gronowil. Mich. = Apalachine d feuilles de prunier. C.

Prinus cerasilera, Willd. = P. mirobolana. Duh. ed. nov = P. ma-

```
rkima, Marsch. ... P. spinota. Walt. ... Prunier mirobolan. | Quercus tubra. Willd .... Q. Leevis. Walt. ... Chene ronge. A. 2 à 3fc
         Prunier cerise. == Prunier de Virginie. A. G.
                                                                         ı f.
Prume Demestica. L. = P. sativa. Fuch. = Prumier cultivé. (vide
                                                         40 c. à 1 f. 25 c.
           pag. 10.)
b. Juliana. = Prunier St. Julien.
            c. Damascena, H. P. = P. damas.
           d. Claudians. H. P. = Prune Reine-Claude.
                   id. Flore pleno. id. d fleurs doubles.
                                                                          I f:
           e. Cerea. H. P. Prune Ste. Cathérine.
f. Cereola. U. P. Prunier Mirabelle.
           g. Acinaria. H. P. Prune Cerisette.
h. Enucleata. — Prunier sans noyau.
i. Bifera. — Prunier qui porte deux fois l'an.
                                                                          ı f.
                                                                         If.
    Institus. L. = Prunier sauvage. = Crequier. = Prunes si-
blarellos. Prov. A. G. 50 c. à 1 f.
      Prostrata. Labill. = Amygdalus incana. Pall. = Prunier
         couché. C.
                                                                     2 å 3 f.
      Pygmoza, Willd. = P. Nigra. Ait. B. 1 f. 50 c. à 2 f. Sinensis. Pers. = Amygdalus pumila. L. = Prunier de la
         Chine. = Amandier à fleurs doubles. C.
                                                                75 C. à 2 f.
      Sphærocarpa. Mich.
     Spinosa. L. = P. Silvestris. Fuch. = Prunier épineux. = Prunelier épine noire. B. G. 25 à 50 c.
                                                                 25 à 50 c.
Psoralea glandulosa. L. Psoralee glanduleuse. * C. G. 50 c. a 1 f.
Ptelea trifoliata. 1. Ptelée d 3 feuilles. Orme de Samarie.

O. d 3 feuilles. B. C. 75 c. à 1 f. 50 c.
Dunica granatum. L. = Grenadier commun. (vide pag. 5.)

de 8 f. 70 d 50 c. pièce.
           b. Melitensis. = Grenadier de Malte. = G. d gros
                                    grains doux. * G. B.
           c. Multiplex. = Grenadier & fleurs doubles.
                                                                75 C. à 1 f.
           d. Alba. = Grenadier à fleurs d'un blanc jau-
nâtre. * C. G. 2 à 3 f.
  - Nana. L. = P. semperflorens. = P. Americana. = Grenadier
        nain. == Grenadier des Antilles. C. G. *
nain. = Grenadier des Antilles. C. G. * 2 à 4 f.
Pyrus amygdaliformis. Vill. = P. salicifolia. Balbis. A. G.
    · Communis. L. = Poirier commun. A.
           a. Pyraster. L. = Pyrus Silvestris. = Poirier des bois.
           b. Sativa. Tournef. (vide pag. 7 et 8.) 30 c. à 1 f. 25 c.
                Pompeiana. H. P. = Poirier de bon chrétien.
                Rufescens. H. P.
Liquescens. H. P.
                                                - de Rousselet.
      Var.
                                                    - de beurré.
                Pyramidalis. H. P.
                                                         cuisse madame.
Pyrus nivalis. Jacq. — Poirier des neiges. B. 1 à 2 f. — Pollveria. L. — P. polwilleriana. J. Bauh. — P. irregularis. Knoop. — Poirier de Polwiller. — Poire azérole. B. 1 à 2 f.
   - Salicifolia, Pall. = P. Silvestris orientalis. Tournef. = Poi-
   rier d feuill. de saule. A.

- Sinai. Desf.—Duh. ed. nov.—Poirier du Mont Sinai. B. 1 d 2 f.
Quercus alba. L = Chêne blanc d'Amérique. A.
                                                                    ı à 3 f.
          b. repanda. Mich. A.
  c. pubescens. Willd. A.

Bicolor. Pers. Q. Prinus tomentosa. Mich. A. 2 à 3 f.
   - Castanea. Willd. = Q. Prinus acuminata. Mich. A. 2 à 3 f.
    · Cerris. L. = Q. Crinita? Lam. = Chéne cerrus. A. 2 à 3 f.
   - Coccifera. L. = Chêne Kermès. = Avaou. Prov. † C. G.
C. † G. 50 c. à 1 f. So c. à 1 f. Fastigiata. Lam. = Chêne cyprés. = C. des Pyrénées. A.
                                                                    1 à 2 f.
  – Ilex, L. Chêne vert. == Yeuse. A. G. 🕇
                                                                 50 c. á 2 f.
       b. Integrifolis. = Q. Smilax. = Chene à feuill. entières.
                                                                    1 4 3 f.
   - Imbricaria. Mich. == Chêne imbriquê. A.
                                                                    3 à 4 f.
   - Macrocarpa. Mich. = Chêne à gros fruit. A. - Obtusiloba. Mich. = O. Stellata. Willd. A.
                                                                    2 4 4 f.
                                                                    2 à 4 f.
   - Prinus. Willd. A.
          b. Palustris. Mich. A.
   - Racemosa. Lam. = Q. Pedunculata. Ehrh. = Q. Fœmina.
du Rei. = Chêne blanc. A. G. 50 c. à 2 f.
                                                               50 c. å 2 f.
   - Robus. Willd. = Q. Sessilistora. Smith. = Chêne rouvre.
             A. G.
                                                               50 c. à 2 f.
           b. Lanuginota. Thuill. A. G.
                                                                    1 4 2 f.
```

b. Latifolia. Lam. = Chene rouge à larges feuilles. 3 å 5 f. 1 å 3 f. - Suher. L. = Chêne liège. A. G. † 1 3 f. - Toza. Bosc. = Q. nigra. Thore. = Q. Crinita. Var. Lam. Rhamnus alaternus. L. = Nerprun alaterne. = Filaria. Prov. » B. † G. * de s f. le % a I f. pièce. * B. † * B. † 75 c. à 2 f. e. Balearicus. H. P. == Alaterne de Mahon. * B. † - Alnifolius. l'Hérit.-Nerprun à feuilles d'aune. B. G. 1 à 3 f. - Alpinus. L. Nerprun des Alpes. B. 1 å 3 f. Catharticus. L. = R. solutivus. Dod. = Nerprun purgatif. B. G. 50 c. à 1 f. 50 c. Frangula. L. = Nerprun bourdaine. = Bourgene. = Bois à 50 c. a 1 f. = R. semperpoudre. == Aune noir. B. G. Hybridus. l'Hérit. == R. burgundiacus. H. P. = virens. Hortul. = Nerprun hybride. = Bourgene de Bourgogne. † B. de 1 à 3 f.
Infectorius. L. = R. Lycium. Scop. = Lycium gallicum.
Bauh. = Nerprun teignant. = Graine d'Avignon. vulg. C. G. de 1 à 2 f. Rhododendrum ferrugineum. L. = Rosage ferrugineux. C. † 1 à 3 f. Hirsutum. L. = Rosage des Alpes. = Laurier rose des Alpes. de 2 à 4 f. Maximum. L. = Rosage à larges feuilles. B. † de 1 à 4 f. b. Album. = Var. à fleurs blanches. B. † de 2 à 5 f. Rhododendrum ponticum. L. = Rosage du Pont. a. Purpurea. d fleurs pourpres. B. + de 50 c. a 3 f. Var. d fleurs roses. B. † de 1 à 4 f. d feuilles étroites. B. † de 2 à 4 f. b. Rosea. c. Angustifolia. (à feuilles panachées. C. † de 2 à 4 f. d. Variegata. Punctatum. Vent. = R. minus. Mich. = R. parvissorum Dum. Cours. = Rosage ponetué. C. † *
Rhodora canadensis. L. = Rhodore du Canada. C. de 3 à 8 f. de 3 à 4 f. Rhus coriaria. L. = Sumac des Corroyeurs. = S. à feuilles d'orme. = Rouvre. = Nerte. en Lang. B. G. de 50 c. à 1 f. Cotinus. L. = Cotinus coggyria. Scop. = C. coriaria? Dod. = Sumac fustet. = Bois jaune. = Arbre aux perruques. B. G. de 75 c. à 2 f. Glabrum. L. = R. viridiflorum. Hortul. = Sumac glabre. B. G. de 50 c. à 2 f. Glaucum ? Jacq. B. = Sumac glauque. Radicans L. - Toxicodendrum vulgare. Mill. - Sumac Tragant. = Arbre d la gale. B. G.

Toxicodendrum. L. = Toxicodendrum pubescens. L. =
Sumac vénéneux. = Arbre au poison. B. G. Typhinum. L. = R. virginianum. Mill. = Sumac de Virginie. S. amarante. B. G. de 15 f. 10 à 2 f. pièce. Vernix. L. Toxicodendrum pinnatum. Mill T. Carolinianum. Duh. = Sumac vernis. B. de z à 3 f. Viminale. Ait. = R. lanceum. Lin. = Sumac flexible. † * B. de 2 à 3 .. Ribes alpinum. L. = Groseiller des Alpes. = G. d fruit doux. C. G. 3 fr. la doux. C. G.

3 fr. la doux.

Diacantha? L. F. = Groseiller à deux épines. C. de 1 à 2 f.

Floridum l'Hérit. = R. Pensylvanicum. Lam. = R. americanum. Mill. R. am. nigrum. Moench. Groseiller de Pensylvanie. C. G. de 75 c. à 1 f. 50 c. de 75 c. à 1 f. 50 c. Grossularia. L. = Groseiller épineux. = Epine d'Angleterre. C. n G. de 20 à 60 c. b. Uva crispa. L. = Groseiller à fruit velu. C. » G. 20 C. Nigrum. L. = Groseiller à fruit noir. = Cassis. = Poivrier. C. G. de 2 f. 40 c. la douz. – Petrœum. Jacq. = Groseiller de roche. = Corinthe. C. 1 à 2 f. Rubrum. = Groseiller à grappes rouges. (vide pag. 5.) C.
G. de 10 f. % 40 c. pièce. b. Album. = Groseiller à fruit blanc. = Groseiller perlé. C. G. de 25 à 50 c. Robinie

Rob	inha altegana. l'Hérit. = Caragana altagana. = Robinier de la Daurie. B. G. de 2 à 3 f.
	Caragana. L. = caragana sibirica. Roy. = C. arborescens. Lam.
	= Aspalathus arborescens. Anm. = Acacia de Sibérie.
	= A. d fleurs jaunes, = Arbre aux pois des Russes, B. G. de 50 c. d 1 f. 50 c.
_	Chamlagu. Ait. == Caragana ehamlagu. = Robinier de la Chine.
	= Caragan de la Chine. C. de 2 à 3 f.
	Dubia, Journ. de Bot, = R. hybrida, N. = Robinier hybride. A. G. de 2 à 3 f.
<u> </u>	Frutescens. L. = Caragana digitata. Lam. = C. frutescens. =
	Robinier frutescent. C. de z à 3 f.
-	Halodendrum. L. F. = Caragana nalodendr. = Robinier satiné, = Caragan argenté. C. de 1 à 3 f.
	Hispida. L = Acacia rose. = A. Framboisier. B. de 1 à 2 f. Pigmeea. L. = Robinier. = Caragan pigmé. C. de 2 à 3 f.
	Pigmæa. L. = Robinier. = Caragan pigmé. C. de 2 à 3 t.
_	Pseudo-acacia. L. — Robinier faux acacia. — Acacia blanc. — Carrouge des Americains. — de 75 c. à 2 f.
	a. Macrocantha. N. = Robinier à grosses épines 2 f.
	b. Tortuosa. D.C. = Robinier tortueux de 1 à 3 f.
	c. Spectabilis. Dum. Cours. = R. inermis. DC. = Robinier elegant. — Agapanthe. de 1 à 3 f.
	d. Crispa. N. = Robinier crépu. de 2 à 3 f.
	e. Novo. Jacq. B. = Robinier d feuill. de Sophora. 2 à 3 f.
	Spinosa. Ait. == Caragana ferox. == Robinicr hérissé. C. de 1 à 3 f.
	Umbraculifera. D C. = R. inermis. Dum. Cours. = Robinier
	Acacia parassol. B. A. de 75 c. à 3 f. Viscosa. Mich. = R. montana. Bartram. = R. Glutinosa.
	Curt. = Robinier visqueux. = R. glutineux. A. G. 1 a 3 f.
Rosa	Curt. = Robinier visqueux. = R. glutineux. A.G. 1 à 3 f. alba. L. = Rosier blanc. B. G.
	b. Multiplex. = R. blanc à fleurs doubles. de 25 c. à 1 f. c. Cœlestis. = R. blanc celeste. de 2 à 3 f.
	d. Carnea. = Rosa incarnata. Pers. = Rosier cuisse
	de Nymphe. de 1 à 2 f.
_	Alpina, L. = Rosier des Alpes. B. de 50 c. à 1 f. b. Lagenuria. Vill. = Rosier d fruits en gourde. de 1 à 2 f.
	c. Pyrenaïça. Gouan. = R. hispida. Krock. = R. pimpi-
	nelifolia? Vill. = R. hybrida? Vill. = Rosier des
	Pyrénées. de 1 à 2 f. d. Pendulina L. = Rosier à fruit pendant, de 1 à 2 f.
	d. Pendulina. L. = Rosier d fruit pendant. de 1 à 2 f. Arvensis. L. = R. prostrata? D. C. = R. stylosa. Mérat. =
	R. setigera. Mich. — R. herporhodon. Ehrh. — R. sylvestris?
	Roth. C. de 75 c. à 1 f. Bifera. Pers = R. semperflorens. Desf. = R. damascena.
	Willd = Rosier de deux fois l'an. = R. de quatre saisons.
	B. G. de 25 c. 1 f. b. Semperslorens. = Rosier de tous les mois. = R. d
	bouquet. Asset at tous its mois. — R. a
	c. Candida. = Rosier des quatre saisons à fleurs blanches.
	d. Felicitas. — Rosier Félicité de 1 à 2 f. de 2 à 4 f.
	e. Carnen. = Rosier des mois couleur de chair. de 2 à 3.
	f. Argentea. = Rosier des mois argenté. C.
	g. Virginalis. Ait. = R. incarnata Mill. = Rosier Virginal. B.
	h. Bifera alba et rosea. = Rosier de deux fois l'an, rouge
· .	et blanc. == R. Yorck et Lancastre. B.
	Bractesta. Vent. = R. macarthnea. Dum. Cours = Rosier d. bractets. = R. de macartney. S. † G. de 1 à 3 f.
	Canina, L. = R. Andegavensis, Bast. = R. leuchroa, Desv.
	= Rosier de chien. B. G. de 25 à 50 c. Carolina. Willd. = R. corymbosa. Ehrh. = R. virginiana.
	Du Roi. == Rosier de Caroline. C. de r 2 2 f.
	Centifolia. L. = Rosier d cent feuilles, B.
	a. Simplex. = Rosier de Hollande simple. de 1 à 2 f. b. Max ma. = R. pictorum. = Rosier des Peintres. 1 à 1 f.
	c. Crenata. Rosier d feuilles crénelles. de 1 à 2 f. d. Crispa. R. bipinnata. Dupont. Rosier à feuilles
	d. Crispa. = R. bipinnata. Dupont. = Rosier d feuilles
•	de 2'à 5 f. e. Vilmorina. = R. centifolia carnea. = Rose vilmorin.
	, R. transparente. de 2 à 2 f.
	f. Muscosa. Rosier mousseux. de 2 à 4 f. Id. Alba. Rosier mousseux à fleurs blanches, 5 à 8 f.
	g. Junonis. = Rose junen. da 223 f.

h. Unguiculata. Delaunay.

R. caryophyllata. Dupont.

R. caullet.

Rosier guenille. de 3 à 4 f.

i. Kinston. Hortul.

Rosier kiston Portugal. de 1 à 3 f. j. Unica. = R. mutabilis = R. nivaa. Dupont. = Rose unique. de 2 à 3 f. k. Bullata. = Rosier à feuille de laitue. de z à 4 f. — Cinnamomea. L. — Rosier canelle. de 50 c. à 1 f. 50 c. — Collina. Jacq. — R. dumetorum. Thull. — R. lencantha. Lois. = il. obtusifolia. Desv. de 50 à 75 c. Eglanteria L. = R. lutea Ait. = R. foetida, Aller. R. chlorophylla, Ehrh. = R. cerea. Russig. de 75 c. a 1 f. b. Panicea. Mill. = R. bicolor. Jacq. = R. austriaca. Parck. = Rosier capucine. = R. ponceau. = R. de 75 c. à 2 f. d'Autriche. Var. d bandes ponceau. = Rose tulipe. Dupont. de 2 à 3 f. Rosa gallica, L. = R. rubra, Blackw. = R. austriaca, Crantz, Rosier de Provins, = R. de France. C. de 5 à 25 f. le 010 b. Versicolor. = Provins panaché. C. G. de 1 f. à 25 c. de 5 à 25 f. le % c. Atropurpurea. = Rose pourpre-noire. d. Purpurea. = R. belle veloutée. e. Maheka = R. mutabilis. Dum. Cours. = Mahek. = Rose changeante. de 1 a 3 f. f. purpureo violacea, magna. = R. belle Evéque. C. 2 à 3 f. g. Chremesina. = R. belle cramoisie. 2 à 3 f. Glauca. H. P. = R. rubrifolia. Vill. = R. multiflora. Regnier. de 50 c. à 1 f. 50 c. Hybrida. Schleicher. = Rosier hybride. de 50 c. a 1 f. Inermis. Dupont. = Rosier sans épines Lœvigata. Mich. = R. sinica. L. = R. de 2 à 4 f. = R. chinensis. Jacq. 🛓 R. ternata. Poir. = R. nivœa. DC. = R, trifoliata. Hortul. = Rosier liste. == R. blanc de Neige. † * de 2 à 3 f. Lucida, Willd. = R. turgida. Pers. = R. turneps. Hort.

Angl. = Rosier luisant. C. de 1 à 3 f. de 1 à 3 f. Majalis. Ilerm. = R. collincola. Ehrh. = R. fecundissima. Roth. = Rosa regnier. Schl. = Rosier de mai. G. C. de so à 1 f. b. Flore pleno = R. du St. Sacrement. à fleurs doubles. C. G. de co c. à 1 f. de so c. à 1 f. - Montana. Vill. = R. biserrata Mérat. = R. sepium. macrocrapa. Desv. = R. malmundariensis. Lejeune. = Rosier de montagne. C. G. de 50 c. à 1 f. Moschata. Ail = R. opostemum. Ehrh. = R. arborea. Pers. de 2 à 3 f. = Rosier musqué. B.G. b. Flore pleno. Var. d fleurs doubles. B. de 2 à 3 f. c. Nana. Var. Nana. C. G. de 2 à 4 f. de 2 à 4 f. Multiflora. Thumb. = R. multiflore du Japon. § † * 2 à 4 f. Multiflora. Thumb. = R. mutiquote a... Myriacantha. DC. = R. involuta. Smith. = Resier mille de 1 f. à 1 f. 50 c. Nana. Duh. ed. nov. = R. burgundiaca. Roess. = R. pulchella. Pers. = Rosier pompon. = R. de Bourgogne. = R. nain. de 75 c. à 1 f. 50 c. Palustris? F. B. C. de 1 1 2 f. Parviflora. Ehrh. — R. carolina. Du Roi. — R. pensylvanica.

Wang. — R. humilis. March. — Rosier parviflore. C. 3 à 4 f.

Parvifolia. Ehrh. — R. remensis. Desf. — Rosier à petites feuilles. — R. de Meaux. — R. de Itheims. — R. de Champagne. C. de 40 c. d 1 f.
Pimpinellifolia. L. = Rosier à feuilles de pimprenelle. C. G. de 50 c. a 1 f. de 1 a 2 f. b. Spinosissima. L. C. G. c. Multiplex. = Rosier d feuill. de Pimp. double. C. 2 à 4 f. Rubiginosa L. = R. eglanteria. Tabern. = R. suavifolia. Lightfoor. = R. Pseudo-rubiginosa. Lejeune. = Rosier rouille. = Eglantier rouge. = R. à odeur de reinette. rounte. Bestantier rouge. In a occur as retinetre.
C. G. de 50 à 75 c.
b. Multiplex. Var. à fleurs doubles. C. de 2 à 4 f.

Sempersorens. Curtis. R. diversifolia. Vent. R. Bengalensis. Pers. R. du Bengale. G. C. † de 50 c à 3 f.
b. Centifolia. R. du Beng. à fleurs doubles. † C. 2 à 4 f.
c. Alba: R. du Beng. à fleurs blanches. † C. de 1 à 2 f.
d. Purpurea. R. du Beng. camoisi. † C. de 1 à 2 f.

Particafoli. R. du Beng. d feuill. de nécher + 2 à 6. e. Persicofolia = R. du Beng. à feuill. de pécher. † 1 à 2 f. f. Pumila. = R. du Bengale nain, pompon. C. + 224 f. Sempervireus. L. = R. scandens. Mill. = Rosier toujours vert. S. † G. de so à 1 f.

	· •	20
Rosa.	b. Balearica. Desf. = R. atrovirens. Viviani. = R. ovoider	ı. 1'
	= Rosier de Mahon. S. + G. de 2 à 3	. 1
	c. Microphylla. DC. = Rosier t. v. à petites feuilles.	5. II
	† G. de 1 à 2	f. 1
Sa	pium. Thuill. = R. agrestis. Savi. = Resier des haies. C	₹
50	O Trans It. agresses. Ouvi Itester des ranes.	"!
	G. de 50 à 75 i	i. j
Su	lphurea. Ait. = R. glaucophylla. Ehrh. = Rosier jaune	e. I.
	C. de 75 à 2	e 1'
	C. uc /) 4 2	<u>: 1</u>
	b. Nana. = Rosier pompon jaune. C. de 2 1 3	17
Tu	urbinata. Ait. = R. campanulata. Ehrh. = R. francofur	- 1
	Paris Dane - Paris Austral - P de Francis	_ 1
·	tensis. Roess. = Rosier turbinė. = R. de Fracfort. =	
	F. d gros cul. C. de 75 c. à 1 f. 50 c	2.
Ti	10st. L. = R. mollissims. Willd. = R. tomentosa. Smith	i. I.
	D nomifere Tour C D in the D A Jan	
	= R. pomisera. Tournes. =: Rosier velu. = R. d odeu	
	de pomme reinette. C. G. de 1 à 2 i	f. 1
Poemari	nus officinalis. L. = Romarin commun. † C. C. * 25 à 50 e	. I.
Dada	angenous DC - Pours Houst four 6	7 I
	anescens. DC. = Ronce blanchâtre S. de 50 c. à 1 l	
(`œ	esius. L. = Ronce bleuarre. = Petavin. Prov. C. G. 15 c	:. I
Col	llinus. D C. = Honce de colline. S. de 50 c. à 1	
	minus. De nome de comme. y. de 50 c. a 1 1	
— rr	uticosus. L. == Ronce commune. S. 3 f. le 1	٠١
	b. Flore pleno. = Ronce d fleurs doubles. S. +? I f. 1 I f. 50 c	:. I
•	c. Inermis. Willd. = Ronce sans épines. S. de 1 à 2 f	٠.
	to mermis, or man nome same epines, g. we i a z i	• []
	d. Laciniatus Willd. = Ronce à feuilles découpées. =	=
	R. d feuilles de persil. vulg. S. de 1 à 2 !	f. •
***	building Willid - D. clandulasing Delland: - D. compili	
11y	bridus. Willd. = R. glandulosus. Bellardi. = R. corylli	: 1
t	olius. b. Smith. = Ronce d fewilles de noisetier. G. S. 50 c. 21 f	
	eus. L. == Framboisier. (vide pag. 5) C. de 3 à 5 f. le 🦏	
- 100	sis. 2 2 amounter (vinc pag.) O. de , a) 1. le	٥١
Ua	oratus. L. == Ronce odorante. == Framboisier du Canada	
(C. de 50 c. 1 f	
	aculeatus. 1. = Fragon épineux. = Fragon piquant. =	-1
Ituscus .	actication 1. 2. 2. 1 ragon spinaux. 2. 1 ragon paquent.	- 1 '
	Houx frelon. † G. C. de 25 à 75 c poglossum. L. = Fragon d folioles. † C. de 50 à 75 c	
Tiv	poglossum. I. = Fragon d folioles. + C. de so à 25 c	١.
II.	manhathan t - Francisco Clista - Company	٠,
	pophyllum. L. = Fragon saus folioles. = Laurier Alex	
	andrin. † C. de 50 c. à 1 f	٠ ا ٠
Ra	cemosus L. = Danae racemosa. Pers. = Fragon d grappes	. 1 :
	L C	. Г.
	t C. de 75 c. à 1 f. 50 c	• 1
Ruta an	gustifolia. Pers. = R. chalepensis. Mill. = R. graveolens	. 13
, 2	b. L. = Rue à feuilles étoites. † C. G. * de 25 à 75 c	. 13
1	" L Blue a jennes troites, j C. C. uc 25 a 75 c	٠١.
	veolens. L. Rue commune. = R. de jardins. † G. 25 à 50 c	
Mo	ontana. Ait. = R. legitima. Jacq. = R. sylvestris minor	. I -
	Mill. == Rue de montagne. † C. de 25 à 75 c	
Galiana.	de Contiere F	. 1 ,
Sancorn	sia fruticosa. L. = Salicorne ligneuse. † C. de 50 à 75 c	• •
Salix a	cuminata. Smith. == Saule acuminė. B. 50 c	. 1
A 1-	b. Variegata = Saule panache. B. 75 c	
	sternoides. Schl. == Saule à feuille d'Alaterne. B. 💢 50 c	
Alb	pa L. = Saule blanc. A. (L'on fournit des plantards de	e l
•	ette espèce en bon choix, d'environ 8 pieds de hauteur au	* -
. P	prix de 150 à 300 francs le millier.)	- 1
Am	nygdalina. Dum. Cours. — Saule amandier. — Osier brun	. 1 5
	N =	
— Aq	uatica. Smith. == Saule aquatique. B. 50 c	. 8
_	b. Humilis. Schl. 50c	
A		
	enaria. L. = S. Helvetica. Vill. = Saule des sables. B. 50 c	
- Au	rita. L. = S. ulmifolia. Vill. = Petit saule marceau. =	=
	aule oreille. B. 50 c	
- Dar	oylonica. L. = Saule pleureur. = Saule de Babylonne	
· =	= Saule parassol. A. de 75 c. à 2 f	. •
- Bio	olor, Bourgs. = Salix laurina? Smith. = Saule à deux	- 1
	aulana D	: 1 2
_ "	ouleurs. B. de 1 à 2 f	• 8
Car	præs. L. = S. spleacellata. Smith. = S. lanata. Lightf	: -
	= Saule marceau. A. de 50 c. à 1 f	١.
Con	minifolia Cald Caula & Caulla da abanna A an lan	٠.
Car	pinifolia. Schl. = Saule à seuille de charme. A. 50 à 75 c	٠١٠
Coi	rformis. Schl. B.	. 1 -
- Den	ra. Schl. B.	. 1
T) U	to Hoff and Carlot and Cather advances	. 11
- F 151	ra. Schl. B. 10 S. rubra. Smith. Salix virescens. Vill	•
Ŧ	de 50 à 75 c	. 1 .
	sca L. = Saule brun. C. de 75 c. à 1 f	• 1
GR	nuca L. = Saule glauque. B. de, 75 c. à 1 f	٠ ٠
G1:	auca L. = Saule glauque. B. de 75 c. à 1 f aucophylla. Schl. B. 50 c	
Inc	mbacea. Willd. = Salix angustifolia. Wulfen. = Saul	.
- Inc		
	nicheur. B. 50 c	- [
Mo	onundra. Hoff. = S. purpurea. L. = S. helix. Sm. =	= 1
	. monosteinum. Hall. = Osien rouge des vignes. =	
	remains the second the	= 4
8	Saule à tête écaisseuse. = Saule hélice. B. de 25 à 50 c	. 1 .
Ma	willnides I S cosis vill - Saule murtillin B en c	

Salix Pentandra. L. == Saule d feuilles de laurier. == = Saule pentandrique. A. Persicosfolia. Schl. = Saule à feuilles de pêcher. A. 50 à 75 c. - Populifolia. Schl. = Saule & feuilles de peuplier. B. 50 à 75 c. - Retusa. L. = Saule émoussé. B. - Riparia. Schl. = S. incana. Schr. = S. lavendulæfolia. Lapey. Salix rosmarinifolia. Host. = S. viminalis. Vill. = Saule des rivages. B. 50 C. Triandra. L. = Saule triandrique. B. - Ulmifolia. Hoff. = S. aquatica. Lam. = Saule à seuilles d'orme. B. SO C. Villarsiana. Flug. = S. triandra. Vill. B. (0 C Viminalis. L. = S. longifolia. Lam. = Saule osier B. 25 à 50 c. - Vitellina, L. = Saule osier jaune = Amarinier. de 25 à 30 c. Salvia aurea. L. = Sauge dorée. † * C. de ragf. Grandiflora. Etling. S. tomentosa. Mill. Sauge à grandes fleurs. + C. G. de 50 à 75 c. b. Alba. = Sauge d grandes fl. blanches. C. + 75 c. a If. - Officinalis. L. = Sauge commune. C. †
b. Tricolor. = Sauge tricolore. † C. de 10 à 25 C de 20 à 50 c. c. Variegata. — Sauge panachée. † C. de 25 à 50 c. — Pomifera. L. — Sauge pomifèré. C † de 75 c. à 1 f. Sambucus canadensis. L. — Sureau du Canada. B. G. 75 c. à 1 f. 10 f. le % - Nigra. L. == Sureau commun. B. G. » b. Variegata. = Sureau panaché. B. G. c. Monstruosa. = Sureau d tiges plates. B. d. Laciniata. = Sureau à feuilles laciniées. B. G.75 c. à 1 f. - Racemosa, L. = S. montana Camer. = S. cervina. Taber. = Sureau à grapes. B. G. 50 c. & I f. 50 c. Santolina incana. Lam. S. chamae-cyparissys? L. Garde robe. == Petit cypres. C. + 5 à 10 f. le º Rosmarinifolia. L. = Santoline à feuilles de romarin. † C. b. Viridis. Willd. = Santoline verte. † C. 15 à 25 c. Squarrosa. Willd. = S. tomentosa. H. P. † C. 40 à 75 c. Sapium sebiferum. — Croton sebiferum. L. — Stillingia sebifera? Mich. = Gluttier porte suif. . A. 3.46 f. Scabiosa crostica. L. = Scabieuse frutescente. † C. G. * 75 c. 4 I f. Smilax aspera. L. = Smilax rude. * S. † G. - China. L. = Smilax de la chine. * S. † 50 C. A I f. 1 à 2 f. - Salsaparilla. L. = S. salsepareille. S. † Solamum auriculatum. Lam. = Morelle à oreilles. * † B. 75 c. 2 2 f. - Bonariense. L. = S. arborescens. Manch. = Morelle de Buenos-ayres. * B. 50 c. à 1 f. - Dulcamara. = = Morelle grimpante == Douce amère. == Vigne de Judée. S. b. Alba. == Var. d corolle blanche. S. 75 c. à 2 f. - Pseudo-capsicum. L. = Cerisier d'Inde. = Morelle cerisette. == Amome des jardiniers. * † C. de soarf Sophora japonica. L. = Sophora du Japon. A. G. de 122 f. 50 c - Microphylla. Ait. = Sophora à petites feuilles. * † C. 22 3 f. Sorbus americana. Willd. - S. canadensis. Hortul. - Sorbier deragf d'Amérique. A. = Sorbier des oiseleurs. == Cochesne. == Arbre Aucuparia L =d grives. G. A. de 75 c. à 2 f.
Domestica. L. Sorbier cultivé. Cornier. (vide pag. 11) de 50 c. à 2 f. — Hybrida. L. = Pyrus pinnatifida. Ehrh. = Sorbier hybride. = S. de Laponie. A. de 1 à 3 f. Spircea alpina. Pall. = Spirée des Alpes. C. de 1 à 2 f. · Chamoedrifolia. Willd. == Spirce à feuilles de germandrée. Crenata L. = Spirée à feuilles crénelles. C. 50 c. à 1 f. 50 c. - Hypericifolia. L. = Spirée à feuilles de mille perruis. C. de 50 c. à 1 f. b. Crenata. — Var. à feuilles créneiles. C. 50 c. à 1 f.

Lœvigata. L. — S. altaica. Pall. — S. altaiensis. Laxm. —

— Spirée lisse. C. de 75 c. à 2 f.

Opulifolia. L. — Spirée à feuilles d'obier. B. G. n 25 à 75 c.

Salicifolia. L. — Spirée à feuilles de saule. C. de 40 c. à 1 f.

a. Rosea. — Spirée à fleurs roses. de 50 à 75 c.

b. Alba. Ehrh. — Spirée à fleurs paniculées, de 50 à 75 c.

c. Paniculata Ali. — Spirée à fleurs paniculées, de 50 à 1 f.

ophifolia. L. — Spirée à fleurs poince. C. Soc. à 1 f.

ophifolia. L. — Spirée à fleurs paniculées, de 50 à 1 f. 50 c. a 1 f. de 1 a 3 f. Sorbifolia. L. = Spirée d feuille de sobier. C. Tomentosa, L. = Spiree cotonneuse, C. - Triloba, Pall. == Spirée trilobée: C. de zazf.

Spirea Ulmifolia. Scop. = S. chameedrifolia. Jacq. = S. betulifolia.

Pall. = S. carpinifolia. = Spiree à feuille d'orme. C. 1 à 2 f. Staphylea pinnata. L. = Staphylodendrum. Scop. == Pistacia sylvestris. Bauh. = Nux vesicaria. Dod. = Neq-coupl. = Faux-pistuchier. = Patenóstrier. B. G. de 75 c. à 2 f. de 75 c. à 2 f. - Trifoliata. L. = S. virginiana. Moriss. = Staphylea & feuilles ternées. B. G. de 2 à 3 f. Statice monopetala. L. == Limonium lignosum Bocc. = = L. scabra. Pers. = Statice frutescente. = S. monopetale. + * C de 50 c. à 2 f. Sterculia platanifolia. L. Sterculier de la Chine. S. d feuilles de platane. Bupariti. Parassol chinois. A. * = S. d feuilles de rà8f. Sthochelina dubia L. = Serratula conica. Fl. Franc. = Stéline d feuilles de romarin. C. + Styrax officinale L. = Aliboufier officinal = Storax. B.G. 1 à 4 f. Symphoricarpos conglomerata. Pers. = S. parvitlora Dum. Cours. = S. vulgaris. Mich. == Lonicera symphoricarpos. L. == Chevre-feuille de Virginie. — Symphoricarpos C. G. 50 c. Syrings dubia. Pers. — S. chinensis. Willd. — Lilac varina. Dum. Cours. = Lilas varin. B. de 75 c. à 1 f. 50 c. b. Alba = Lilas varin à fleurs blanches. B. de 2 à 3 f. - Persica. L. == Lilas de Perse. a. Lanceolata. = S. ligustrina. = Lilus d feuilles de Troëne. B. de 1 à 3 f. . b. Laciniata. = Lilas de Perse lacinie. C. de 75 c. à 1 f. Rothomagensis. = Lilac media. = Lilas de Marly. B. 1 à 2 f. - Vulgaris. L. = Lilac. Lam. = Lilas commun B. de 25 2 95 c. d fleurs violet-bleuâtre. B. 50 c.
Var. à fleur pourprée. B. 50 c.
à grandes fleurs. == Lilas double. vulg. B' 1 à 2 f. . b. Alba. = Lilas à fleurs blanches. B. de so c. à r f. Tamarix africana. Desf. = Tamaris d'Afrique. B. de 1 à 2 f. Gallica. L. = T. narbonensis. = Tamaris pentandrique. = T. de Narbonne. A. B. de 25 à 75 c. Germanica. L. Myrica pannonica. Clus. Tamaris d'Alde 50 à 75 c. de 1 à 4 f. lemagne. C. Taxus baccata. L. = If. commum. † G. A. B. de 1 4 f.
Tencrium betonicum. PHérit. = T. Maderense. Lam. = Germandrée de Madère. * † G. C. de 50 c. à 1 f. Flavum. L. == Germandree jaune. † *G. C. de 75 c. à 1 f. 50 c. Fruticans. L. = Germandrée d'Espagne. + * C. 50 c. à 1 f. 50 c. Marum. L. = Germandree maritime. = Herbe aux chats. † C. * G.

Massiliense. L. = Germandree d odeur de pomme. † * C. 1 a 2 f. Thuya occidentalis. L. = Thuya d'Amérique. B. + G. 75 c. à 3 f. Orientalis. L. = Thuya de la Chine. = Arbre de vie. B. † G. * de 75 c. à 1 f. 50 c.
Thymus mastichina. An. Thymus exserens? Ehrh. = Thym citré. † C. * de 50 c. à i f. vulgaris. L. = Thym commun. + C. * 25 C. b. Alha. = Var. à fleurs blanches. † C. * Tilia argentea. H. P. = T. rotundifolia. Vent. = T. alba, Willd. non. Ait. = T. tomentosa. Manh. = Tilleul argenté. de ràzf. Glabra. Vent. = T. americana. L. = Tilleul d'Amérique. de 2 à 4 f. A. G. Microphylla. Vent. = T. Europœa. L. = T. Europæa parvifolia, Ait. = T. ulmifolia. Scop. = I. sylvestris. Desf. = I. foemina. Bauh. = Tilleul des bois. = T. à petites feuilles. A. G. de 75 c. à 2 f. Platiphyllos. Vent. T. Europea. L. T. cornata. mus.
T. Silesiaca. Till. Tilleul à grandes feuilles. T. Europæa. L. = T. cordata. Mill. T. de Hollande. A. G. de I à 2 f. 50 c.
Pubesoens, Ait. = T. Caroliniana. Mill. = Tilleul pubescent. de 2 à 3 f. Rubra. DC. = T. Corallina. Ait. = Tilleul d bois rouge. = T. de Corinthe. A. G. de 1 à 1 f. 50 c.

Ulex Europeus. L. = Ajonc d'Europe. = Jonc marin. + B. G,

de 3 f. le 7, à 1 f. plèce.

— Nanus. Sm. = Ajonc nain. C. G. + de 75 c. à 2 f.

— Provincialis. Lois. = Ajonc de Provence. C. G. + 75 c. à 1 f. 50 c. = T. de Corinthe. A. G. Ulmus americana. L. = Orme d'Amérique. A. de 1 à 2 f. 50 c. 1 à 2 f. 25 c. - Campestris. L. = Orme tommun. A. G. a. Vulgaris. = Orme à feuilles larges et rudes. A. G. de 1 à 2 f. 25 c.

Ulmus. b. Stricta. = Orme à feuille étroites et rudes. = Ormille, de 1 à 2 f. 25 c. c. Glabra. = Orme a feuilles glabres .A. 1 à 2 f. 25 c. d. Latifolia. — Orme d grandes feuilles. A. G. de i à 3 f. Var. Argenteo-maculata. — Orme panaché. A. i à 3 f. e. Modiolina. = Orme pyramidal. = Orme d moyeux. A. G. de 1 à 2 f. 25 c. f. Crispa. F. B. = Orme à feuilles crépues. A. de 1 à 3 f. g. Rugosa. N. = Orme d'Avignon. Sp. nouv. A.G. de 2 a 3 f. inensis Desf. = U. pumila. Hortul. = Orme de la Chine. = The de l'abbé Galois. B. * de 2 à 4 f. - Chinensis Desf. = de 2 à 4 f. - Estusa. Willd. == U. octandra. Schkuhr. == U. hollandica. Du Roi. = U. glabra. Mill. = U. ciliata Ehrh. = U. montana. Bauh. = Smith. = U. pedunculata. Lam.-Fougeroux. = Orme pédonculé. == Orme de Hollande. A. G. 1 à 3 f. Suberosa Willd. == U. tetradra. Schkuhr. == U. satiya. Du Roi. =: Orme à liège. A. G. de 1 à 2 f. Vaccinium myrtillus. L. = Airelle commune C. G. de 50 c. à 1 f. Oxycoccos. L. = Oxycoccus Europœus. Pers. = Airelle canneberge. C. de 1 à 2 f. Vitis idea. L. = V. punctatum. Lam. = Airelle ponctule. de ragf. Verbena triphylla. l'Hérit. = V. citriodora. Cav. = Aloysia citriodora. Orteg. = Verveine odorante. = V. d odeur de citron. * B. de 75 c. à 3 f. Viburnum cassinoïdes. Mich. = V. lœvigatum. Ait. = Viorne de 2 a 3 f. cassinoide. B. †
Dentatum. Ait. = Viorne dentée. B. de 2 à 3 f. Lantana, L. = Viorne commune. = Mansienne. B. G. 50 c. 12 f. b. Canadensis. = Viorne du Canada. B. G. 1 2 2 f. 25 c. Lentago. Ait. = Viorne d manchette. B. de r à 3 f. de 2 à 3 f. - Nudum. Ait. = Viorne nue. B. - Opulus. L. = V. obier. B. G. de 50 à 75 f. b. Sterilis. = V. roseum. = Boule de neige. = Rose de gueldres. B. de so c. z f. De soc. 1 f.

Prunifolium. = Viorne d feuilles de prunier. B. 1 f. 50c. å 3 f.

Rugosum. Pers. = V. rigidum. Vens. = V. Strictum. Hortul.

= Viorne rugueuse. B. * †

Tinus. L. = Viorne laurier-tin. B. G. * †

b. Lucidum. = Viorne luisante. B. G. * †

de 50 c. å 2 f.

b. Lucidum. = Viorne luisante. B. G. * † de 50 c. à 2 f. de 1 à 3 f. Variegata. — Viorne panachée. B. * † de 1 à 3 f.
Vinca major. L. — Grande pervenche. † C. de 25 à 50 c.
b. Media. Hort. Telon. — Pervenche moyenne. † C. 50 c.
c. Variegata. — Pervenche panachée. † C.
d. Alba. — Pervenche d fleurs blanches † C. de 1 à 2 f. Minor. L. = Petite pervenche. † C. 50 c. b. Multiplex. = Var. d fleurs doubles. † C. de 75 c. a 1 f. Vitex agnus castus. L. = Gatillier faux poivrier. B. G. 75 c. \$2 f. b. Rosea. = Gatillier a fleur rose. B. G. de 1 \$2 f. 50 c. Negundo. L. = V. incisa. Lam. = Gatillier & feuilles decoupées. C. G. de 2 à 3 f. Vitis arborea. L. V. pinnata. Vahl. Ampelopsis bipinnata. Mich. = Vigne en arbre = Vigne à seuilles de persil. de 2 4 3 f. Labrusca. L. = Vigne d'Amérique. = Vigne cotonneuse. de I à 3 f. Vinifera. L. = Vigne cultivée. (vide pag. 11) de 50 à 75 c. a. Silvestris. = Vigne sauvage. = Lambrusqou, Prov. S. b. Sterilis. Hort. Telon. = Vigne sterile. = Vigne odorante. S. de 75 c. à 2 f. e, Apyrena.

V. Corinchiaca. Bauh.

de 75 C. 22 I.

c. Apyrena.

V. Corinchiaca. Bauh.

de 50 à 75 Q.

d. Laciniosa. L.

Vigne d feuilles laciniées.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Ciotat.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Ciotat.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche.

Raisin d'Autriche = Raisin de . de 50 à 75.0, A. Laciniosa. L. — rigne a jeunies sammees. — Ciorar. — Raisin d'Autriche. S. de 50 à 75 c. — Vulpina. L. — V. acerifolia. Raj — Vigne de renard. S. 1 à 2 f. . — Yucca aloifolia. L. — Yucca d feuilles d'aloès. † B. G. * de 2 à 4 f. — Gloriosa L. — Y. Canadena. Ald. — Yucca fastueux. — Y. d feuilles entières. — Y. russique. † † B. G. de 36 f. . — Canadena antifolia Philips — Zautharhies d Guilles de 5 f. Zanthorhiza apiifolia. l'Herit, = Zanthorhize à feuilles de persil. Zanthoxylum fraxineum. Willd. = Z. clava herculis. L. = Z. americanum. Mill. = Z. ramiflorum. Mich. = Fagara fraxinifolia. Duh. == Clavalier à feuilles de freue. Frene épineux. B.

ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

ELLENGE SAN FRANCES SAN FRANCES ELLE SAN

·	
ABRUS precitorius. L. = Abrus d chapelet. = Fai	usse reglisse.
s. ch. S. Acacia cornigera. Willd. = Mimosa cornigera. Jacq. porte-corne. or.	5 à 6 f.
Acacia cornigera, Willd Mimora cornigera, Java.	= Acacie
norte-come de	de Oiref
Deleverifelie II D. 4	45 6 6
— Dodonœifolia. H. P. + or.	de 3 à 7 f.
- Eburnea, L. = Mimosa lencacantha. Jacq. = Ac	acie a epines
d'ivoire. 😽	de ra4f.
- Farnesiana. Willd. = Acacie de farnèse = fle	ur de cassis.
unio de	50 c. à 3 f.
- Glaucescens. Balbis. = Mimosa binervia? IV	
	de z à 6 f.
- Heterophylla. Lam. = Acacie heterophylle. † o.	r. de 3 à 4 f.
b. Simplicifolia. L. == Mimosa latifolia? Hortul	. + or. 2 a 4 f.
- I.ebbeck. Willd. = Acacie du Malabar. s. ch.	
Towardele toward desired Alexander	40 3 4 3 6
 Leucocephala. Lam. = Acacie à tête blanche. Longifolia. Willd. = Andresv. = Mimosa ensit 	de za jf.
- Longitolia. Willd. = Andrew. = Mimosa ensit	tolia. Smith.
M. falcata. H. P. = Acacie à longues feuilles	.† or. 3 à 5 f.
- Lophantha. Willd. = Mimosa distachya. Vent.	= Acacic
en panache. s. ch.	de 2 4 4 f.
- Paradoxa. DC. †	6 f.
Community of the second of the	
- Strombulifera. Willd. = Acacie tire-bouchon. or.	de 4 a 6 f.
— Suaveolens. Willd. = Mimosa stricta. Andrew.	
odorante, † or.	de 3 à 4 f.
- Undulata. = Mimosa undulata. Hortul. †	de 6 à 8 f.
Achania malvavistus Ait. = Malvaviscus coccineus.=	
Lam. = Hibiscus frutescens. Brown. = H. m	
= Mauvisque écarlate. or.	de zazf.
- Mollis. Ait. = Mauvisque cotonneux. or.	de zazf.
Adjanthum repiforme I S ch	dezalf
Adiauthum reniforme. L. s. ch. Egiphylla martinicensis. L. = Egiphylla de la Ma	
$E_{\rm giphylla}$ martinicensis. $L_{\rm e} = E_{\rm giphylle}$ at ia $M_{\rm c}$	rrinique.
Bois de fer. = Bois cabril. S. ch.	de 6 8 8 f.
Agave foetida. L. = Furcrea gigantea. Vent. = F.	fætida. Pers.
Bois de fer. = Bois cabril. s. ch. Agave foetida. L. = Furcrea gigantea. Vent. = F. † s. ch.	fætids. Pers. de 3 d 4 f.
† S. ch.	de 3 à 4 f.
- Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave	de 3 à 4 f. du Mexique.
- Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave	de 3 à 4 f. du Mexique.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agavé d † or. Spicata. = Agavé à épis. = H. madr. † S. ch.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f.
T s. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to to or. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † s. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. s. ch. †	de 3 h 4 f. du Mexique. de 3 h 5 f. de 4 h 6 f. de 3 h 8 f.
T s. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to to or. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † s. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. s. ch. †	de 3 h 4 f. du Mexique. de 3 h 5 f. de 4 h 6 f. de 3 h 8 f.
T s. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave de tor. t or. Spicata. = Agave de épis. = H. madr. † s. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. s. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † s. ch.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agavé † or. Spicata. = Agavé d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. =	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. Alods vert-
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agavé † or. Spicata. = Agavé d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. =	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. = Alods vert- de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to tor. Spicata. = Agave d epis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe aracinoidea. L. = Aloes patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. aracinoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. = Alods vert- de 1 à 3 f. de 2 à 3 I.
† S. ch. Mexicana L.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. = Alods vert- de 1 à 3 f. de 2 à 3 T. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. = Alods vert- de 1 à 3 f. de 2 à 3 T. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to tor. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymbæfolia. Jacq = Aloés en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloés bec-de-canne. †.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to tor. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymbæfolia. Jacq = Aloés en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloés bec-de-canne. †.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to tor. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymbæfolia. Jacq = Aloés en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloés bec-de-canne. †.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangulairis. C. Latifolia. Var. \(Triangulaire \) C. Latifolia. \(Var. \) \(Triangulaire \) C. Latifolia.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 3 f. de 2 à 3 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloes patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. C. Latifolia. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloes feuilles.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. DC. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. DC. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymberfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueeformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. C. Latifolia. Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. DC. = Albelier. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. de 1 à 2 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Yar. } A larges feuilles. Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Albelier. † Humilis. L. = Aloès nain. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Yar. } A larges feuilles. Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Albelier. † Humilis. L. = Aloès nain. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { Triangulaire c. Latifolia. A. arborescens. D.C. = Aloès haloes nain. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. DC. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. DC. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymberfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueeformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. c. Latifolia. Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { d larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. DC. = Aloès mouchete de margatifiera. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. DC. = Aloès mouchete margatifiera. L. = Aloès prelé. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. de 1 à 3 f. de 2 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d epis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. DC. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. DC. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymbœfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueeformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { d larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. DC. = Aloès nain. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. DC. = Aloès moucheté Margaritifera, L. = Aloès perlé. † de b. Minor. DC. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 4 à 6 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to tor. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguæformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { a larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Alobelier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitræformis. Lam. = A. umbellata? D.C.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. to c. à 2 f. de 1 à 3 f. so c. à 2 f. de 1 à 2 f. mlosa. Lam.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave to r. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymboefolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueeformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Aloès helier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté b. Minor. D.C. † Mitroeformis. Lam. = A. umbellata? D.C. = Aloès hepatique. † A. saponaria. Dill. = Aloès hepatique. †	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. de 1 à 3 f. mlosa. Lam. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. Iurida? Jacq. = Agave 1 † or. Spicata. = Agave d epis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. DC. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. DC. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymbœfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueeformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. C. Latifolia. Var. { d larges feuilles.} Fruticosa. Lam. = A. arborescens. DC. = Aloès leier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. DC. = Aloès moucheté b. Minor. DC. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? DC. Perfoliata. L. = A. umbellata? DC. = A. mac = A. saponaria. Dill. = Aloès hepatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch.	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 4 à 6 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguœformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { A larges feuilles. } Indicate c. Ind	de 3 à 4 f. du Mexique. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloès belier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? D.C. Perfoliata. L. = A. umbellata? D.C. = A. mae A. saponaria. Dill. = Aloès hépatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch. Pulchra. Hortul. † S. ch. Retusa. L. = Aloès pouce écrasé. † S. ch.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloès belier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? D.C. Perfoliata. L. = A. umbellata? D.C. = A. mae A. saponaria. Dill. = Aloès hépatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch. Pulchra. Hortul. † S. ch. Retusa. L. = Aloès pouce écrasé. † S. ch.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloès belier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? D.C. Perfoliata. L. = A. umbellata? D.C. = A. mae A. saponaria. Dill. = Aloès hépatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch. Pulchra. Hortul. † S. ch. Retusa. L. = Aloès pouce écrasé. † S. ch.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloès belier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? D.C. Perfoliata. L. = A. umbellata? D.C. = A. mae A. saponaria. Dill. = Aloès hépatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch. Pulchra. Hortul. † S. ch. Retusa. L. = Aloès pouce écrasé. † S. ch.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. cl. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. lingueformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. Var. { A larges feuilles. } Fruticosa. Lam. = A. arborescens. D.C. = Aloès belier. † Humilis. L. = Aloès nain. † Maculata. = A. picta. D.C. = Aloès moucheté Margaritifera. L. = Aloès perlé. † de b. Minor. D.C. † Mitrœformis. Lam. = A. umbellata? D.C. Perfoliata. L. = A. umbellata? D.C. = A. mae A. saponaria. Dill. = Aloès hépatique. † Plicatilis. L. = Aloès évantail. † S. ch. Pulchra. Hortul. † S. ch. Retusa. L. = Aloès pouce écrasé. † S. ch.	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.
† S. ch. Mexicana L. = A. lurida? Jacq. = Agave to ror. Spicata. = Agave d épis. = H. madr. † S. ch. Vivipara. L. = A. vivipare. S. ch. † Aloe arachnoidea. L. = Aloés patte d'araignée. † S. ch. Atrovirens. D.C. = A. arachnoidea. b. Thumb. = livide. † S. ch. Carinata. D.C. = A. tuberculeux. † S. ch. Cymborfolia. Jacq = Aloès en nacelle. Disticha. L. = A. lingua. = A. linguœformis. Aloès bec-de-canne. †. b. Triangularis. Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { Triangulaire c. Latifolia. } Var. { A larges feuilles. } Indicate c. Ind	de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. de 3 à 5 f. de 4 à 6 f. de 3 à 8 f. de 1 à 3 f. de 1 à 2 f. oès corne de de 1 à 3 f. de 1 à 2 f.

Aloe. Variegata. L. = Aloès Perroquet. † s. ch. de 2 à 3 f. - Viscosa. L. = Aloès visqueux. = A. triangulaire. † or. 1 à 2 f. - Vulgaris. Lam. = A. flava. = A. Barbadensis. Mill. = Aloès commun. † s. ch.
Amirola nitida. Pers. = Lagunoea nitida. Ruiz et Pav. † or. 3 à 5 f. Anacampseros telephiastrum. D C. = Talinum anacampseros. id. = Portu'aca anacampseros. L. == Rülingia anacampseros. Ehrh. † s. ch. de i à 2 f. Anagalis fruticosa. Vent. = A. grandiflora. Andrews. = Mouron frutescent. + s. ch. de 1 à 2 f. de 1 à 3 f. Anagyris glauca. Hort. Mass. A. indica. Hort. Tel. & de 3 46 f. Andropogon citratum. DC. Barbon odorant. † s. ch. 2 à 3 f. Anthericum frutescens. L. = Antheric frutescent. + s. ch. 1 à 2f. Authospermum OEthiopicum. L. = Ambraria heisteri. Fabric. = Arbrisse.u ambré. — Anthosperme d'Ethiopie. or. 3 à 5 f. Anthyllis cretica. Lam. — Ebenus cretica. L. — Anthyllide de créte. y de 2 à 3 f. Antidesma alexiteria. L. S. ch.

Aralia pubescens. D.C. = Aralie pubescente. or. de şà róf. Aralia pubescens. D.C. = Aralie pubescente. or. de 3 à § f. Arctotis granditlora. Jacq. = Arctotis d grandes fleurs. † s. ch. 1 à 3 f. Aristolochia glanca Willd. = A. subglanca. Lam. = = Aristoloche glauque. + or. §. Trilobata L. = A. trifida Lam. = Aristoloche trilobée. S. de zá4f. Artemisia arborescens. Ait. = Armoise arborescente. = Absinthe de ragf. du Portugal. y † Judaica L. = Semen-contra. Pharm. = Armoise de Judéc. de 1 à 2 f. Asclepias carnosa. L. = Hoya carnosa. Hort. Angl. = Asclepiade charnue. S. ch. † S.

Curassavica L. = Asclépiade de Curaçao. or. de 2 à 6 f. de 1 à 3 f. - Virgata, Hort. Lugd. = Asclépiade éffilée. or. de 2 à 3 f. Asparagus aphyllus. L. = A. phyliacanthus. Lam. = Asperge 1 feuilles en épines. V or. de 3 à 4 f.

— Sarmentosus L. — Asperge sarmenteuse. V S. de 3 à 4 f.

Atragene indica. Desf. — A. Florida. Pers. — Clematis Florida. de 3 4 4 f. Willd. = Atragene à grandes fleurs. S. or. de z à 4f. Atropa arborescens = Cestrum campanulatum. Lam. or. de 3 à 5 f. Frutescens L. = Physalis suberosa? ('av. = Relle-dame d'Espagne. or. de 1 a 3 f. Baccharis dioica. Vahl. — Molina dioica Pers. † or. de 1 à 3 f. — Nereifolia. L. — Conyza nereifolia. H. P. — Bacchante d feuilles de laurose. or. Banksia dentata. — B. procumbens. Hortul. — B. repens? Hort.

Angl. — Hakea prostrata? id. — Banksia prostrata?

Forster. — Pimelia prostrata? W. † or. de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. - Premorsa. Andrews = Banksie tronquée. † or. de 3 1 6 f. - Serrata. L. F. = B. conchifera. Gært. † or. de 3 à 6 f. Begonia dichotoma. Jacq. = Begonie fourchie. † s. ch. de 2 à 4 f.

— Discolor. Hortul. = Begone à deux coulcurs. † s. ch. 3 à 5 f. Oblique. PHerit. = B. nitida. Pers. = B. minor. Jacq. = B. purpurea. Swarty. = Begone à feuilles luisantes. † . de 3 à 4 fo Bignonia grandistora. Thumb. = B. sinensis. Lam. = Tecoma sinensis. = Bignone d grandes sleurs. S. ot. de 3 à 4 f. Pandorea. Andrews. = B. australis. Brow. = Bignone de Norfolck. S. or. de 2 à 3 f. Stans. L. = Tecoma stans. = Bignone d feuilles de frêne. S. or.

Bocconia frutescens. L. = Boccone frutescense. S. ch. de 2 à 4 f.
de 1 à 2 f. de şå6f. de 1 a 2 f. Erecta. L. = B. diandra. Brum. de 1 à 2 f. Scandens. L. = B. sarmentosa. Brown. de 2 à 3 f.

Bontia daphnoides. L. = Daphnot des autilles. = Olivier bâtara † s. ch. de 3 à 6 f
Bosea yervamora. L. == Bosé à feuilles de lilas. \(\) de 75 c. à 2 f Bromeira ananas, L. == B. ovata. Mill. == Ananas couronne. S. ch. de 2 à 12 f
s. ch. b. Viridis. = Ananas vert. † s. ch. de 2 à 12 f
Brunia lanuginosa. L. == Brunie d feuilles sétacées. + or. de 2 à 4 !
Bryonia laciniosa. L. = Bryone lacinide. S. s. ch. de 3 à 5 f Bubon roseum. = B. glabrum. Hortul. = Bubon rose. † or. 3 à 4 f
Budleja salicifolia. Vahl. = Budleje à feuilles de saule. † or. 1 à 2 t
- Salvifolia. Ait. = Lantana salvifolia. L. = Budlèje d feuilles de sauge. † \(\forall \) de 1 à 2 f
Cacalia antenphorbium. L. = Cacalie à feuilles ovales. S. ch. 1 à 1 f
— Articulata. L. = C. laciniata. Jacq. = C. runcinata. Lam. = Cacalie lacinite. S. ch. de 1 à 2 f
- Ficoides. L. = Cacalie ficoide. s. ch. de 1 à 2 f
- Kleinia. L. = C. porophyllum. Willd. = Cacalie à feuilles de laurose. s. ch. de 1 à 3 f.
Cactus cochenilliter. Hor. $Madr. = Cactier d$ cochenilles. S. ch. 1 à 2 f.
— Curassavicus, L. = Cactier de Curação. S. ch. de 1 à 2 f. — Cylindricus. L. = Cactier cylindrique. S. ch. de 2 à 3 f. — Flagelliformis. L. = Cactier queue de souris. = C. serpentaire. = Discipline de religieuse, vulg. or. de 75 c. à 2 f.
- Flagelliformis. L. = Cactier queue de souris. = C. serpentaire.
- Grandinords. L Cacher a granaes nears. S. Ch. 2 a b 1.
- Hexagonus, L. = C. hexagone. = C, de surinam. s. ch. 2 à 3 f.
— Lanuginosus. L. = Cactier lanugineux. s. ch. de 2 d ff. — Mammillaris. L. = Cactier à manelons. s. ch. de 1 à 4 f.
- Opuntia. D.C. = Cactier raqueste. = Figue d'Inde. or. y 1 à 3 f. a. Vulgaris. Mill. = C. commun.
b. Ficus indica. L. = C. d feuilles oblongues.
c. Tuna. L. = C. tuna. d. Inermis. D C. = C. inerme.
e. Polyanthos. DC.
f. Cruciformis. Malm. — Pendulus. Swartz. — (actier pendant. 3. ch. de 2 à 4 f.
- Pereskia. L. = Cactier à feuilles. = Groseillier des Barbades.
s. ch. de 3 à 6 f. — Peruvianus. L. — Cierge du Pérou. — Cierge épineux. V
de 2 2 5 I.
b. Monstrosus. = Cierge monstrueux. y or. de 2 à 6 f. — Phyllanthoïdes. D.C. == C. phyllanthus. Dum. Cours. == C.
— Phyllanthoides. D.C. = C. phyllanthus. Dum. Cours. = C. alatus. Pers. = Cactier à feuilles de scolopendre. S. ch. 2 à 4 f.
Serpentinus. Cav. = C. Brasiliensis? = Cactier serpentinus. ch. de 1 å 3 f.
— Speciosus. Cav. — C. phayaya? s. ch. de 2 à 6 f. — Spinosissimus. Lam. — Cactier cruciforme? — Croix de
Lorraine. s. ch. de 2 à 3 f.
- Tetragonus. L. = Cactier tetragone, S. ch. de 1 à 3 f.
Triangularis. Hortul. — C. compressus. Mill. s. ch. de 2 à 5 f. Cossalpinia pectinata. Cav. = C. Cassioides? Willd. s. ch. de 3 à 6 f.
— Sappan? == Bresillet des Indes. == Bois de sappan. s. ch. 4 à 6 f. Cajanus bicolor. D C. == Cytisus pseudo-cajan. Jacq. == C. cajan.
Lam. †. de 1 à 3 f.
- Flavus. D.C. = Cytisus cajan. L. = Pois de Congo. = P. d'Angole. = P. de Pigeon. = Ambrevade. † s. ch.
de 1 f. 50 G 4 2 f.
Calendula fruticosa. L. = Souci frutescent. † S. & de 1 à 3 f.
Calla Æthiopica. L. = Arum Athiopicum. = Calle d'Ethiopie. = Pied de veau d'Afrique. de 1 à 2 f.
Callicarpa tomentosa. L. = C. lanata. Valh. = Tomex tomentosa. or. de 3 1 5 f.
Camellia japonica. L. = Camellia du Japon. = Rose du Japon.
or. † de 8 à 25 f. b. Variegata. == Camellia panaché. † or: de 10 à 25 f.
c. Flore albo pleno. = Camellia à fl. blanche doubl. 10 à 25 f.
Capraria biflora L. — C. curassavica. Herm, — The d'Amérique. † or. de 1 à 3 f.
Capsicum baccatum. L. = Piment à baies. or. de 1 à 1 f. 50 c.
— Cerasiforme, Willd. = Piment cerise. or. de 75 c. 2 1 f. — Frutescens. L. = Piment en arbrisseau. or. de 1 2 f.
- Violaceum. Hort. Madr. = C. bicolor. Jacq = C. nigrum.
Willd. or. de z à 3 f. Carthamus salicifolius. L. F. — Carlowisia salicifolia. D C.
Carthame à feuilles de saule. + 🛪 de z à z f.
Cassia bicapsularis. Hortul. = Casse bicapsulaire. or. de 1 à 3 f.

| Cassia kevigata. Willd. == 8. ch. de tagf. - Tomentosa. L == C. multiglandulosa. Jacq. = Casse tomenteuse. twor. de ràzf. Casuarina equisetifolia. L. F. = Filao à feuill. de prêle. †. or. 3 à 4f. — Torulosa. Ait. — Filao à cordonnet. + or. de 3 à 4 f. Ceanothus africanus. L. — Clanothe d'Afrique. + or. de 2 à 3 f. - Torulosa. Ait. = Filao à cordonnet. † or. Gelastrus lucidus. Willd. = Cassine concava. Lam. = Célustre à celastris incluss. Willa. = Cassine concava. Lam. = Celastre à feuilles luisantes. † or. de 2 à 4 f.

Octogonus. l'Hérit. = Cé'astre à feuilles anguleuses. † or. 3 à 4 f.
Centaurea Ragusina. L. = Cyanus Ragusina. Pers. = Centaurée de Raguse. † & de 50 c. à 1 f. 50 c.
Ceratonii siliqua. L. = Carroubier à siliques. † & de 2 à 6 f.
Cestrum alsternoïdes. Desf. = Cestreau à feuilles d'alaterne. s. ch. t de 3 à 4 f. - Diurnum. L. = Galant de jour. † or. de 3 à 5 f. - Laurifolium. l'Hérit. = C. venetum. Lam. = C. macrophyllum? de 3 a 5 f. id == Cestreau à seuilles de laurier. † s. ch. Vespertinum. l'Hérit. = C. confertum. Mill. = Galant du soir. † s. ch. de 3 4 4 f. Cheirostemum platanoïdes. Humb. et Bompl. = Cheiranthodendrum. Cervantesii. Larreat. de zo à so f. Chironia baccifera. L. = Chironie baccifere. + or. da 3 à 4 f. - Frutescens. L. = Chironie arbrisseau. † or. de 2 à 3 f. - Linoïdes. L. = Chironie à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Chrysanthemum frutescens. L. = Chrysantheme frutescente. itescente. † de 1 à 2 f. Cineraria amelloides. L. = Cineraire à fleurs bleues. † or. 1 à 2 f. - Cruenta. l'Hérit. = C. aurita. Andrew. = Cineraire pourpre. de 2 a 3 f. Cissampelos pareira. L. = Pareire à feuilles onbiliquées. de 3 à 4 f. Cissus acida. Mill. = Sicyos trifoliata. = Irsiola triphylla. Brown. de 2 à 3 f. - Antarticus. Vent. - Vitis kangaruh. Hortul. - Achit atlantique. † de 4 à 5 f. Sicyoïdes. Mill. = Irsiola scandens. Brown. = Achit d larges feuilles. — A. d feuilles en cœur. † de 3 à 4 Citrus aurantium. L. — Oranger. (vide pag. 6) † v b. Cruentum. — Aur. hierocunthicum, Duh. ed. nov. : de 2 à 4 f. Orange rouge. = 0. de Grenade. = 0. de Malthe. † de 3 à 100 f. c. Bigaradia. == Oranger bigarrade. + & de 8 à 25 f. d. Sinensis. == Oranger Chinois. + & de I à Icfa e. Myrtifolia. = Chinois-mirthe. vulg. † de 1 à 15 f. Decumana, L. = Oranger pampelmous. = Schaddeck. 3 15 f. - Histrix. D C. = Oranger herisson. † or. de 20 1 100 f. Medica. L. = Citronnier limonier. de 1 f. 50 c. à 15 f. Citharexylum caudatum, = Cotelet à longues grappes. de 2 à 3 f. Pentandrum. Vent. = Cotelet à cinq etamines. de 2 à 3 f. Quadrangulare. L. = Bois de guitare. = Cotelet quadrangulaire. Claytonia portulacaria. — Portulacaria afra. Jacq. — Claytone à feuilles de pourpier.

Cleome gigantea. L. — Moyambé géante. † s. ch. de 3 à 4 f. Clarodendrum fortunatum. L. = Péragut d feuilles entières. † 3 à 5 f. - Phlomoïdes ? Vahl. = C. violaceum. cels. = Volkameria multiflora? Burmann. † S. ch. de 3 å 6 f. Viscosum. Vent. — C. infortunatum. L. — Péragut visqueux. de 3 a 6 f. Clethra arborea. Ait. = C. maderiensis. Hortul. : = Clethra en arbre. † & or. de 3 à 5 f. Clitoria ternatea. L. = = Clitore de ternate. §. s. ch. de za jf. Clutia pulchella. Willd. = Clutelle elegante. or. de 1 à 2 f. Cobcea scandens. Cav. = Coble grimpante. S. or. de 2 à 3 f. Coffeea arabica. L. = Caffever de l'Arabie. † S. ch. de 3 à 15 f. Colutea frutescens. L. = Baguenaudier d'Ethiopie. † or. de 1 à 2 f. Convolvulus cneorum, L. = C. argenteus. Desrouss = Liseron de 1 à 3 f. argenté. † & Conyza glutinosa. L. = Psiadia glutinosa. Jacq. : = Erigeron viscosum. H. P. + or. de 1 1 2 f. Convolvulus scoparius. Ait. = Lignum Rhodium. = Liseron effile. = Bois de Rhodes. Brouss. de 2 4 4 f. Cornutia pyramidata. L. s. ch. de 3 a 6 f. Correa alba. Smith. == Correa blanc. † or. de 2' à 3 f. Viridiflora. Andr. = Mazentoxeron: Labill. = Correa 🕏 fleurs vertes. † or. de 3 2 5 f.

Cotyledon coccines. Cav. = Cotylet écarlate. † or.		
	derat	į į.
— Hemisphærica. L. = Cotylet hemisphérique. † or.	de 1 2 2	f.
- Orbiculata. L. = Cotylet orbicule. † or.	de I à 2	f.
Crassula cordata. L. F. = Crassule en cour. s. ch.	1	f.
- Cotyledon, Jacq. = C. arborescens. Pers. =	Crassule	a
feuilles rondes. §. †	de 1 à 2	F
Culaman - Crassale à Cavilles en anchantes & +	dera	
- Cultrata. = Crassule à feuilles tranchantes. 8. †		
- Imbricata. Ait. = C. lycopodioides. Lam. =		
Thunb. = Crassule imbriquée. §. †	de raz	Ι.
- Lactea. Ait. = Crassule à fleurs blanches. s. †	de I à 2	. t.
- Pellucida. Thunb. = Crassule transparente. s. †	de ràz	f.
- Perfilata. Pers. = C. perfossa. Lam. = C. punc	tata. $oldsymbol{L}_{oldsymbol{c}}$ =	<u></u>
Crassule enfilée. = Brochette. vulg. s. †	de rà	
- Perfoliata. L. = Crassule perfolice. S. †	de i à 2	
- Perionala. L. Crassule perfonce. S. 1	ue la z	1.
- portulacea. Lam. = C. obliqua. Ait. = Crassule	portuac	ee.
	de 1 à 2	
- Spathulata. Ait. = C. lucida. Lam. = Crassu	le spatul	ćc.
§. †	de raz	f.
Tetragona. L. = Crassule tetragone. s. †	de 1 à 2	: f.
Cratagus glabra. Thunb. = Alisier toujours vert. + &	de sa ic	
Curcuma longa. L. = Curcuma long. s. ch.	de 6 à 8	
f recognition will am Character Langue the at A		
(yeas revoluta. Willd. = Cycas du Japon. + s. ch. d	& 10 à 19	
Cyperus papyrus. L. = Souchet a papier.	de 2 a 4	
Cytisus albidus. DC. == Cytise blanc. or.	de 3 a 0	t.
Dapline odora. l'Hérit. = D. sinensis. = D. India	a. <i>L</i> . =	=
Laureole de la Chine. = Daphne odorant. † or.	de 2 à 7	f.
	de 2 à 4	
- Oleoides. Smith. = D. salicifolia. Lam. = Laurée	le à feuil	les
d'alivier + an	de 3 à 6	
d'olivier. † or.	de 3 à 5	-
— Pontica. L. = Lauréole du levant. † y or.	ue 3 a 5	. * •
Datura arborea. L. = Brugmansia candida. Pers. =		
en arbre. & or.	de raj	
- Sarmentosa. Lam. = Solandra grandiflora. Swart	r. == Str	a-
moine sarmenteuse. or.	de 3 à 6	
Desmochat: flavessons. D C. == Achyranthes styracifoli	a. <i>Lam.</i> =	_
A. lappacea, L. = A. echinaca. Retz. = A.	atula 7	F
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Or.	de 1 à 3	
Diosma cillata. L. = Diosme ciliée. † or.	de 2 à 3	f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Beu	de 2 à 3 mia uniflo	f.
Diosma cillata. L. = Diosme cilide. † or. — Cupressina. Thunb. = D. dichotoma. Berg. = Bru Lin. † or.	de 2 à 3 mia unific de 3 à 5	f. ra. f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Beu	de 2 à 3 mia unific de 3 à 5	f. ra. f.
Diosma cillata. L. = Diosme cilide. † or. — Cupressina. Thunb. = D. dichotoma. Berg. = Bru Lin. † or. — Ericoides. L. = D. rubra? = Diosme odorante.	de 2 à 3 mia uniflo de 3 à 5 for. 2 à 6	f. ra f. f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala	de 2 à 3 inia unific de 3 à 5 for. 2 à a	f. ra. f. D.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d ball filiforme. † or.	de 2 à 3 unia uniflo de 3 à 5 f or. 2 à a ais. ==	f. raf. f. D. f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or.	de 2 à 3 unia uniflo de 3 à 5 or. 2 à a ais. == 1 de 2 à 4 de 3 à 5	f. g.f. f. D.f.f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D.	de 2 à 3 unia uniflo de 3 à 5 or. 2 à a ais. == de 2 à 4 de 3 à 5 cosme ve	f. ra f. f. D. f. f. Jr.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or.	de 2 à 3 unia uniflo de 3 à 5 lor. 2 à 4 ais. == de 2 à 4 de 3 à 5 cosme ve de 3 à 6	f. 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbrique. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. :	de 2 à 3 unia uniflo de 3 à 5 or. 2 à 2 uis. de 2 à 4 de 3 à 5 usme ve de 3 à 6 Harto	f. ra. f. f. D. f. f. lu. f. ia
Diosma ciliata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or.	de 2 à 3 mia uniflo de 3 à 5 for. 2 à 6 ais. = 4 de 3 à 5 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6	f. ra f. f. D. f. f. lu f. ia
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. — uniflora. Berg. † or. Dodonce angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles tarois	de 2 à 3 mia uniflo de 3 à 5 for. 2 à 6 ais. = 4 de 3 à 5 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6	f. ra f. f. D. f. f. lu f. ia
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. — uniflora. Berg. † or. Dodonce angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles tarois	de 2 à 3 mia uniflo de 3 à 5 for. 2 à 6 ais. = 4 de 2 à 4 de 3 à 5 de 3 à 6 es. §. 2 à	f. 13 f.
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §.	de 2 à 3 unia unific de 3 à 5 or. 2 à 2 ais. — de 2 à 4 de 3 à 5 cosme ve de 3 à 6 Harto de 3 à 5 es. §. 2 à de 2 à 4	E E E E E E E E E E E E E
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles terois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas	de 2 à 3 mia unific de 3 à 5 or. 2 à c ais. = ais. = ais. de 3 à 5 cosme ve de 3 à 6 Harto de 3 à 5 es. 9. 2 à de 2 à 4 ter littore	f. g.f.f.D.f.f. lu
Diosma cillata. L. — Diosme ciliée. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étroit — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodonée	de 2 à juite unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 2 à 4 de 3 à 5 de 2 à 4 de 1 ittore littore ée visqueu	fighter of the fight of the se
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or.	de 2 à juit uniflo de 3 à 5 tor. 2 à cuis. de 2 à 4 de 3 à 5 cosme ve de 3 à 5 cs. S. 2 à de 2 à 4 ter littore et et littore et et littore de 2 à 4 de 2 de	f. a.f.f.D.f.f. h.f. gaff. usef.
Diosma cillata. L. — Diosme cilile. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme adorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or.	de 2 à inia unific de 3 à 5 tor. 2 à 2 de 3 à 5 tor. 2 à 4 de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 de	Carrent Der Charles Constitution
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme od bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — B. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles terois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon v or. Jiolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch.	de 2 à inia unific de 3 à 5 tor. 2 à cuis. de 2 à 4 de 3 à 5 cosme ve de 3 à 5 ce se cuis. Harto de 3 à 5 ce se cuis de 2 à 4 de 2 à 5 de 2 à 4 de 2 à 5 de 5 à 1 d	Carrent Defendent Bar Ser Berter
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Coura. — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Iloilchos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — alert	de 2 à inia unifio de 3 à 5 con. 2 à 2 dis. = de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 de 2 à 1 de 5 à 1 de	ratifortiutisst it is efficis
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. ; uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon v or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletricam. — Draccha de la Chine. † s. ch.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 2 à 4 de 2 à 3 de 3 à 6 de 2 à 3 de 3 à 6 de 2 à 3 de 5 à 10 de 6 de 2 à 3 de 5 à 10 de 6 de	traction to the traction of the state of the
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme od bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. : uniflora. Berg. † or. Dodonoea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles évoir — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Ilolichos lignosus. L. — Dolic lignosus. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Dracèna de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisiv. L. — Durante d feuilles lanceoldes. or.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 2 à 4 de 2 à 3 de 3 à 6 de 2 à 3 de 3 à 6 de 2 à 3 de 5 à 10 de 6 de 2 à 3 de 5 à 10 de 6 de	traction to the traction of the state of the
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles ésrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. d Turanta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii, L. — Durante à feuilles lanceolées, or.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 5 de 3 à 6 de 3 à 6 de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 1 de 2 à 1 de 3 à 1 de	francis De fe de francis de fe de fe
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbrique. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. — uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas. Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. o. Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. o. Turanta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles danceolées, or.	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 ais. de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 Harto de 3 à 6 E 2 à 4 de 2 à 4	transfer ber ber ber ber ber ber ber ber ber b
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbrique. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. — uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas. Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. o. Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. o. Turanta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles danceolées, or.	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 ais. de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 Harto de 3 à 6 E 2 à 4 de 2 à 4	transfer ber ber ber ber ber ber ber ber ber b
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. : — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. de Puranta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa. (pineus. or. b. Inermis. Var. sans évines. or.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 1 de 2 à 2 de 2 à 2 de 2 à 2 de 2 à 3 de 2 de 2 à 3 de 2 de	ני מינים בינים אינים אינים בינים בינ
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Cours. = uniflora, Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domoheya ferruginea. Lam. s. ch. Dracena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Dracena de la Chine. † s. ch. d. Puranta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 2 de 2 de	נים בינים בי
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — B. decussata, Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 ais. de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 Harto de 3 à 6 E 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 3 de 2 à 4 de 2 à 3 de 2 à 4 de 1 à 4	נים בינים בי
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Coura. — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles évrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon o or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — alert Lam. — Dracéna de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisii, L. — Durante à feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées. or. a. Spinosa. (épineuse. or. b. Inermia. Var. Sans épines. or. c. Microphylla. H. P. (a petites feuilles. or Echium bifrons. D C. † or. — Candicans. Ait. — Vivérine blanchâtre. † w or.	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 for. 2 à 2 uis. == ide 2 à 4 de 3 à 5 de 3 à 6 de 4 à 6 de 6 1 à 6 de 6 1 à 6	נים בינים בי
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Coura. ; — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domoheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletti Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 5 de	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Coura. ; — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domoheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletti Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 5 de	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma, Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta, Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata, Dum. Coura. ; — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée à feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph, — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domoheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletti Lam. — Draccha de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisi, L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa.	de 2 à inia unific de 3 à 5 de 2 à 4 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 5 de	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles ésrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Ilolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Dracena de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisit. L. — Durante à feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles ovales. or. b. Ineermis. — Var. sans épines. or. c. Microphylla. H. P. — d apetites feuilles. or — Candicans. Ait. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Giganteum. L. F. — Vipérine gigantesque. † or. — Simplex. D.C. — Vipérine pyramidale. † or. — Vipescons. D.C. — E. candicans. Jaca. † or.	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 3 à 6 3 à 6 3 à 6 2 à 4 de 1 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 2 à 4 de 3 à 4 de 4 à 4 de 6 à 4 de 7 à 4	THE
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Coura. — uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Ilolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — alert Lam. — Dracena de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisiv. L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa. — Var. sans épines. or. c. Microphylla. H. P. — d a petites feuilles. or Echium bifrons. D C. † or. — Candicans. Ait. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Simplex. DC. — Vipérine pyramidale. † or. — Virescons. DC. — E. candicans. Jacq. † or. Embotrium salicifolium. Vent. — Hakes saligna. Dum	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 ais. == de 2 à 4 de 3 à 6 de 2 à 1 de 3 à 4 de 2 à 1 de 1 à 1	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Coura. — uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Ilolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — alert Lam. — Dracena de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisiv. L. — Durante à feuilles lanceolées, or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées, or. a. Spinosa. — Var. sans épines. or. c. Microphylla. H. P. — d a petites feuilles. or Echium bifrons. D C. † or. — Candicans. Ait. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Simplex. DC. — Vipérine pyramidale. † or. — Virescons. DC. — E. candicans. Jacq. † or. Embotrium salicifolium. Vent. — Hakes saligna. Dum	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 uis. == 1 de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 gais. 9. 2 à de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 1 de 2 à 2 de 2 à 4 de 2 à 3 de 2 à 4 de 1 à 3 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 4 à 8	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — B. decussata. Dum. Cours. — uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas. Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. of Dracœna terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Dracena de la Chine. † s. ch. of Duranta ellisit. L. — Durante a feuilles lanceoltes. or. — Plumierii. L. — Durante a feuilles ovales. or. a. Spinosa. b. Inermia. Var. and petites feuilles. or. — Candicans. Air. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Giganteum. L. F. — Vipérine gigantesque. † or. — Simplex. DC. — Vipérine gigantesque. † or. — Virescons. DC. — E. candicans. Jacq. † or. Embotrium salicifolium. Vent. — Hakea saligna. Dum. Embotrium a feuilles de saule. † vor.	de 2 à 1 nia unifio de 3 à 5 or. 2 à 2 de 2 à 4 de 2 à 4 de 3 à 6 de 3 à 6 de 2 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 1 à 4 de 2 à 4 de 1 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4 de 4 à 8 de 2 à 4	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccena de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisi. L. — Durante d feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante d feuilles ovales. or. a. Spinosa. b. Ineemis. Var. sans épines. or. c. Microphylla. H. P. — d apetites feuilles. or — Candicans. Ait. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Giganteum. L. F. — Vipérine gigantesque. † or. — Simplex. D.C. — Vipérine pyramidale. † or. — Vipescons. D.C. — Vipérine pyramidale. † or. Embotrium salicifolium. Vent. — Hakea saligna. Dum. Embotrium a feuilles de saule. † vor. Eranthemum salsoloides. L. F. † or. Erica able ina. L. — E. frondosa. Salisb. — E. cocci	de 2 à inia unifio de 3 à 5 de 7 à 5 de 2 à 4 de 2 de	E 11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thumb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — B. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Coura. — uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Carioshyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon y or. Ilolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Domheya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — alerti Lam. — Dracéna de la Chine. † s. ch. d Curanta ellisiv. L. — Durante à feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante à feuilles lanceolées. or. a. Spinosa.	de 2 à inia unifio de 3 à 5 de 7 à 5 de 2 à 4 de 2 de	E 11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Biosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — B. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodonœa angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles twois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. S. — Viscosa. L. — Prelea viscosa. Mill. — Cariophyllas. Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon vor. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. of the control of the	de 2 à 1 de 2 à 1 de 3 à 5 or. 2 à 2 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 Harto de 3 à 6 de 2 à 4 de 1 à 1 de 2 à 2 de 1 à 1 de 1 à 1 de 1 à 3 de 2 à 3 de 2 à 3 de 2 à 3 de 3 à 4 de 3 à 4 de 4 à 8 de 1 à 3 de 4 à 8 de 6 à 8 de 7 à 8 de 7 à 8 de 7 à 8 de 8 à 8 de 8 à 8 de 9 à 9	
Diosma cillata. L. — Diosme cilite. † or. — Cupressina. Thunb. — D. dichotoma. Berg. — Bru Lin. † or. — Ericoides. L. — D. rubra? — Diosme odorante. † — Filiformis — D. scoparia. — Diosme d bala filiforme. † or. — Imbricata. L. — Diosme imbriqué. † or. — Purpurea. Hortul. — D. hirta. Lam. — D. † or. — Uniflora. Thumb. — D. decussata. Dum. Cours. = uniflora. Berg. † or. Dodoncea angustifolia. L. F. — Dodonée d feuilles étrois — Triquetra. Wendl. — Dodonée triangulaire. §. — Viscosa. L. — Ptelea viscosa. Mill. — Cariophyllas Rumph. — Carpinus viscosa? Burm. — Dodon V or. Dolichos lignosus. L. — Dolic ligneux. or. Dombeya ferruginea. Lam. s. ch. Draccena terminalis. L. — D. ferrea? id. — aletri Lam. — Draccena de la Chine. † s. ch. d Puranta ellisi. L. — Durante d feuilles lanceolées. or. — Plumierii. L. — Durante d feuilles ovales. or. a. Spinosa. b. Ineemis. Var. sans épines. or. c. Microphylla. H. P. — d apetites feuilles. or — Candicans. Ait. — Vipérine blanchâtre. † vor. — Giganteum. L. F. — Vipérine gigantesque. † or. — Simplex. D.C. — Vipérine pyramidale. † or. — Vipescons. D.C. — Vipérine pyramidale. † or. Embotrium salicifolium. Vent. — Hakea saligna. Dum. Embotrium a feuilles de saule. † vor. Eranthemum salsoloides. L. F. † or. Erica able ina. L. — E. frondosa. Salisb. — E. cocci	de 2 à 1 de 2 à 1 de 3 à 5 or. 2 à 2 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 de 3 à 6 Harto de 3 à 6 de 2 à 4 de 1 à 1 de 2 à 2 de 1 à 1 de 1 à 1 de 1 à 3 de 2 à 3 de 2 à 3 de 2 à 3 de 3 à 4 de 3 à 4 de 4 à 8 de 1 à 3 de 4 à 8 de 6 à 8 de 7 à 8 de 7 à 8 de 7 à 8 de 8 à 8 de 8 à 8 de 9 à 9	

Erica Bullaris. Salisb. == E. granulata. L. = = E. pikulifera. = multumbellifera. Berg. = Bruyère à bulles. S. † de 2 à 4 f. Caffra. L. = E. lamellaris. Salisb. = E. corifolia. = E. Aggregata? Hortul. = Bruyère lamellée. s. † de 2 à 4 f. Conspicua. Willd. = Bruyère remarquable. s. † de 2 à 4 f. Ignescens. Andrews. = E. cuspidigera. Salub. = Bruyère porte-dard. † s. de 2 2 4 f.
Laniflora. Wendl. = E. sordida. Andrews. = E. floccosa. Salisb. = E. procera? Willd. = Bruyère laineuse. † s. de 4 à 6 f. - Lentiformis. Salish. = E. umbellata. L. = Bruyere leutiforme. † s. Pendula. Willd. = E. cupressina. Horeul. = Erica turrigera. Salisb. = Bruyère turrigére. † s de 3 à 6 f. Pilulifera. L. = F., nudicaulis. Berg. = E. piluliformis. Salisb. = Bruyère piluliforme. + s. de 2 à 4 f. Pubescens. L. = E. p. pilosa. Thunb. = E. pallida. Salisb. = Bruyère pâle. † s. de 2 à 4 f. Polytrichitolia. Salisb. = Bruyère à feuilles de polytric. † s. de 4 à 6 f. Urceolaris. Salisb. = E. dura. Soland. = E. hirta. Thunb. Bruyère urceolle. † s. de 3 à 5 f.

Virgularis. Sal. = Bruyère effilée. † s. de 2 à 4 f.
Eriocephalus africanus. L. = Eriocephale à corymbes. † or. 1 à 3 f.
Erythrina corallodendrum. L. = E. spinosa. Mill. = Erythrine des Antilles. = Bois immortel. = Arbre du corail, s. ch. de 6 à 12 f. Eucalyptus capitellata? Smith. + & de 4 à 10 f Robusta. Smith. = Eucalyptus gigantesque. † or. de 5 à 12 f. Eugenia jambos. L. Jambosier à larges feuilles. = Pomme rose. † s. ch. de 4 a 8 f. pendunculata. L. = Jambosier uniflore. † s. ch. de 5 à 8 f. Euphorbia antiquorum. L. = Euphorbe des anciens. † or. de 2 à 3 f. Attopurpurea. Brouss. = Euphorbe d seurs pourpres. for. 3 à 5 s. Canariensis. L. = Euphorbe des Canaries. for. de 3 à 4 s. Caput-medusce. L. = Euphorbe tête de Méduse. or. de i à 2 f. Clava. Ait. = E. canaliculata. Lam. = Euphorbe en massue. Loricata. L. = E. histrix. Jacq. = Euphorbe cuirassée. or. de 2 à 4 f. Neriisolia. L. = Euphorbe d feuilles de laurose. or. 2 à 3 s. Officinarum. L. = Euphorbe officinale. or. de 2 à 4 s. Tirucalli. L. = Effice. or. de 1 à 3 s. - Tridentata. Lam. = E. anacantha. Ait. = Euphorbe d trois de 1 à 2 f. dents. or. Fabricia levigata. Smith. = Fabricia glabre. † or. de 3 à 5 f. Fleus Benghalensis. L. = Figuier du Bengale. † S. ch. de 3 à 4 f. Benjamina L. = F. microcarpa. L. F. = Figuier benjamin. † s. ch.

de 2 à 4 f.

Populifolia. Desf. = Figuier à feuilles de peuplier. † s. ch.

de 3 à 5 f. Racemosa. L. = Figuier d grappes. † S. ch. de 3 2 8 f. Religiosa. L. = Figuier des pagodes. † S. ch. de 3 2 6 f. Rubiginosa, Desf. = F. australis. Willd. = F. novæ Walliæ = F. botany-bay. Hort. Lond. † s. ch.

Stipulata. Ait. = Figuier campant. † s. ch.

Fischeria scandens. D.C. An Gonolobium? Mich. s. ch. de 2 à 4 f. de 2 à 3 f. Franseria ambrosioïdes. Cav. = Xanthium fruticosum. L. F. = Ambrosia arborescens. Lam. = Franseria en arbre. or. 2 à 3 f. Fuchsia coccinea. Air. = F. Magellanica. Lam. = F. triphylla. L. = Puchsis écarlate. † v de 1 à 4 f. Garcínia mangoustana. L. = Mangoustan cultivé. † s. ch. 80 à 100 f. Gardenia florida. L. = Jasminum capense. Mill. = Gardenie à larges fleurs. † S. ch. de 2 à 4 f b. Flore pleno. Var. de 2 à 5 f. c. Multiflora. Var. Multiflore. † S. ch. de 2 à 5 f. de 2 à 5 f. de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. Geranium acetosum. L. (Pelargonium. Willd.) Geranion acide, † 1 à 2 f. = Alchemilloides. L. = G. pied de Lion. + or. de 1 à 3 f. = G. rutilans. Anemonoefolium. l'Hérit. = G. palmatum. Cav. de 1 à 3 f. Ehrh. & or.
Bicolor. == G. bicolore. † or... de 2 à 3 f. Capitatum. L. = G. d odeur de rose. † or. de 1 à 3 £.

Gerantum Cordifolium Cav. = G. cordatum. Air. = G. feuilles en cœur. † or. de 1 à 3 f.
- Crispum. L. = G. hermanniæfolium. Cav. = G. cirlodorum? Cav. + or. de 2 1 3 f.
- Cucullatum. L. = G. en entonnoir. † or. v de 1 h 3 f. - Echinatum. Curt. = G. hamatum. Hacq. = G. d crochets.
† or. de 2 à 3 f.
Elegans. Andrews. = G. elegant. † or. de 2 à 3 f. Exstipulatum. Cav. = G. suave. Hort. Angl. = G. sans stipules.
t or. de 2 à 3 f. Fragrans. Hort. Angl. = G. africanum. Cav. = G. d'Afrique.
f or. Fulgidum. L. = G. éclatant. † or. de 2 à 3 f. de 2 à 3 f.
— Gibbosum. L. — G. goutteum †. or. de 2 à 3 f. — Glutinosum. l'Hérit. — G. crategifolium. Roth. — G. visco-
sum. Cav. = G. glutineux. † or. de 1 à 2 f. — Hybridum. L. = G. roseum. Ehrh. = G. igneum. Hortul.
= Géranion hybride, † dr. de 1 å 2 f. Inquinans, L. = G. tachant. † or. de 1 å 2 f.
— Marginatum. Cav. = G. bordé. † or. de 1 å 2 f. — Odoratissimum. L. = G. très odorant. † or. de 1 å 3 f.
— Papilionaceum. L. = G. papillonacé. † or. de 1 à 3 f. — Peltatum. L. = G. ombiliqué. † or. de 1 à 2 f.
— Quercifolium. L. = G. à feuilles de chêne. † or. de 1 à 2 f. — Radula. Cav. = G. revolutum. Jucq. † or. de 1 à 2 f.
b. Rosea. † or. de 1 à 3 f.
Terebinthlnaceum. Cav. = G. graveolens. l'Hérit. † or. 1 à 2 f. Tetragonum, l'Hérit. = G. tetragone. † or. de 2 à 3 f.
— Tomentosum, Jacq. — G. fragrans, Hort. Angl. † or. 1 2 3 f. — Tricolor. Curtis. — G. violarum, Jacq. — G. tricolore. †
or. de 2 à 3 f. Vitifolium. L. = G. d odeur de mélisse. † vor. de 1 à 2 f.
$-$ Zonale $I - G$ degener $+$ or $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ for
b. Sanguineum. Var d fleurs sanguines. † or. 1 2 f. c. Variegatum. Var d fleurs sanguines. † or. 1 2 f. Glycine cariboea. Jacq. == Glycine rampante. §. or. de 1 2 f.
- Rubicunda. Willd. = Kenedia rubicunda. Vent. = Glycine rouge. S. or. de 3 a 5 f.
Chambalium esientele : I
Gnaphalium orientale. L. = Immortelle jaune. † or. de 75 c. à 3 f.
Gnidia simplex, L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidianne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f.
Gnidia simplex, L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gortérie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyplum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia. Lam. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. 8 de 3 à 4 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie à grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia. Lam. = Gouane à feuill. entères. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B.
Gnidia simples, L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gortérie à grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyplum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambosc. † or. 1 à 3 f. Gouania integrifolia. Lam. = Gouane à feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Nakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua. Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis, Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia. Lam. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. DC. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloides. Smith. = Banksia dactyloides. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis, Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia. Lam. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloides. Smith. = Banksia dactyloides. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis, Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Gonane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier d fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Nakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Uercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † w de 1. 3 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia, Lam. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloides. Smith. = Banksia dactyloides. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f Pugioniformis, Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = H. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodie droite. † y de 1 à 3 f. Hedysarum. paniculatum L. = Samfoin pan culé. or. y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope d grandes
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gortérie à grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Gouane à feuill, entières, s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava, D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Makea dactyloïdes, Cav. = H. obliqua, Hort, Angl. = Conchium dactyloïdes, Smith. = Banksia dactyloïdes, Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. — Pugioniformis, Cav. = H. glabra, Sert, Hannov. = Conchium, Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida, L. = Hallerie luisante, or, de 2 à 3 f. Haloragis cercodia, Ait. = II, tetragonia, l'Hérit. = H. alata, Jacq. = Cercodie droite. † y de 1 à 3 f. Hedysarum, paniculatum L. = Sumfoin paniculé, or. y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort, Angl. = Héliotrope à grandes fleurs.
Gnidia simples. L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. Gorteria ringens L. = Gorterie à grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Gouane à feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides. Cav. = H. obliqua. Hort. Angl. = Conchimo dactyloides. Smith. = Banksia dactyloides. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchimo Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 4 à 10 f. Halloragis cercodia. Ait. = H. tetragonia. l'Hérit. = H. alast. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y Hedysarum. paniculatum L. = Sumfoin pan culé. or. y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope à grandes fleurs. de 2 à 4 f. Peruvianum. L = Héliotrope à odeur de vanille. = H. du Pérou. de 1 à 3 f. Hermannia hystopolifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope.
Gnidia simples. L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gorterie à grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Gouane à feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Nakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua. Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope à grandes fleurs Peruvianum. L = Héliotrope à odeur de vanille. = H. du Pérou. Hermanne à feuilles d'hysope. † de de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † de de 1 à 3 f. Hermanne hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † de Repens. N. = H. species-nova? Hort. Monsp. = Hermanne
Gnidia simples. L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gortérie à grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Gouane à feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua. Hort. Angl. = Conchimum dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. — Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchim. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Halleria luisante. or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Halleria luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope d grandes fleurs. — Peruvianum. L = Héliotrope d odeur de vanille. = H. du Pérou. de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 2 à 3 f. Scabra. Willd. = Hermanne rude. † or. de 2 à 3 f. Scabra. Willd. = Hermanne rude. † or. de 2 à 3 f.
Gnidia simples. L. = G. viridis. Berg. = Nectandra. Juss. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier d fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Nakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua. Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope d grandes fleurs. Peruvianum. L. = Héliotrope d odeur de vanille. = H. de 1 à 3 f. Pérou. Hermanne hystoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Repens. N. = H. species-nova? Hort. Monsp. = Hermanne rampante. † or. de 2 à 3 f. Hermanne right, de 1 à 3 f. Hibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiseus diversifolius. Jacq. = iI. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. Gorteria ringens L. = Gorterie à grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia, Lam. = Gouane à feuill. entières, s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava, D.C. = Greuvier à fleurs jaunes, y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides, Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. == Conchium dactyloïdes, Smith. = Banksia dactyloïdes, Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis, Cav. = H. glabra, Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida, L. = Hallerie luisante. or. de 4 à 10 f. Halloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray, = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y Hedysarum, paniculatum L. = Sumfoin paniculé. or. y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope à grandes fleurs. de 2 à 4 f. Peruvianum. L = Héliotrope à odeur de vanille. = H. du Pérou. de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hermannia hysioppifolia. L. = Hermanne rampante. † or. de 1 à 3 f. Hibiscus diversifolius. Jacq. = H. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Manihot. L. = Ketmie à feuilles de manihot. or. de 2 à 3 f. Proemorsus. = Pavonia cuneifolia. Cav. = P. proemorsa. de 1 à 5 f.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne d feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gorteria ringens L. = Gorterie d grandes fleurs. or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum. L. = Gouane d feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava. D.C. = Greuvier d fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Nakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchium dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchium. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Hallerie luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope d grandes fleurs. de 2 à 3 f. Peruvianum. L = Héliotrope à odeur de vanille. = H. du Pêrou. Hermanne à feuilles d'hysope. † de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † de 1 à 3 f. Hibiscus diversifolius. Jacq. = 11. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Mibiscus diversifolius. Jacq. = 11. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 3 f. Proemorsus. = Pavonia cuneifolia. Cav. = P. proemorsus. Willd. or. de 1 à 3 f. Albicus diversifolius. Jacq. = 11. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 3 f. Proemorsus. = Pavonia cuneifolia. Cav. = P. proemorsus. & A. Flore simplici. & de 1 & Chine. s. ch.
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. de 2 à 3 f. Gosteria ringens L. = Gortérie à grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gouania integrifolia, Lam. = Gouane à feuill. entières. s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava, D.C. = Greuvier à fleurs jaunes. y de 3 à 4 f. Hakea dactyloïdes. Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchimum dactyloïdes. Smith. = Banksia dactyloïdes. Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis. Cav. = H. glabra. Sert. Hannov. = Conchimum. Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida. L. = Halleria luisante. or. de 2 à 3 f. Haloragis cercodia. Ait. = II. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray. = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope d grandes fleurs. Peruvianum. L = Héliotrope d odeur de vanille. = H. du Pérou. de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hermannia hyssoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hibiscus diversifolius. Jacq. = 11. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. — Manihot. L. = Ketmie à feuilles de manihot. or. de 2 à 3 f. Froemorsus. = Pavonia cuneifolia. Cav. = P. proemorsus. Willd. or. de 1 à 2 f. de 1 de
Gnidia simples, L. = G. viridis, Berg. = Nectandra, Jus. = Gnidienne à feuilles de lin. † or. Gorteria ringens L. = Gorterie à grandes fleurs, or. de 1 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Cotonnier de Fernambouc. † or. 2 à 3 f. Gossyphum arboreum, L. = Gounne à feuill. entières, s. ch. 3 à 5 f. Grewia flava, D.C. = Greuvier à fleurs jaunes, y de 3 à 4 f. Hakea dactyloides, Cav. = H. obliqua, Hort. Angl. = Conchimo dactyloides, Smith. = Banksia dactyloides, Gart. = B. gibbosa? White. † or. de 4 à 10 f. Pugioniformis, Cav. = H. glabra, Sert. Hannov. = Conchimo Smith. † or. de 4 à 10 f. Halleria lucida, L. = Hallerie luisante. or. de 4 à 10 f. Halloragis cercodia. Ait. = H. tetragonia. l'Hérit. = H. alata. Jacq. = Cercodia erecta. Murray, = Tetragonia iveefolia. L. = Cercodée droite. † y de 1 à 3 f. Heliotropium grandiflorum. Hort. Angl. = Héliotrope à grandes fleurs. Peruvianum, L = Héliotrope à odeur de vanille. = H. du Pérou. de 1 à 3 f. Hermannia hystoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hermannia hystoppifolia. L. = Hermane à feuilles d'hysope. † or. de 1 à 3 f. Hibiscus diversifolius. Jacq. = H. ficulneus? Cav. † s. ch. 2 à 4 f. Manihot. L. = Ketmie à feuilles de manihot. or. de 2 à 3 f. Proemorsus. = Pavonia cuneifolia. Cav. = P. proemorsas. Willd. or. de 1 à 2 f. Roza-sinensis. L. = Ketmie rose de la Chine. s. ch. a. Flore simplici.

Hypericum sinense. L. = H. monogynum. = Mille pertuis de la Mine. f or. de adre f. Illicium floridanum, L. = Badiane de la floride + or. clum floridanum. L. = Badiane de la floride † or. de 3 à 8 f. - Parviflorum. Mich. = I. anisatum. Bartrams. = Badiane d petites fleurs. + or.
Indigotera ergentes. L. = Indigot argente. & ch. de zaaf. Ixora coccinea. L.= I. ternifolia. Cav.=Cerasus pavonina? or. 2 & 4 Jasminum zzoricum, L. = Jasmin des açores, † or. de 1 à 3 f. — Geniculatum. Vent. == Jasmin genouillé. † or. de 1 à 4 f. — Glaucum. Thunb. == J. ligustrifolium. Lam. == Nyctanthes glauca. L. sup. † S. or. Grandillorum. L. = Jasmin d'Espagne. † v or. 50 c. 2 f. 50 c. Multiflorum. Hort. Angl. = J. pubescens. Willd. = Mogorium multiflorum. Lam. = Jasmin multiflore. S. ch. 6 a 22 f. odoratissimum. L. = Jasmin jonquille. de 1 à 2 f. co c. - Sambac. L. = Nyctanthes sambac. = Jasminum arabicum.

Rumph. = Jasmin d'Arabie. or. de 50 c. à 2 f. Rumph. = Jasmin d'Arabie. or. de 50 c. à 2 f. b. Flor. multiplic. Ait. = Jasmin d'Arabie d fleurs doubles. or. de 2 à 3 f. c. Flor. plenis. Ait. — Nyctanthes etrusca. — Jasmin du grand Duc. — J. de Toscane. or. de 4 à 6 f. Jatropha curcas. L. = Castiglionia lobata. Ruiz et Pav. = - Midecinier Cathartique. s. ch. de ç à 8 f. cinier Cathartique. s. cn.

Justicia adhatoda. L. = Carmentine. = Noyer de Ceylan. & de z a z Echolium. Vahl. = Carmentine d crochet. + s. ch. de 2 à 3 f. Formosa. Willd. - Carmentine elegante. S. ch. de 3 à 4 f. Hyssopifolia. L. = Carmentine & feuill. d'hysope. + or. 2 à 4 f. Nasuta. Hortul. = Carmentine tubuleuse. † or. de 3 à 4 f. — Oxyphilla. Hortul. † s. ch. de 3 à 6 Kalanchoè OEgyptiaca. D.C. — Cotyledon nudiceulis. Murr. de 3 à 6 f. C. OEgyptiaca. Lam. = Cotylet d'Egypte' † or. de 1 à 3 f. Kiggelaria africana. L. = Kiggellaire d'Afrique. de 2 à 4 Lantana aculeata. L. = camara piquant. or. de 1 à 3 f. Camara. L. = Camara à fleurs varites. or. de 2 à 3 f. - Nivea. Vent. = Camara à fleurs blanches. or. de 2 à 4 f. Laurus camphora. L. = Laurier camphrier. + or. de 8 à 15 Foetens. Air. = L. maderiensis. Lam. = Laurier de madère. de 4 a 8 f. - Glauca, Thunb. = Laurier glauque. † or de 5 à 8 - Indica. L. = Laurier des Indes. = L. Royal. † or. 3 à 10 de 5 à 8 f. Lavatera acerifolia. Brouss. = Lavatère à feuilles d'érable. de rart. & or. Leptospermum acuminatum. F. B. == Leptosperme cotonneux. de 2 2 4 f. Juniperinum. Smith. == Melalenca tenuifolia. Wendl. † or. - Lanigerum. Smith. = L. tomentosum. Hort. = Philadelphus laniger. Ait. + or. de 2 3 4 fe b. Pubescens, Willd. + or. de z à Af. c. Rubicaule. † or.
Scoparium. Smith. Squarrosum. Gært. Melaleuca scoparia. Forst. = Philadelphus scoparius. Aie. = P. floribundus-Usteri. † or.

Thea. Willd. = L. flavescens. Smith. = Leptosperme the. de 2 à:4 %. Lespedeza fruticosa. Pers. = Hedysarum frutescens. L = Medide iligh cago virginica. y Linum trigynum. Hortul. = Lin & trois styles. = L. de la Chine. de 2146 Lomandra longifolia. Labill. or. Lonicera japonica. Thunb. == Chevre-feuille du japon. † §. or. de z f. 50 c. 4 4-f. Lopezia miniata. D C. † or. de zazif. Lotus jacoboeus. L. = Lotier de St. Jacques. † or. de 1 à 2 f. Loureira cuneitolia. Cav. — Monzinna spathulata. Orteg. or. 5 à 8 f. Mahernia incisa. Jacq. — Hermannia incisa? Willd. † or. 2 à 3 f. Malpighia glabra. L. = Malpighie glabre. = Cerisier des antilles. † s. ch. — Macrophylla. Desf. = Malp. à larg. feuill. † s. ch. 10 à 15 f. Malva abutiloides. L. = Mauve abutiloide. † de ru & f. - Miniata. H. P. = M. coccinea. Ait. = Mauve écarlate. de za sf. Umbellata. Cav. = Mauve ombellée. or. de 1 f. 50 c. à 3 f. Melaleuca armillaris. Smith. = M. ericæfolia. Vent. † or. 3 44 f. - Citrina. Horrul. = M. shea? † or. de jäif.

Melalonos diosmosfolia. F. B. = Melalenque à feuilles de diosma.	N
† or. — Briccefolia. Smith. — M. à feuilles de bruyère. † or. de 2 à 3 f.	N
- Hypericifolia. Smith. = Metrosideros myrtifolia. Hortul. =	O
- Styphelioides, Smith, = M. obliqua, = Mel. & feuilles	O
contournées. † or. de 3 à 4 f. Thymifolia. Smith. = M. gnidicefolia. Vent. = M. coronata.	О
Andrews. = Metrosideros calycina. Cav. † or. de 3 de f. - Trinervia? Hort. Angl. † or. de 4 d 8 f.	-
Melissa fruticosa. Hort. = Melisse frutescente. † or. I f. 50 C. à 2 f. Mentzelia aspera. Cav. = M. hispida. Willd. = Mentzelie rude.	-
or. de 2 d 4 f.	00
Mesembrianthemum. acimaciforme. L. = Fuelde à feuill. en subre. or. de 50 c. à 2 f.	ŏ
Barbatum. L. = Ficolde barbu. or. de 50 c. 22 f. Calamiforme. L. = Ficolde calamiforme. or. de 1 2 3 f.	P
- Cordifolium. L. = Ficoide d feuilles en cour. or. 50 c. 1 f. Deltoides. L. = Ficoide deltoide. or. de 50 c. 1 f.	l
— Dolabriforme. L. = Ficoide en doloire. or. de 50 c. à 2 f. — Echinatum. Ait. = Ficoide hérissé. or. de 50 c. à 2 f.	P
Mesembrianthemum linguiforme. L. = Ficoide linguiforme. or.	P
de 50 c. à 1 f. 50 c. b. Obliquum. Haw. (d fewill. étroites. or. 50 c. à 1 f. 50 c.	P
c. Latum. Haw. Var.) à feuilles larges. or. de 1 à 2 f.	P
d. Scalpratum. (dangles tranchants.or.50c. a.f. 50c. Noctiflorum, L. — M. stramineum, Haworth. = Ficolde	-
noctiflore. or. de 50 c. à 1 f. 50 c. Runcinatum. Hort. or. de 50 c. à 1 f. 50 c.	=
— Spinosum. L. = Ficolde épinenx. or. de 1 à 2 f. — Tenuifolium. L. = Ficolde à feuill. menue. or. de 50 c. à 2 f.	1=
Uncinatum, L. or. de 50 c. 2 1 f. 50 c.	P
Messerschmidia fruticosa. L. = Arguse frutescente. or. y 2 å 3 f. Metrosideros acuminata? Dum. Cours. = M. scabra. Hortul. †	P
or. de 2 à 5 f. Angustifolia? Smith. — Myrtus angustifolia. L. — Met. d	P
feuilles étroites. † or. de 2 à 5 f. Lanceolata. Smith. = M. citrina. Curtis. † or. de 3 à 6 f.	P
Laurifolia, Hort, = M. floribunda. Smith. = M. connata? Desf. = M. multiflore. = M. d feuilles de laurier. † or.	
de 4 à 8 f. Linearis. Smith. Met. à feuilles linéaires. † or. de 2 à 5 f.	-
- Lophantha. Vent. = Met. d panaches. t or. de 1 à § f.	}
b Angustifolia. † or. de 2 à 5 f. c. Cressifolia. Hort. Angl. † or. de 2 à 5 f. Marginata. Cav. M. latifolia. Hortul. Met. borde. †	-
or: Marginata. Cav. = M. latifolia. Hortul. = Met. borde. †	_
- Myrtifolia. Hort. = M. ciliata? Smith. = M. buxifolia. Dum. Cours. † or. de 3 a 6 f.	-
— Saligna. Smith. — Met. d feuilles de saule. † or. de 2 à 5 f. — Viminalis? — M. lucida. N. An. Melaleuca trinervia? † or.	PI
de 3 à 10 f. Mimota asperata. L. M. pigra. Lam. M. irritabilis. Dum.	Pi Pi
Cours, s. ch. de 3 à 5 f.	-
— Padica. L. — Mimeuse pudique. — Sensitive commune. S. ch. de 1 à 3 f.	-
— Sensitiva. L. — Sensitive grimpante. s. ch. de 4 à 8 f. Mimulus glutinosus. Willd. — M. aurantiacus. Curtis. — Mimule	-
glutineuse. = M. orangte. † v or. de 2 à 3 f. Guttaus. D C. = Mimule ponctuee. v or. de 2 à 3 f.	Pi
Murraya exotica. L. — Chalcas paniculata? Mant. — C. cam- muhenh? Burm. — Marsana buxifolia. Sonnerat. † s. ch.	Pi
de 3 à 6 f. Myrica banksiæfolia. Vendl. = M. serrata. Lam. = Galet à feuill.	PI
dentées. † or. de 3 à 5 f. Cordifolia. L. = Galet à feuilles en cœur. † or. de 2 à 4 f.	PI
- Lacinizta. Wendl. = Galet a feuilles decoupees. Tor. 2 a 4 i.	
— Quercifolia. L. = Galet à feuilles de chêne. † or. de 3 à 4 f. Myrtus com. et varies (vide pag. 19.)	Pi Po
Pimenta. L. = M. citrifolia. Poir. = Caryophyllus pimenta. Mill. = Mirthe piment. = M. toute épice. = Piment	Po
de la Jamaïque. † s. ch. de 10 30 f. Nerium dubium. Balbis. — N. flavescens. Spin. — N. luteum.	Pr
Targ. = Laurier rose jaune. † or. de 2 à 4 f.	_

erium odorum. Willd. = Laurier rose fodorant & fleurs doubles. † or. de 1 à 3 f. issolia frutiqueuse. §. or. s. ch. 3 à 4 f. cymum gratissimum. L. = O. zeylanicum. Burm. = Basilic de Ceylan. † s. ch. d Edera prolifera. Thunb. — Buphthalmum capense. L de 2 à 3 f. = OEdère prolifère. † or. de 2 à 4 f. lea americana, L. = Olivier d'Amérique. or de 3 à 6 f. - Capensis. L. = O. coriacea. Ait. = Olivier du Cap. + or. de 4 à 8 f. - Fragrans. Thunb .- Osmanthus fragrans. Loureiro. - Olivier de 3 à 5 f. odorant. † or. riganum dictamus. L. = Dictame de crête. † or., de 1 à 2 f. de 2 1 3 f. rontium japonicum. L. = Oronce du Japon. s. steospermum moniliferum. L. = Ostcosperme - Porte-collier. t or. de 2 à 3 f. ceonia moutan. Bompl. = P. arborea. Hort. Cantabrig. = P. suffruticosa. = P. papaveracea. Andrews. = Pivoine moutan. = Pivoinc en arbre. or. de 20 à 45 f. allasia grandislora. Willd. = Encelia halimifolia. Cav. † s. ck. de 3 à 5 f-anax aculeatum. l'Hêrit. — Zanthoxylum trifoliatum. L. — Ginseng à aiguillons. † or. de 2 à 3 f. arkinsonia aculcata. L. S. de 4 à 10 f. 'assiftora alata. Ait. = Grenadille ailée. † \$. s. ch. de 2 à 4 £.

Angustifolia? Swart. = P. heterophylla. Jacq. = P longifolia. Lam. \$. s. ch.

Holoserices I = C — Holosericea. L. = Grenudille soyeuse. § † s. ch. de 3 à 6 c. — Murucuja. L. = P. plicata? = P. lunata. Biroli. de 3 à 5 f. - Laurifolia. Willd. = Grenadille à feuilles de laurier. 5 à 8 f. - Suberosa. Cav. = Grenadille d écorce subfreuse. de 2 à 3 f. elargonium. (vide Geranium.) etiveria alliaceu. L. = Pétivier à odeur d'ail, † s. de 3 à 4 f. haseolus caracalla. L. = Haticot à grandes fleurs. = Caracolle. §. w or. de rabf. homix ductylifera. L. = P. excelsior. Car. = Dattier commun. = Palmier. † v or. de 1 à 10 £. hylica buxifolia. L. = P. ledifolia? Hert. Monsp. = Philice de 3 4 4 f. à feuilles de buis. † or. b. Cordifolia? † or. de 3 4 4 f. - Cylindrica. Pers. † or. de 3 à 5 ê - Ericoïdes. L. — Phylice à feuilles de bruyère. — Bruyère du Cap. vulg. † or.
b. Acerosa. F. B. † or.

Nitida. Lam. P. eriophoros. Ait. P. horizontalis. Hortuls
de 2 4 4 f. = Phylice luisante. + or. de 3 à 4 f. de 3 à 5 f. - Plumosa. = Phylice plumeuse. † or. de 3 à 5 - Rosmarinifolia. Hortul. = Phylice à feuilles de romarin. or. de 3 4 4 f. - Spicata. L. == Phylice en épi. † or. de 2 à 4 f2 de 1 à 3 f. hyllis nobla. L. == Phyllis des Canaries. † S. iysalis somnifera. L. or. de raif. iper blandum. L. † s. ch. de 2 à 3 f. - Magnoliæfolium. Jacq. = Poivre à feuilles de magnolier. s. ch. de z à z f. - Medium. L. s. ch. de 4 3 6 f. - Nigrum. L. = P. aromaticum. Lam. = Poivre aromatique. S. ch. de sa 8 f. - Obtusifolium. Willd. † de 2 à 3 f. OEschinomene miniata. Orteg. scidia punices. Cav. = Piscidie écarlate. ittosporum undulatum. Vent. † de 3 à 5 fa lectranthus fruticosus. l'Hérit. = Germanea urticoefolia. Lam. de Ilzf. umbago rosea. L. = Dentelaire à fleurs roses. S. ch. de 3 à 4 f. - Scandens. L. = Dentelaire sarmenteuse. or. de 1 1 3 f. b. Zeylanica. == Dentelaire de Ceylan. or. de 1 à 3 f. lumerla alba. L. — Franchipanier d fleurs blanches. S. ch. 10 à 20 f. odalyria aurea. Willd. — Sophora aurea. Ait. — Virgilia. Lam. = Robinia subdecandra. l'Hérit. or. de 3 4 6 f. oterium candatum. Ait. == Pimprenelle en arbre. or. de 3 à 5 f. rotcea caudata ? Thunb. = P. hirta. Hortul. = Protee à queue. de roatzf. t or. - Cinerea, Air. = P. prostrata. Thunb. † or. de 3 à 6 f. Protes

	·	•	(
Protes cineres Hirts. = Protec velu. + ori	de	3	6
- Comifera. Thumb. = Protée confere † or.	de	5	6 1
Protes cineres Hirts. = Protée velu. † er. — Conifers. Thumb. = Protée conifere † or. — Divaricats? Hortul. † or. — Imbricats. Thumb. = Protée imbriqué. † or.	de	4	101
- Inbricato. Thumb. = Protee imbrique. † or. - Pal'ens. Thumb. = P. glauca. Hortul. = P.	onif	era	mas
== Protee pale. T or.	de	2 2	101
- Pinitolia! Thumb. = Protee a feuilles de nu	. +	or.	
— Saligna. L. = Protée à feuilles de saule. † or. Psidium montanum. Swartz. = P. aromaticam. V	_d e	4	6 f
Psidium montanum. Swartz. P. aromaticum. V	itma	nn.	=
Govavier de montagne. s. ch. — Pyriferum. L. = Gualava pyriformis. Gart. =	de	4 8 201	. Tuie
commun. or.	de	2 2	1 5 t
Psoralea bracteata. L. — P. cuneifolia. Dum. Cours. trifoliata? — Trifolium fruticans? L. — Pso	=	0	noni
	ralèe	d	épi
ovales † or	de	2 8	3 t
Ranwolfia glabra. Cav. — Vallesia cymbæfolia. Orteg. — Lycioides. Cav. or.	or.	3 3	101
Rhus leevigatum. L. = Sumae lisse. + or.	de de	. 2 :	4 1
Lucidum, L. == Sumac luisant, + or.	de	1 2	1 4 f
- Oxiacantholdes. Dum. Cours. = Sumac à seuille	s d'a	ube	pine
or.	de	3.8	5 f
— Suaveolens. Air. — Toxicodendrum. Mill. — My L. — Sumac odorant. or.			
Ricinus lividus. Jacq. = Ricin livide. = Palma christi.	ue C.ch	٠, •	8 1
Rivina humilis. L. = Piercea tomentosa, Mill. = 1	livin	: c	oton
neuse. + or.	đe	1 3	ı₹f
b. Canescens.	dе	2 4	3 1
— Lœvis. L. — Rivine glabre. † or. — Purpurascens. Schrad. — Rivine pourprée	de	I	3 1
Rochea coccinea. DC. = Larochea. Pers. = Crassi	la c	a a	4 f
† <i>or</i> .	đe	2 8	i₹f
- Falcita. DC. = Crassula retroflexa. Meerb.= C. obli	qua.	Ana	rew
== C. falcata. Dum. Cours. + br.	'de	2 à	r e f
Rondeletia americana. L. = Rondelet d'Ambrique. S. Ruellia varians. Vent. = Eranthemum pulchellum. And	cn. !	≤ a	8 1
ticia pulchella. = Justicia nervosa? Hort. Angl.	+ .s.	2 1	Jus∙ F
Rumex lunaria. L. = Oseille des Canaries. = O.	en z	irbi	e. †
Rumex Innaria. L. = Oscide des Canaries. = O.	qe.	1 4	2 f
Ruta pinnata. Ait. = Rue d feuilles ailes.	de	2 8	4 f
Saccharum officinarum, L. S. cannamella. Lam. officinal. — Canne d sucre. † 8 or. Salmea eupatorio. D. C. — Bidens scandens. Swarty.	<u></u>	- 0	ucre
Salmea eupatorie. D.C. = Bidens scandens. Swartz. =	= M	lika	nia
Pers. === Eupatorium Robani, Hortul, S. ch.	ae	2 1	1 A F
Salvia canariensis. L. = Sauge des Canaries. T + or	đe	2 à	2 f.
- Chamcedrifolia. Cav. = Sauge à feuill. de marum.	† ar	. I	2 2 f
- Chamoedrifolia. Cav. Sauge à feuill. de marum Coccinea. L. F. Sauge écarlète. 7 or Formosa. l'Hérit. S. nodosa. Flor. Peruv.	- S.	le	3 I.
roides. Glox. = Sauge élégante. † s.	de	₹ à	ς f.
roides. Glox. = Sauge elegante. † s. - Mexicana. Cav. = Sauge du Mexique. † or.	de	ź à	į f.
Pseudo-coccines. Willd. = Sauge fausse écarlate. Schinus molle. L. = Poivrier du Perou. † or. 1	or.	ı a	3 f.
Seminus molle, L. Polyrier du Perou. 7 or. 1	ue :	2 a	St.
Sempervivum arboreum. L. = Joubarbe arborescente +	de.	2 3	3 f
Glutinosum. Ait. = Joubarbe glutineuse. † or. Senecio elegans. L. = Seneçon elegant. = S. d	Afri	que	. `s.
de	50 0	:. à	2 f.
b. Flore pleno. = Seneçon elegant à fleur	dou	ble	s. s.
Seriesa fortida Willd - S huvitalia Dum Cours -	de — B	I a uck	3 I.
Serissa factida. Willd. = S. buxifolia. Dum. Cours. = coprosmoïdes. PHérit. = Disodia fasciculata. Lou.	- =	÷ S	per-
macoce fruticosa. H. P. = Lycium japonicum.	Thur	nb.	=
L. foetidum. L. F. = L. indicum. Retz. = Seris	sa d	feu	illes
de buis. == Austella, en chine. †	de	IÀ	2 f.
b. Flore pleno. + Sida carpinifolia. L. = S. planicaulis. Cav. = Sida	de :	za Ω•	5 E.
de charme, + or. de	76 0	. 4	* f
— Mollissima. Cav. = S. cistiflora. l'Hérit. = Side	ı vel	oute	·. †
or.	de 1	t a	2 f.
Sideritis canariensis. L. = Crapaudine des Canaries. †	or. 1	a	2 f.
Sideroxylon inerme? † or. Solanum balbisii. Dun. = S. viscosum. D.C. = S	de a . dec	, a urr	u I. Ene
Balbis. + or. de		4	ı f.
- Betacenm, Cav. = S. crassifolium, + or.	75 C	. 4	
	de 1	à	2 f.
- Coccineum. Jacq. or.	de 1 de 1	à	2 f. 2 f.
— Coccineum. Jacq. or. — Diphyllum. L. + or.	de 1 de 1	i à i à i à	2 f. 2 f. 2 f.
— Coccineum. Jacq. or. — Diphyllum. L. + or.	de 1 de 1	i à i à i à i	2 f. 2 f. 2 f. 2 f.

Solanum (acmianum, Ait. == S. numatifidum)	
Solanum lachiatum. Ait. = S. pinnatifidum. I	am. == S. recli-
natum. l'Herit. + or.	deragf
- Lanceolatum. Cav. † or.	de raz f
- Lycioides. L. or.	de rà 3 f
- Macrophyllum. L. = S. oporinum. Wild. =	= S. grandiflorum
Desf. == S. cymosum. Orteg. w or.	deräzf
- Marginatum, L. F. = S. niveum. Allioni. =	= S. abyssinicum.
Jaca.	de occ. à r f
- Pyrac inthum. Dun. = S. pyracanthos. Lam.	S. pyracantha,
Smith. = S. runcinatum? Wendl. +	le 75 c. à 1 f. 50 c.
- Radicans L. F. T Y	de soc. á i f.
Tomentoaum. L. † or. de	75 C. A T f. 40 C.
- Vespertilio. Ait Nycterlum cordifoliu	m. Vent. + or
	de zázf.
Sonchus fruticosus. l'Hérit == Laitron arbrisseau.	tor. de razf
Sophora tetraptera. Ait. = Soph. à quatre ailes.	vor. de zast
Sophora tetraptera, Ait. == Soph. à quatre ailes. Sparmannia africana. L. == Sparmanne d'Afrique	+ S. ch. 1 2 4 1
Stachytarpheta mutabilis. Pers Verbena muta	hilis Jaca s ch
·	de 2 à 3 f.
Stapelia ciliata. Stapele ciliée s. ch.	de 1 à 2 f.
Hirsuta. L. = Stapele velue. S. ch.	
- Hirtolla U Monen C ch	de 1 à 2 f.
- Hirtella. H. Monsp. s. ch. - Multiflora. D.C. = Stapele multiflore. s. c	de 1 à 2 f.
- Multinori, D.C Stapele mulcipiore. 3. 6	h. de 1 à 2 f.
Picta. Hort. Monsp. S. ch.	de 1 d 2 f.
- Revoluta. Mass. = Stupele roulde. s. ch.	de razf.
— Variegata. L. = Stapele variée. = Fleur	de crapaud. or.
de	50 C. 1 I f, 50 C.
Statice crispa. Mortul. == S. mucronata. L. F. +	Y de 1 à 2 f. 50 c.
Stevia purpurea. Pers. == S. Eupatoria? Wil	ld. === Mustelia
eupatoria. Spreng. = Stevia à fleurs	pourpres. Y or.
	de so c. a z f.
- Serrata. Cav. = Ageratum punctatum. O	rteg. = Stévie
dentée. y or	de coc. à 2 f.
Styphelia guidium, Vent. = S. daphnoides? DC	. === Lencopogou
lanceolatum. Brow. = Styphelie guidien	ME: + S. 2 2 4 F.
lanceolatum. Brow. = Styphelie gnidien Pagetes lucida. Cuv. = T. integritolia. Orteg.	or de rabaf
L'amarindus indica. L. = Tamarin.	de 10 2 20 f.
Farchonanthus camphoratus. L.= Tarchonanthe can	namid to a 2011
Payer alamana die to T Amaria Thurb	
	- Dodomenus
Taxus elongata, Ait. = T. copensis, Thunb.	= Podocarpus
elonenta. l'Ilérit. T y	de 2 à 6 f.
elongata. Γ'l/érit. Τ γ Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei	de 3 à 6 f. uilles étroites.
The bohea. L. T. stricts. Ait. The d fee T. bout. + Y or.	de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f.
elongata. Illeiu. T Y Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thá à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le	de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f. rges feuilles. —
elongeta. Fileric † Y The bohea. L. == T. stricta. Ait. == Thi à fei T. bout. † Y or. Viridis. L. == T. laxa. Ait. == Thé à le Thé vert. † Y	de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f. arges feuilles. — de 6 à 12 f.
elongata. Illerit. † Y Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thi à fei T. bout. † Y or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thi à la Thi vert. † Y Thymus filiforme. † Y etc.	de 3 à 6 f. de 3 à 6 f. uilles étroites. == de 5 à 10 f. mges feuilles. == de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thé à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à la Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † † Tournefortia volublis. kam. — Pittonne grimvai	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. arges feuilles. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. tre 8. S. ch. 2 à 4 f.
elongata. Illetit. T Y Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thá à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à la Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volublis. kam. — Pittoune grimpai Tradescanta discolor. Smith. — T. spaticea. S	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. e 50 c. à 1 f. 50 c. nte 9, 8, ch. 2 à 4. wart, Ephe-
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. == T. stricta. Ait. == Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. == T. laxa. Ait. == Thé à le Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. == Thym filiforme. † † Cournefortia volubilis. kam. == Pittonne grimpai Tradescantà discolor: Smith. == T. spaticoa. S mère à deux couleurs. † 5. ch.	de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f. mges feuilles. — de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. te 50 c. à 2 4 f. warry. — Ephe- de 2 à 4 f.
elongata. Illerit. † Y Thea bohea. L. == T. stricta. Ait. == Thé à fei T. bout. † Y or Viridis. L. == T. laxa. Ait. == Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. == Thym filiforme. † Y à Tournefortia volubilis. Lam. == Pittenne grimpai Tradescanta discolor: Smith. == T. spatacea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropoeolum majus b. Flore pleno. == Capucine d	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. nte 50 c. à 1 f. 40 f. warty. Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. fleurs doubles.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à la Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † è Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescautha discolor. Smith. = T. spatucea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. tee §. S. ch. 2 à 4 f. warsq. Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f.
elongata. Illerit. T Y Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thá à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thá à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volubilis. kam. — Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinite. —	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. e 50 c. à 1 f. 50 c. tre §. \$. ch. 2 à 4 f. warty. Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. Plante serin.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † è Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescanta discolor. Smith. = T. spat.coa. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. S. S. ch.	de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f. arges feuilles. — de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 5 c. à 1 f. 50 c. ne §. S. ch. 2 à 4 f. warty. — Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. Plante serin. — de 2 à 5 f.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.cea. S. mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimun, L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia aluifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f. g. or. de 3 à 4 f.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.cea. S. mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimun, L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia aluifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f. g. or. de 3 à 4 f.
elongata. Illerit. TY Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volubilis. kam. — Pittonne grimpan Tradescantha discolor: Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinite. — Canari. Prov. §. S. ch. Varronia alnifolta. Cav. — Cordia parviflora. Orte Jerbesina gigantea. Jacq. — V. fruticosa. Hortul. — tesque. or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. — de 5 à 10 f. mges feuilles. — de 6 à 12 f. e 50 c. à 1 f. 50 c. ne §. S. ch. 2 à 4 f. wart. — Epho- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. Plante serin. — de 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f: Verbesine gigan- de 1 à 2 f.
elongata. Illerit. TY Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † Y è Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescanta discolor. Smith. = T. spatacea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropœolum majus b. Flore pleno. = Capucine à Y or. Peregrimm. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. S. S. ch. Varronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ross. L. = Pervenche de Madagascar, or.	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. te 50 c. à 1 f. 50 c. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. Verbesine gigan- de 1 à 5 f. † \$0 c. à 2 f. \$0 † \$0 c. à 2 f.
elongata. Illerit. TY Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † Y è Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescanta discolor. Smith. = T. spatacea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropœolum majus b. Flore pleno. = Capucine à Y or. Peregrimm. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. S. S. ch. Varronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ross. L. = Pervenche de Madagascar, or.	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. te 50 c. à 1 f. 50 c. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. Verbesine gigan- de 1 à 5 f. † \$0 c. à 2 f. \$0 † \$0 c. à 2 f.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † è Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.coa. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. s. ch. Jarronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orte Jerbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Jinca ross. L. = Perenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche d fleurs blanches. Jiola verticillata. Orteg. = Ionidium polygalef	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. te 50 c. à 1 f. 50 c. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. Verbesine gigan- de 1 à 5 f. † 50 c. à 2 f. 50 c. † 50 c. à 2 f.
elongata. Illetit. TY Thea bohea. L. — T. stricts. Ait. — Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volubilis. kam. — Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinite. — Canari. Prov. S. s. ch. Tarronia alnifolta. Cav. — Cordia parviflora. Orre Verbesina gigantea. Jacq. — V. fruticosa. Hortul. — tesque. or. Jinca ross. L. — Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Viola verticillata. Orreg. — Ionidium polygalor Violette verticillée. † or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. e 50 c. à 1 f. 50 c. te §. S. ch. 2 à 4 f. warty. Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. plante serin. de 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f: Verbesine gigan- de 1 à 2 f. † 50 c. à 2 f. 50 c. or. 50 c. à 2 f. olium. Venn. de 75 c. à 2 f.
elongata. Illetit. TY Thea bohea. L. — T. stricts. Ait. — Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volubilis. kam. — Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinite. — Canari. Prov. S. s. ch. Tarronia alnifolta. Cav. — Cordia parviflora. Orre Verbesina gigantea. Jacq. — V. fruticosa. Hortul. — tesque. or. Jinca ross. L. — Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Viola verticillata. Orreg. — Ionidium polygalor Violette verticillée. † or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. e 50 c. à 1 f. 50 c. te §. S. ch. 2 à 4 f. warty. Ephe- de 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. plante serin. de 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f: Verbesine gigan- de 1 à 2 f. † 50 c. à 2 f. 50 c. or. 50 c. à 2 f. olium. Venn. de 75 c. à 2 f.
elongata. Illerit. TY Thea bohea. L. — T. stricts. Ait. — Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le Thé vert. † Y Thymus fiiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y é Tournefortia volubilis. Lam. — Pittonne grimpai Tradescanta discolor: Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinide. — Canari. Prov. S. s. ch. Farronia alnifolta. Cav. — Cordia parviflora. Orre Ferbesina gigantea. Jacq. — V. fruticosa. Hortul. — tesque. or. Jinca rossi. L. — Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche d fleurs blanches. † Violette verticillée. † or. Visnea mocanera. L. — Mocanera visnea. Juss. †	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. ne 5. s. ch. 2 à 4 f. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. g. or. de 3 à 4 f. Verbesine gigande 1 à 2 f. † 50 c. à 2 f. or. 50 c. à 2 f. olium. Vent. de 75 c. à 2 f. s. ch. de 7 a 6 f. s. ch. de 2 à 6 f.
elongata. Illein. TY Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † Y or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à fei Thé vert. † Y Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † Y d Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantia discolor. Smith. = T. spatucea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à Y or. Peregrimum, L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. S. s. ch. Varronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ros.i. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche à fleurs blanches. † Violette verticillèe. † or. Visnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Volkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jus.	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. ure §. s. ch. 2 à 4 f. fleurs doubles. §. de 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. g. or. de 3 à 4 f. yerbesine gigande 1 à 2 f. to 50 c. à 2 f. or. 50 c. à 2 f. olium. Vent. de 75 c. à 2 f. s. ch. de 3 à 6 f. q. † s. ch. 3 à 4 f.
elongata. Illerit. TY Thea bohea. L. — T. stricta. Ait. — Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. — T. laxa. Ait. — Thé à le Thé vert. † Y Thymus filiformis. Ait. — Thym filiforme. † Y è Tournefortia volubilis. Lam. — Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. — T. spaticea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. — Capucine à Y or. — Peregrimum. L. — Capucine lacinite. — Canari. Prov. S. S. ch. Farronia alnifolia. Cav. — Cordia pavvisiora. Orte Terbesina gigantea. Jacq. — V. fruticosa. Hortul. — tesque. or. //inca ross. L. — Peri enche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche di fleurs blanches. — //iola verticillata. Orteg. — Ionidium polygalæf Violette verticillée. † or. //isnea mocanera. L. — Mocanera visnea. Juss. † //olkameria angustifolia. Jour. — V. ligustrina? Jau Fragrans. Vent. — V. imponica. Jaca. —	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. ne 50 c. à 1 f. 50 c. ne 50 c. à 2 f. plante serin. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. g. or. de 3 à 4 f. yerbesine gigande 1 à 2 f. 50 c. à 2 f. 50 c. or. 50 c. à 2 f. or. 50 c. à 2 f. s. ch. de 3 à 6 f. q. † s. ch. 3 à 4 f. q. † s. ch. 3 à 4 f. q. † s. ch. 3 à 4 f.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † è Tournefortia volubilis. kam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor: Smith. = T. spaticea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. s. ch. Tarronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orte Jerbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. b. Alba. Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Jiola verticillata. Orteg. = Ionidium polygalæf Violette verticillée. † or. Jisnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Jolkameria angustifolia. Lour. = V. lignestrina? Jus. Fragrans. Vent. = V. japonica. Jacq. = fragrans. Hortul. † v or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 5 s. ch. 2 à 4 f. le 50 c. à 2 f. le 2 à 5 f. g. or. de 3 à 4 f. le 7 s. ch. 2 à 2 f. le 7 s. ch. 2 à 2 f. le 7 s. ch. 3 à 4 f. le Clerodendrum de 1 à 2 f. le Clerodendrum de 1 à 6 f. le Clerodendrum de 1 à 6 f.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittenne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.cea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ros. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche d fleurs blanches. † Violette verticillete. † or. Violette verticillete. † or. Violameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jac. — Fragrans. Vent. = V. japonica. Jacq. = fragrans. Hortul. † Y or. — Inermis. L. = Voltameria saus éguillons. † \$	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 1 à 2 f. g. or. de 3 à 4 f. Verbesine gigande 1 à 2 f. foo c. à 3 à f. foo c. à 2 f. foo c. à
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à fei Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantia discolor. Smith. = T. spatacea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ros. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche à fleurs blanches. † Violette verticillée. † or. Visnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Volkameria angustifolia. Lour. = V. lignstrina? Jus. — Fragrans. Hortul. † Y or. — Inermis. L. = Volkameria sans éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunita fra	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. uilles étroites. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. ne 5. s. ch. 2 à 4 f. fleurs doubles. 5. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. 5. de 2 à 4 f. fleurs doubles. 5. de 2 à 4 f. g. or. de 3 à 4 f. to 75 c. à 2 f. soch de 3 à 6 f. q. † s. ch. 3 à 4 f. clerodendrum de 1 à 6 f. ach. de 3 à 4 f. uticosa. Willd. †
elongata. Illerii. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † è Tournefortia volubilis. kam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.cea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia alnifolia. Cav. = Cordia pavvisiora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. /inca ross. L. = Perenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche d fleurs blanches. /iola verticillata. Orteg. = Ionidium polygalor Violette verticillée. † or. /ionea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † /olkameria angustifolia. Jour. = V. lignstrina? Jac Fragrans. Vent. = V. japonica. Jacq. = fragrans. Hortul. † Y or. Intermis. L. = Volkameria sans éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra Y or.	Podocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . s. ch. 2 à 4 f. tre § . c. à 2 f. oinum. Vent. de 75 c. à 2 f. oinum. Vent. de 75 c. à 2 f. cq. † s. ch. 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 6 f. cq. † s. ch. 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f. tre § . ch. de 3 à 4 f.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † å Tournefortia volubilis. kam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spaticea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. s. ch. Tarronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orre Terbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. b. Alba. Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Tolkameria angustifolia. Lov. = Ionidium polygalor Violette verticillée. † or. Tolkameria angustifolia. — V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † v or. Inermis. L. = Volkameria saus éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra v or. [Volophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. ne §. s. ch. 2 à 4 f. Met 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. feurs doubles. g. or. de 3 à 4 f: Verbesine gigande 1 à 2 f. † 50 c. à 2 f. or. 50 c. à 2 f. olium. Vent. de 7 s. c. à 2 f. s. ch. de 3 à 4 f. clerodendrum de 1 à 6 f. ch. de 3 à 4 f. aticosa. Willd. † de 1 à 3 f. llanthus. L.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † å Tournefortia volubilis. kam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spaticea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. s. ch. Tarronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orre Terbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. b. Alba. Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Tolkameria angustifolia. Lov. = Ionidium polygalor Violette verticillée. † or. Tolkameria angustifolia. — V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † v or. Inermis. L. = Volkameria saus éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra v or. [Volophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. ne §. s. ch. 2 à 4 f. Met 50 c. à 2 f. Plante serin. de 2 à 4 f. feurs doubles. g. or. de 3 à 4 f: Verbesine gigande 1 à 2 f. † 50 c. à 2 f. or. 50 c. à 2 f. olium. Vent. de 7 s. c. à 2 f. s. ch. de 3 à 4 f. clerodendrum de 1 à 6 f. ch. de 3 à 4 f. aticosa. Willd. † de 1 à 3 f. llanthus. L.
elongata. Illein. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à fei Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescautha discolor. Smith. = T. spat.coa. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropocolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. S. s. ch. Farronia anifolha. Cav. = Cordia parviflora. Orre Ferbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Finca ros.i. L. == Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Folkameria angustifolia. Lour. == V. ligustrina? Jacq. — Fragrans. Vent. = V. juponica. Jacq. = fragrans. Hortul. † † or. Inermis. L. = Volkameria saus éguillons. † s Vesteringia rosmarinacca. Andew. = Cunila fra fro. (Islophylla falcata. Ait. == Phyllanthus epiphy Xylophylle à feuilles étroites. † s. ch. — Latifolia. L. = Xylophylle à feuil. larg. =	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 1 f. 50 c. le 50 c. à 2 f. le 60 c. à 2 f. le 60 c. à 2 f. le 70 c. à 2 f. le 70 c. à 2 f. le 70 c. à 2 f. le 75 c. à
elongata. Illein. TY Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † Y or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † Y Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † Y d Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spat.cea. S mère à deux couleurs. † S. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à Y or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. §. S. ch. Varronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ross. L. = Per enche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche d fleurs blanches. V Visnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Volkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jacq. — Inermis. L. = Volkameria sans éguillons. † S Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fri Y or. [ylophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy Xylophylle d feuilles étroites. † S. ch. — Latifolia. L. = Xylophylle d feuil. larg. = [eranthemum bracreatum. Vent. = Helichrysum cl.	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. ne 5 s. ch. 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 75 c. à 2 f. cor. 50 c. cor. 50 c. à 2 f. cor. 50 c. cor.
elongata. Illerit. † † Thea bohea. L. = T. stricta. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † å Tournefortia volubilis. kam. = Pittonne grimpai Tradescantha discolor. Smith. = T. spaticea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropecolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Tarronia alnifolia. Cav. = Cordia parviflora. Orre Terbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Jinca rosa. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Tola verticillata. Orteg. = Ionidium polygalor Violette verticillée. † or. Tisnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Tolkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jue. Fragrans. Hortul. † v or. Inermis. L. = Volkameria sans éguillons. † s Vestringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra v or. [ylophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy Xylophylle à feuilles étroites. † s. ch. Latifolia. L. = Xylophylle à feuil. larg. = c leranthemum bracteatum. Vill. * or. — H. bracteatum. Vill. * or.	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. nte 5. c. ch. 2 à 4 f. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 7 à 2 f. fleurs doubles. de 7 c. à 2 f. fleurs doubles. de 7 c. à 2 f. for. or. 50 c. à 2 f. olium. Vent. de 7 f. c. à 2 f. s. ch. de 3 à 4 f. ct. de 3 à 4 f. de 1 à 3 f. llanthus. L. de 6 à 10 f. Laurier maritime. irryanthum. Pers. de 1 à 2 f.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittenne grimpai Tradescantà discolor. Smith. = T. spat.cea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropoeolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ros. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche à fleurs blanches. † Violette verticillee. † or. Violette verticillee. † or. Inermis. L. = Mocamera visnea. Juss. † Volkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † † or. Inermis. L. = Volkameria sans éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra † or. [vlophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy Xylophylle à feuilles étroites. † s. ch. Latifolia. L. = Xylophylle à feuil. larg. = ceranthemum bracteatum. Vent. = Helichrysum cl = H. bracteatum. Vent. = Helichrysum cl	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. urges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. ne §. s. ch. 2 à 4 f. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 2 à 4 f. fleurs doubles. de 1 à 3 f. yerbesine gigan- de 1 à 3 f. fleurs de 3 à 4 f. Verbesine gigan- de 1 à 3 f. ch. de 3 à 4 f. c. ch. de 3 à 4 f. de 6 à 10 f. Laurier maritime. urysanthum. Pers. de 1 à 3 f. Laurier maritime. urysanthum. Pers. de 1 à 3 f Gnaphallum
elongata. Illein. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thé à fei T. bout. † † or. — Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thé à le Thé vert. † † Thymus fliformis. Ait. = Thym fliforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittonne grimpai Tradescautha discolor. Smith. = T. spat.coa. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropoeolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. — Peregrimum. L. = Capucine lacinite. = Canari. Prov. S. s. ch. Tarronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orre Terbesina gigantea. Jacq. = V. fruticosa. Hortul. = tesque. or. Tinca ross. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche de fleurs blanches. † Tolkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † vor. Isnea mocanera. L. = Mocanera visnea. Juss. † Tolkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † vor. Inermis. L. = Volkameria saus tguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra vor. [Viophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy Xylophylle à feuilles étroites. † s. ch. — Latifolia. L. = Xylophylle à feuil. larg. = le eranthemum bracteatum. Vent. = Helichrysum cl = H. bracteatum. Will. † vor. — Fulgidum. L. = Helichrysum fulgidum. Willd aureum? or.	de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. uilles étroites. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. le 50 c. à 1 f. 50 c. ne 5. s. ch. 2 à 4 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 50 c. à 2 f. fleurs doubles. de 7 c. à 2 f. so or. de 3 à 4 f. to or. 50 c. à 2 f. so ch. de 3 à 4 f. climm. Vent. de 75 c. à 2 f. so ch. de 3 à 4 f. climm. Vent. de 75 c. à 2 f. so ch. de 3 à 4 f. climm. Vent. de 75 c. à 2 f. so ch. de 3 à 6 f. de 1 à 3 f. llanthus. L. de 6 à 10 f. Laurier maritime. rysanthum. Pers. de 1 à 3 f. Gnaphalhum de 1 à 3 f.
elongata. Illetit. † † Thea bohea. L. = T. stricts. Ait. = Thá à fei T. bout. † † or. Viridis. L. = T. laxa. Ait. = Thá à fei Thé vert. † † Thymus filiformis. Ait. = Thym filiforme. † † à Tournefortia volubilis. Lam. = Pittenne grimpai Tradescantà discolor. Smith. = T. spat.cea. S mère à deux couleurs. † s. ch. Tropoeolum majus b. Flore pleno. = Capucine à † or. Peregrimum. L. = Capucine lacinide. = Canari. Prov. §. s. ch. Varronia alnifolta. Cav. = Cordia parviflora. Orte Verbesina gigantea. Jacq. = V. frutieosa. Hortul. = tesque. or. Vinca ros. L. = Pervenche de Madagascar. or. b. Alba. Pervenche à fleurs blanches. † Violette verticillee. † or. Violette verticillee. † or. Inermis. L. = Mocamera visnea. Juss. † Volkameria angustifolia. Lour. = V. ligustrina? Jacq. = fragrans. Hortul. † † or. Inermis. L. = Volkameria sans éguillons. † s Vesteringia rosmarinacea. Andew. = Cunila fra † or. [vlophylla falcata. Ait. = Phyllanthus epiphy Xylophylle à feuilles étroites. † s. ch. Latifolia. L. = Xylophylle à feuil. larg. = ceranthemum bracteatum. Vent. = Helichrysum cl = H. bracteatum. Vent. = Helichrysum cl	Hodocarpus de 3 à 6 f. uilles étroites. de 5 à 10 f. mges feuilles. de 6 à 12 f. de 6 à 12 f. de 50 c. à 1 f. 50 c. twarsq. Ephe- de 2 à 4 f. feurs doubles. S. Plante serin. de 1 à 2 f. g. or. de 3 à 4 f. Verbesine gigan- de 1 à 2 f. 5 oc. à 2 f. 6 olium. Vent. de 75 c. à 2 f. 5 oc. de 3 à 4 f. aticosa. Willd. † de 1 à 3 f. de 6 à 10 f. Laurier maritime. hrysanthum. Pers. de 1 à 3 f. Gnaphallum de 1 à 3 f. Gnaphallum de 1 à 3 f. Werbensu

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE POUR L'ORNEMENT DES JARDINS.

ACACIA brachyloba. Willd. = Mimosa illinoensis. Mich. = M.
Glomerata. Hortul. de 50 c. à 1 f. 50 c.
Glomerata. Hortul. de 50 c. à 1 f. 50 c. Acanthus mollis. L. = Acanthe Branc-ursine. de 25 c. à 50 c.
Spinosus. L. = Acanthe épineuse. de 50 à 75 c.
Spinosus. L. = Acanthe épineuse. de 50 à 75 c.
Achillea ageratum. L. = Achillee visquense. = Eupatoire de
Mesue. de 25 à 50 c.
- Millefolium. L. = Achillee mille - feuille. = Herbe aux
Charpentiers. de 15 à 25 c.
b. Roseum. = Achillée à fleurs pourpres. de 25 à 40 c.
- Tomentosa. L. = Achillée cotonneuse. de 15 à 25 c.
Aconitum album. Willd. = Aconit blanc. de 1 \(2 \) f.
- Anthora. L. = Aconit Salutifère. 50 c. à 1 f.
- Cammarum. L. = Aconit à grandes fleurs. de 1 à 2 f.
— 1 yeoctonum. L. = Aconit sue-loup. de 75 c, à 1 f. 50 c.
- Napellus. L. = Aconit napel. de 50 c. à 1 f.
- Tauricum. Willd. = Aconit taurique. de 1 à 2 f.
Acorus calamus. L. = Acore odorant. = Jone odorant. 75 c, à 1 f.
- Gramineus. Ait. = Acore graminė, * de 1 à 2 f.
Actora spicata. L = Actée à épi = Chrystophorique, so c. à I f.
Actora spicata. L. = Actée à épi. = Chrystophoriane. 50 c. à 1 f. Adiantum capillus veneris. L. = A. coriandrifolium. Lam. =
Capillaire de Montpellier. * de 40 c. 1 f.
Adonis vernalis. L. = Adonis printanier. de 1 2 f.
Agrostemma coronaria. L. = Coquelourde des jardins 40 c.
b. Flore pleno. = Coquel. à fleurs doubles. 50 c, à 1 f.
Alcea rosea. L. = Althon rosea. Cav. = Alcee rose. = Passe-
rose. = Rose trémière. 25 c.
a. Flore pleno. = Rose tremière à fleurs doubles variées
en couleurs. de 40 à 75 c.
b. Sulphurea. = Passe-rose jaune. de 1 d 2 f.
c. Ficifolia. L. == Alcee à feuill. de figuier. 50 c. à 2 f.
Aichemilla alpina. L. = A. argentea. Lam. = Alchemille des
Alpes
Aletris uvaria, L. = Trigoma uvaria, Gawler. = Veltheimia.
Willd. = Aletris à longues feuilles. * de 1 à 3 f. Althra cannabina. L. = Guimauve à feuill. de chanvre 40 à 75 c.
Althra cannabina, L. = Guimauve à seuill, de chanvre 40 à 75 c.
- Narbonensis. Poirr. = Guimauve de Narbonne. de 50 c. à 1 f.
Alyssum meritimum. Lam. = A. halimifolium. Ait. = Clypeola
maritima. L. = Alysse maritime. de 15 à 50 c.
- Utriculatum. L. = Vesicaria. Lam. = Alysse à fruit reuflé
de 75 c. à 1 f. 50 c.
Amorpha pubescens. Willd. = A. herbacea. Walt. = A. pumila.
Mich. = A. tomentosa. Dum. Cours. = Amorpha tomenteux.
de 2 à 3 f.
Anemone nepatica, L. Hepatica trilona, Chaix,
b. Cœrula plena. — Hépatique à fleur bleue doub. 1 à 3 f. c. Rosea plena. — Hépatique à fleurs rouge doub. 1 à 2 f.
Victimian T Anamana de Vicarinia
- Virginiana. L. = Anemone de Virginie. de 50 à 75 c.
Anthemis grandiflora. Ramat. = A. artemisicefolia. Willd. = A.
stipulacea. Moench. = Chrysanthemum indicum. L, =
Matricaria sinensis. Rumph. = Chrysanthême des Indes.
= Multipliante. = Renonculier. vulg.
a. Atropurpurea. DC. = Chrysanthemum purpureum Pers.
de 30 à 50 c.
(Crocea. (Saffrané. 75 c. à 1 f.
b. Vurians. DC. Flava. Var. Jaunatre. de 1 à 2 f.
y nosea macina. (nose. de l a z r.)
- Nobilis. L. = Camomille Romaine à fleurs doubles
Antirhinum bellidifolium. L. = Anarhinum bellidifolium. Desf.
— Linaire d feuilles de paquerette. de 50 c. à 1 f. Cymbolaria. L. — Linaira cymbalaria, Mill. — Linaire
lierrée. de re à 40 c.
Liparis. L = Linaria vulgaris. Desf. = Linaire commune.
de 25 i 50-c.

Antirniaum Majus. L. = Orontium majus. Pers. = Mufie d	e veau.
= Gueule de Lion. de 40	a 60 c.
b. Flore albo. = Muste de veau à steurs blanche. 50	C. a I I
— Monspessulanum. L. — Linaria galioides. Lam. 40.— Latifolium. Mill. — Mufle de veau de Vaucluse. de 1	a 75 C.
Latifolium. Mul. = Muste de veau de Vaucluse. de 1	2 2 1.
Aphyllanthes monspeliensis. L. = Bragalou de Montpelli	er. ==
Jone fleuri. * de 50 c.	a i t.
Apocynum androsœmifolium. L. = A. canadense. Boer. =	Apocin
gobe-mouche. de 1	à 3 f.
- Cannabinum. Ait. = Apocin d fleurs herbacees. de 1	
	2 2 f.
Aquilegia canadensis. L. = Ancolie du Canada. 50 c. 1 f.	. 50 c.
	à 2 f.
- Vulgaris. L. = Ancolie commune.	
b. Grandiflora. = A. d grandes fleurs. d fleurs doubl	es ou
c. I lore multiplici. $= A$. d fl. doub. $Var.(simples de ce$	puleurs
d. Ecalcarata. Vahl. = Aqui-) varides. 25 c. 11	. 25 C.
legia stellata. L.	
Aristolochia longa. L. = Aristoloche à longues racines. de 1	à 2 f.
— Pistolochia. L. — Aristoloche crénelée. de 50 à	75 C.
Rotunda. L. == Aristoloche roude. de 50 à	75 C
Arnopogon dalechampii. Willd. — Tragopogon. L. —	Uros-
permum. DC. = Barbouquine à grandes fleurs. * 50 c	. à 1 f.
permum. D.C. = Barbouquine à grandes fleurs. * 50 c Arundo colorata. Ais. = Phalaris arundinacea. L. = Roseau e	coloré.
= nuoan aes jarains. de 40 a	50 C.
— Tenax. Vahl. = A. mauritanica. Poir. * de 50	c. 1 f.
Asarum europœum. L. = Cabares. = Asaret d'Europe. 75 c. 1 f	. 50 0.
Asclepias amoena. L. = Asclépiade élégante. = A. rose. 1	
- Incarnata. Mich. = Asclépiade carnée. de 1	à 2 f.
- Nigra. L. = Vincetoxicum nigrum. Pers. = Cynanchum ni	
Brown = Asclépiade noire de so c.	arf.
Brown. = Asclépiade noire. Nivœa. L. = Asclépiade à feuilles d'amandier. Dum.	Cours.
= 1. blanche. H. P. de 1	1 2 f.
- Syriaca. L. = Asclépiade de Syrie. = Herbe à la O	uatte.
de 75 c, à 1 f.	(O C.
- Vincetoxicum. L. = Vincetoxicum vulgare. Pers. = C	vnan-
chum vixetoxicum. Brown. = A. dompte venin. 40 a	75 C.
Asplenium adianthum nigrum. L. de 40 à	60 6
- Scolopendrium. L. = Scolopendrium officinale, DC. =	= De-
radille scolopendre. de 30 à	
Agter acris. L. = Aster âcre.	50 C.
- Amygdalinus. Mich. = A. umbellatus. Ait. = Aster d for	
d'amandier.	50 G
- Cordifolius. L. = Aster à feuilles en cœur.	soc.
- Dracunculoides. Lam. = Aster & feuilles d'estragon.	50 C.
- Corymbosus. Ait. = Aster à corymbes.	50 c.
- Ericoides. L. = Aster à feuilles de bruvère.	
Grandiflorus. Willd. = Aster à grandes fleurs.	50 6
— Miser. Lam. = Aster à petites seuilles. = A. lupulin	75 C.
A gestle	
A. grêle. Novæ-angliæ. L. = Aster de la nouvelle Angleterre.	58 c.
Novi belvii die - A neviouletus I am Asser de la	50 C
- Novi-belgii. Ait. = A. paniculatus. Lam. = Aster de la	
velle Belgique.	50 6.
— Spectabilis. Ait. — Aster remarquable.	75 C.
Tripolium. L. = Aster de tripoli.	40 C.
- Vimineus. Lam. = Aster flexible.	75 S.
Astragalus alopecuroïdes. L. = Astragale queue de Renard. 50	4 75 C.
— Monspessulanus. L. = Astragale de Montpellier. 4 40 à Atropa belladona. L. = Belledone commune. de 50 c.	(O) C.
Atropa Delladona. L. = Belledone commune. de 50 c.	art.
— Mandragora, L. = Mandragora acaulis, Gart. = Mandra Bellis perennis, L. = Paquerete vivace, = Petite margi	agore.
Bellis perennis. L. Paquerete vivace. Petite margi	ucrite.
Margueritette. 2	

Bellis. b. Flore roseo plemo. c. Flore albo pleno. d. Flore purpureo pleno. var. e. Flore prolifero. f. Flore variegato. Bidens sambucifolia. Cav. — Coreopsis sambucifolia. Dum. Cours
de 40 à 50 d d. Flore purpureo pleno. Var. de 30 à 50 d d fleur pourpre double de 30 à 50 d d fleurs polifères. \frac{1}{2} d e 1 d à 1 f. 50 d d fleurs roses es blanches. 1 de 40 à 50 c
f. Flore variegato. de 40 à 50 c
f. Flore variegato. de 40 à 50 c
de 40 a 50 c
Boltonia asteroïdes. Mich. Matricaria asteroïdes. Dum. Cours
Borrago orientalis. L. Bourache d'orient 60 c.
Borrago orientalis. L. == Bourache d'orient 60 c. Buphthalmum grandiflorum. L. 50 c.
Butomus umbellatus. L. = Butome ombellisere. 75 c.
Cacalia suaveolens. L. = Cacalie à feuilles sugitées. Caltha palustris. L. = Populage. = Souci des marais.
b. Flore pleno. = Populage à fleurs doub. 1 it f. 50 c.
Campanula glomerata, L. (Flore pleno,) 50 c.
— Medium. L. = Campanule d grosses fleurs. 50 c. b. Flore albo. = Camp. d fleurs blanches. 75 c.
- Persiccefolia. L. = C. decurrens? L. = Campanule d feuilles
de pêcher. = Bâton de jacob, vulg. 1
b. Flore pleno pallide-cœruleo. \$ 50 c.
c. Plore pleno albo. \$\frac{1}{2}\$ 50 c. — Pyramidalis. L. = Campanule pyramidale. = Violette pyramidale. de 50 c. \hat{1} f.
Răpunculoides. L. 50 c. Cassia marylandica. L. Casse du maryland. 50 c. 50 c.
Carlina corymbosa. L. = Carline d corymbes. 25 c.
Catananche cerulea. L. = Cupidone bléue Centaurea atropurpurea. Willd. = Cyanus atropurpureus. Pers.
= Centaurée d fleurs pourpres. 75 c.
- Collina. L. = Centaurée des collines. 50 c.
— Conifera. L. = Jacea conifera Pers: = Leuzea conifera.
<i>DC.</i> ★ 75 c. Sonchifolia. <i>L</i> . 50 c.
Centranthus latifolius. Duf. = C. ruber. D.C. = Valeriana rubra.
L. = Valeriane des parterres. 40 c.
a. Ruber. b. Albus. Var. d fleurs rouges. d fleurs blanches. Angustifolius. DC. = Valeriane d feuilles étroites.
- Angustifolius. DC. = Valeriane d feuilles étroites. 40 c.
Cerastium tomentosum. L. = Ceraiste cotonneux = Oreille de souris. 1 15 c.
Cerinthe minor. L. = Melinet d feuilles pointues.
Chefranthus incapus. L. = Hesperis violaria. Lam. = Giroflice.
b. Flore rubro pleno. (A fleurs doubles rouges.
c. Flore roseo pleno. Var) d fleurs doubles roses.
b. Flore rubro pleno. c. Flore roseo pleno. d. Flore albo pleno. e. Flore violaceo pleno. Espectralis. b. Flore rubro pleno. d. fleurs doubles roses. d. fleurs blanches doubles. d. fleurs doubles violettes.
— Fenestralis. L. — Giroflée des fenêtres. So c. — Tristie. L. — Hesperie appretion. Lom
Chelone barbata. Cav. = C. ruelliondes. Andrews. = C. formosa. Wend. = Galane barbue. *
- Campanulata. Cav. = C. foliosa. Dum. Cours. = Penstemon.
companulatum. Willd. = Galane campanules. * 1 f. 25 c.
Chrysanthemum serotimm. L. 75 c Macrophyllum. Pers. 1 f.
Corymbosum. L. 25 c.
— Parthenium. D.C. = Matricaria parthenium. L. = Pyretrum
parthenium. Willd. 30 c. Chrysocoma linosiris. L. 50 c.
- Graminifolia, L. I f.
Cineraria maritima. L. = Jacobœa maritima. Gært. == Cineraire
maritime. * 75 c. Circea lutetiana. L. == Circee pubescenee. 50 c.
Clematis integrifolia. L. = C. nutans. Crantz. = C. inclinata.
Scop. = Clematite à feuilles entières. = C. à feuilles
simples. Recta. L. = Clematite deoite. 1 £ 50 c. 40 c.
b. Nana. 75 c.
Comarum palustre, L. = Potentilla comarum, Neslt. 50 c. Convolvulus cantabrica, L. = Liseren linéaire. 25 c.

Convolvulus lineatus. L. — Reniformis. L. = Liseron réniforme. * — Seplum. L. = Liseron des haies. §.	
— Reniformis, L. = Liseron reniforme.	25
Sanium I ticaran dan haise 6	50 0
- Seplani. L Liseron des naies. y.	150
Coreopsis alternifolia. Willd.	50 à 75 c
- Lanceolata. L. == Corione lanceolee.	50 C
Ttripteris, L. == Coriope triptere.	50 C
- Verticillata. L. = C. delphinifolin. Lam. =	Coriope
verticillée.	50 C
Coris monspeliensis. L. = Coris de Montpellier.	40 C.
Cormis canadensis. L. = Cornouiller du Canada.	2 f.
— Succica. L. = Cornouller de Suede.	2 f.
Coronilla varia. L. = Coronille varite.	, 50 ¢.
Cynanchum acutum. L. = Scamonée à feuilles pointues. 1	i I t. 50 c.
Cynoglossum apenninum. L. = Cynoglosse de l'apenni	n∙ ,75 c.
— Cheirifolium. L. = (ynoglosse argentée. de s — Pictum. Ait. = C. creticum, Vill. = Cynoglosse peir	0 a 75 c.
Cyperus papyrus. L. Souchet d papier. S. d'Egypte.	ite. 50 C.
Dactylis eynosuroides. L. = Limnetis cynosuroides. F	~ Z a 3 I.
Spartina cynosuroides. Roth.	6/1. ==
Spartina cynosuroides. Roth. Datisca cannabina. L. = Datisque à feuilles de chanvre.	30 6.
Delphinium elatum. Ait. = Dauphmelle élevée. = Pied d	o I a Z I.
vivace. de so	c. à I f.
Grandiflorum. Pers. = Pied d'alouette à grandes fleur.	· • · · · · ·
Dianthus asper. Willd.	
- Atrorubens, Allioni	50 C.
- Barbatus. L. = OEillet barbu. = Bouques-parfait.	
de Poëte, == Jalousie.	OL.
a. Ruber. = Bouquet - parfait à fleur rouge. 1	25 C.
b. Albus. = Bouquet-parfait à fleur blanche.	25 C.
c. Variegarus. = Bouquet-purfait à fleurs panachées	\$ 50 C.
- Bicolor. Marsch.	r f.
- Cariophyllus. L. = OEillet des fleuristes. de 25	c. à 2 f.
(d fleurs doubles rouge	. iaune .
Var. tres nombreuses. fond blanc, bigarre,	erenadin
L Framana. erc.	•
— Carthusianorum, L. = OEillet des chartreux.	50 c.
- Chinensis. L. = OEillet de la Chine. = OE. de la Regenu	e. 24 c.
h Flore plans - Okilles de la Chine à Anne	, , ,
o. The pieno. — Casinei de la Chine a fieurs	doubles.
b. Flore pleno. = OEillet de la Chine d fleurs = Mississipienne. de 50	doubles. À 75 C.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines.	doubles. 2 2 75 C. 40 C.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEilles des collines. — 1 eltoides, L. — OE. deltoide. — OE. couché. \$	9 à 75 c. 40 c. 25 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couché. T — Hispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette	9 à 75 c. 40 c. 25 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltotde. — OE. couché. T. — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. †	40 c. 40 c. 25 c. d fleur
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltotde. — OE. couché. T. — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. †	40 c. 40 c. 25 c. d fleur
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OE illet des collines. — Leltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. I. — Lispanicus. Dum. Cours. — OE illet mignonette double. I. — Moschatus. Mayer. — OE illet mignardise. I. — Plumarius. L. — OE illet lacinie. — OE. d bordu	40 c. 40 c. 25 c. d fleur
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couché. ↑ — Hispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. ↑ — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. ↑ — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. ↑	40 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couché. ♣ — Hispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. ♠ — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. ♣ — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu. OEillet plume. ♣ b. Fimbriatus, Lam. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1	40 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couché. T. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE couché. T. — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignanette double. T. — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. T. — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. T. b. Fimbriatus, Lam. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné.	40 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. ures. === 15 c. 15 c. 25 c.
— Mississipienne. de 50 Collinus. Pers. = OEillet des collines. 1 eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. \$\frac{1}{2}\$ Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. \$\frac{1}{2}\$ Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. \$\frac{1}{2}\$ Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu OEillet plume. \$\frac{1}{2}\$ b. Fimbriatus, Lum. = OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronaius. = OEillet couronné. d. Albus.	2 à 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. ures. === 15 c. 16.25 c.
— Mississipienne. de 50 Collinus. Pers. = OEillet des collines. 1 eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. \$\frac{1}{2}\$ Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. \$\frac{1}{2}\$ Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. \$\frac{1}{2}\$ Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu OEillet plume. \$\frac{1}{2}\$ b. Fimbriatus, Lum. = OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronaius. = OEillet couronné. d. Albus.	2 75 c. 40 c. 15 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 50 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couchê. T. — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. ↑ — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. ↑ — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. ↑ b. Fimbriatus, Lam. — OEillet fimbrié. de 75 €. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe.	25 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 15 c. 25 c. 25 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couchê. T. — Hispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. ↑ — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. ↑ — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. ↑ b. Fimbriatus, Lim. — OEillet fimbrié. de 75 €. à 1 €. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur	2 2 7 5 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 15 c. 25 c. 25 c. 50 c. 75 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — I eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couchê. It lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. It — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. It — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet couronné. d. Albus. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet guilgrag des de labases de la couronné de la couronné. Dictame blanc. — Dictame blanc. — Dictame blanc. — OEillet guilgrag de de la couronné. — Dictame blanc. — Dictame	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — I eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couchê. It lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. It — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. It — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet couronné. d. Albus. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet guilgrag des de labases de la couronné de la couronné. Dictame blanc. — Dictame blanc. — Dictame blanc. — OEillet guilgrag de de la couronné. — Dictame blanc. — Dictame	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c.
— Mississipienne. de 50 — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — I eltoides. L. — OE. deltoïde. — OE. couchê. It lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. It — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. It — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet lacinie. — OE. à bordu OEillet plume. It — OEillet couronné. d. Albus. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet superbe. Dictame blanc. — OEillet guilgrag des de labases de la couronné de la couronné. Dictame blanc. — Dictame blanc. — Dictame blanc. — OEillet guilgrag de de la couronné. — Dictame blanc. — Dictame	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c.
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lum. — OEillet fimbrid. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blunc. — OEillet superbe. Dictame blunc. — Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digitalie 75 c. à 1 de 75 c. à 1	25 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. rres. = 15 c. 15 c. 25 c. 25 c. 50 c. 75 c. ope. = 1 d 2 f. 1 d 2 f. e jaune. f. 2e f. 2
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. 1 — b. Fimbriatus, Lum. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — de Digitalis lœvigata, Pers. — Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitale pourprée. — Gantelet de 75 c. à 1 de 75 c. à 1	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. res. = 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c. 1 à 2 f: e jaune. f. 25 c. 1 × 2 f: e. jaune. f. 25 c. 1 × 6 f. 25 c. 1 ×
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. 1 — b. Fimbriatus, Lum. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — de Digitalis lœvigata, Pers. — Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitale pourprée. — Gantelet de 75 c. à 1 de 75 c. à 1	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. res. = 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c. 1 à 2 f: e jaune. f. 25 c. 1 × 2 f: e. jaune. f. 25 c. 1 × 6 f. 25 c. 1 ×
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OF. deltoide. — OE. couché. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 b. Fimbriatus, Lum. — OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronaius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamenus albus. 1. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digitale de 75 c. à 1 de 75 c. à	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c 40 c
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumurius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lum. — OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Seperbius. I. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — DEillet superbe. Dictamnus albus. L. — DEillet superbe. Dictamnus albus. L. — Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital — Purpurea. L. — Digitale pourprée. — Gantelet de Dame. Dodartia orientalis. L. — Dodart du levant. de 50 Dodartia orientalis. L. — Dodart du levant. de 75 Doronicum pardalianches. L. — Doronic à feuilles en cour	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c. 75 c. 75 c. Notre-c. 4 1 f. c. 4 1 f. c. 4 1 f. c. 4 1 f. 50 c.
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 — b. Fimbriatus. Lam. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — de OEillet superbe. — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital de 75 c. à 1 de 75 c. à	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 75 c. 75 c. 75 c. 75 c. 75 c. 76 c. 4 1 f. 2 f. 6. 30 c. 4 1 f. 6. 50 c. 5
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. 1 — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. 1 b. Fimbriatus, Lam. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronaius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blanc. Dictame blanc. — Digitalis lœvigata. Pers. — Digitale d feuilles glabres. de 1 — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital de 75 c. à 1 — Purpurea. L. — Digitale pourprée. — Gantelet de 50 Doronicum pardalianches. L. — Doronic d feuilles en cœur — Plantagineum. L. — Doronic d feuilles de plantain. Dracocephalum virginicum. L. — Darocéphale de Virginie Dracocephalum virginicum. L. — Dracocéphale de Virginie	275 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — L'eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couché. 1 — L'ispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu. OEillet plume. 1 b. Fimbriatus, Lam. — OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictame blanc. Dictame blanc. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital de 75 c. à 1 — Purpurea. L. — Digitale pourprée. — Gantelet de 75 c. à 1 — Purpurea. L. — Digitale pourprée. — Gantelet de 50 Doronicum pardalianches. L. — Doronic à feuilles en cœur — Plantagineum. L. — Doronic à feuilles de Plantain. Dracocephalum virginicum. L. — Dracocéphale de Virginie Echinophora spinosa. L. — Echinophore épineuse. de 75	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 75 c. 1 à 2 f.
— Mississipienne. — Collinus. Pers. — OEillet des collines. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lum. — OEillet fimbrid. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — DEillet superbe. Dictamnus albus. L. — DEillet superbe. Dictamnus albus. L. — Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital de 75 c. à 1 — Purpurea. L. — Digitale pourprée. — Gantelet de Dame. Dodartia orientalis. L. — Dodart du levant. de 50 Dodartia orientalis. L. — Dodart du levant. de 50 Dracocephalum virginicum. L. — Dracocéphale de Virginie Echinophora spinosa. L. — Echinophore tpineuss. de 75 Echinops ritro. L. — Boulette azurée. de 56 Echinops ritro. L. — Boulette azurée. de 56	2 75 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c. 50 c. res. = 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. ope. = 1 2 2 f. 1 2 2 f. c. 3 1 f. c. 4 1 f
Mississipienne. Mississipienne. Obillet des collines. I eltoides, L. = OF. deltoide. = OE. couchd, \(\frac{1}{2} \) Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. \(\frac{1}{2} \) Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. \(\frac{1}{2} \) Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. \(\frac{1}{2} \) b. Fimbriatus, Lim. = OEillet fimbrit. de 75 c. \(\frac{1}{2} \) c. Coronaius. = OEillet couronné. d. Albus. Serotinus. Walld et Kit. Superbus. L. = OEillet superbe. Dictamnus albus. 1. = D. Fraxinella. = Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. 1. = D. Fraxinella. = Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. 1. = Digitale d feuilles glabres. de Lutea L. = Digitalis parviflora. Lam. = Digital Purpurea. L. = Digitale pourprée. = Gantelet de Dame. Dodartia orientalis. L. = Dodart du levant. de 75 Doronicum pardalianches. L. = Doronic à feuilles en cœur Plantagineum. L. = Doronic à feuilles de plantain. Oracocephalum virginicum. 1. = Uracocéphale de Virginic Echinophora spinosa. L. = Echinophore trineuse. de 75 Echinops ritro. L. = Boulette aqurée. de 50 Epilobium spicatuar. Lam. = E. angustifolium. L. = d évi. de 50	275 c. 40 c. 125 c. d fleur 40 c. 50 c. 155 c. 125 c. 25 c. 25 c. 25 c. 122 f. 12 f. e f. 25 c. 13 2 f. e f. 25 c. 15 2 f. 6 2 f.
Mississipienne. Mississipienne. Obillet des collines. I eltoides, L. = OF. deltoide. = OE. couchd, \(\frac{1}{2} \) Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. \(\frac{1}{2} \) Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. \(\frac{1}{2} \) Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. \(\frac{1}{2} \) b. Fimbriatus, Lim. = OEillet fimbrit. de 75 c. \(\frac{1}{2} \) c. Coronaius. = OEillet couronné. d. Albus. Serotinus. Walld et Kit. Superbus. L. = OEillet superbe. Dictamnus albus. 1. = D. Fraxinella. = Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. 1. = D. Fraxinella. = Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. 1. = Digitale d feuilles glabres. de Lutea L. = Digitalis parviflora. Lam. = Digital Purpurea. L. = Digitale pourprée. = Gantelet de Dame. Dodartia orientalis. L. = Dodart du levant. de 75 Doronicum pardalianches. L. = Doronic à feuilles en cœur Plantagineum. L. = Doronic à feuilles de plantain. Oracocephalum virginicum. 1. = Uracocéphale de Virginic Echinophora spinosa. L. = Echinophore trineuse. de 75 Echinops ritro. L. = Boulette aqurée. de 50 Epilobium spicatuar. Lam. = E. angustifolium. L. = d évi. de 50	275 c. 40 c. 125 c. d fleur 40 c. 50 c. 155 c. 125 c. 25 c. 25 c. 25 c. 122 f. 12 f. e f. 25 c. 13 2 f. e f. 25 c. 15 2 f. 6 2 f.
Mississipienne. — Mississipienne. — 1 eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. 1 — b. Fimbriatus. Lam. = OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronarius. = OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. = OEillet superbe. Dictame blanc.	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. res. = 15 c. 15 c. 25 c. 2
Mississipienne. — Mississipienne. — 1 eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. 1 — b. Fimbriatus. Lam. = OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronarius. = OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. = OEillet superbe. Dictame blanc.	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. res. = 15 c. 15 c. 25 c. 2
Mississipienne. — Mississipienne. — 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 — P. Fimbriatus, Lim. — OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronaius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamenus albus. 1. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictame blanc. — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digitalis lœvigata. Pers. — Digitale d feuilles glabres. de 75 c. à 1 de 76 de 76 c. de 77	2 75 c. 40 c. 25 c. 4 fleur 40 c. 50 c. 15 c. 25 c. 25 c. 25 c. 75 c. 6, 25 c. 1 à 2 f. 6, 25 c. 25 c. 25 c. 1 à 2 f. 6, 25 c.
Mississipienne. — Mississipienne. — 1 eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. 1 — Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. 1 — Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. 1 — Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lam. = OEillet fimbrid. de 75 c. à 1 c. Coronaius. = OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. = OEillet superbe. Dictame blanc. Dictame blanc. Dictame blanc. Digitalis lœvigata. Pers. = Digitale d feuilles glabres. de — Lutea L. = Digitalis parviflora. Lam. = Digital de 75 c. à 1 — Purpurea. L. = Digitale pourprée. = Gantelet de Dame. Dodartia orientalis. L. = Dodart du levant. de 50 Dodartia orientalis. L. = Dodart du levant. de 75 Chinophora spinosa. L. = Echinophore épineuse. de 75 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée. de 50 Echinops ritro. L. = Boulette azurée.	275 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c
Mississipienne. Collinus. Pers. — OEillet des collines. 1 eltoides. L. — OE. deltoide. — OE. couchd. 1 Lispanicus. Dum. Cours. — OEillet mignonette double. 1 Moschatus. Mayer. — OEillet mignardise. 1 Plumarius. L. — OEillet lacinie. — OE. d bordu OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lum. — OEillet fimbrit. de 75 c. à 1 c. Coronarius. — OEillet couronné. d. Albus. — Serotinus. Walld et Kit. — Superbus. L. — OEillet superbe. Dictamnus albus. L. — DEillet superbe. Dictamnus albus. L. — D. Fraxinella. — Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. L. — Digitals de feuilles glabres. de — Lutea L. — Digitalis parviflora. Lam. — Digital — Digitalis lœvigata. Pers. — Digitale pourprée. — Gantelet de 75 c. à 1 de 75	275 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c
Mississipienne. Mississipienne. OEillet des collines. I eltoides. L. = OE. deltoide. = OE. couchd. 1 Lispanicus. Dum. Cours. = OEillet mignonette double. 1 Moschatus. Mayer. = OEillet mignardise. 1 Plumarius. L. = OEillet lacinie. = OE. d bordu. OEillet plume. 1 b. Fimbriatus. Lam. = OEillet fimbrié. de 75 c. à 1 c. Coronarius. = OEillet couronné. d. Albus. Serotinus. Walld et Kit. Superbus. L. = OEillet superbe. Dictamnus albus. L. = D. Fraxinella. = Fraxinelle d'Eur Dictamnus albus. L. = D. Fraxinella. = Fraxinelle de 75 c. à 1 de 75 de 7	275 c. 40 c. 25 c. d fleur 40 c

de 50 c. d 1 f.

Empatorium altissimum. L. Eupatoire géante. de 75 c. à 1 f.	
Euphorbia paralias. L. = Euphorbe maritime. de 75 c. à 1 f.	
Fernia glauca. L. = Férule glauque. de 112 f.	
- Tingitani. L. = Férule de Tanger. de 1 à 2 f	Lychnis chalcadonica. L. == Lychnida de calced
Galeobdolon liteum. Auds. = Galeopsis galeobdolon. L. 25 c.	Jerusalem. == croix de Malie.
Genista ovata. Willd. = Genet d feuilles ovales. de 75 c. à 1 f.	b. Flore albo. d fleurs blanches
Centiani acadis. L. = Gentiane d grandes fleurs. 1 i 2 f	c. Flore roseo, Var.) à fleurs roses
Geranium macrorhizon. L. = Géranion à grosses racines. 50 c.	d. Flore pleno. / d neurs doubles
— Nodosum. L. = Géranion noueux. 75 c. Phoeum. L. = Géranion brun. = G. à fleurs noires. 75 c.	
Prateinse. L. = Géranion des près 50 c.	
- Sangnineum. L. = Géranion sanguin. 75 c	
Genin rivale. L. = G. nutans. Craniz. = Benoite aquatique. \$ 50 c.	= OEil de perdix.
Globularia vulgaris. L. = Bellis corulea. Tabern. = Globulaire	b. Flore pleno.
Commune. T	— Viscaria. L. = Lychnide visqueuse. =
Glychrhiza echinata. L. = Réglisse hérissée. * 75 c Glabra. L. = Liquiritia officinalis. Mænch. = Réglisse	jaranuers
commune. * 50 c.	1 5 2
Gnaphahalium margaritaceum. = Gnaphale des jardlus. = Im-	Lythrum salicaria. L. = Salicaire commune. =
mortelle blanche. de 75 c. à 1 f.	Melissa grandiflora. = Mélisse à grandes fleur
Gypsophila altissima. L. == Gypsophile élevée. 1 f.	Menyanthes nymphoides. L. == Villarsia nymi
- Saxifraga. L. = Dianthus saxifragus. L. = D. filiformis.	Waldschmidia. Hayn. = Lymnanthemun
Lam. 50 c.	† Nottant. *
Hedysarum canadense. L. = Sainfoln du Canada. 1 f. 50 c Coronarium. L. = Sainfoin d'Espagne. * de 25 à 50 c.	
- Viridiflorum. L = Sainfoin à fleurs vertes. * de r à 2 f.	Monarda coccinea. Mich. M. didyina. L. Monarda coarlate. The dosweg
Relenjum autumnale. = Helenie d'autonne. 50 c.	Fistulosa. L. Montrede fistuleuse.
Heffunthus atrorubens. H. P. = H. lætiflorus. Pers. = Helianthe	Napea lævis. Ait. = N. hermaphrodita. L. =
d feuilles rudes. de 50 c. à 1 f.	== Napée lisse.
- Linearis. Cav. = Helianthe d feuilles étroites. de 1 à 2 f.	J T THE THE PARTY OF THE PARTY
- Lœvis. L. = Heliopsis lœvis. Pers. = Buphlthalmum heli- antoides. de 75 à 1 f.	- 1.utea. L. = Nenuphar jaune. *
antoides. Macrophythus. Willd. = Helianthe à grand, feuill. 1 à 1 f. 50 c.	OEnothera rosen. L. = OE. rubra. Cav. = Ona
- Mollis. Willd. de 75 c. à 1 f.	Ononis rotundifolia. L. == Bugrane à feuilles ron Onosma echioides. L. == Anchusa lutea. Dale
- Multiflorus. L. = Helianthe multiflore. 25 c.	echioides. — Onosme vipérine. *
b. Flore pleno. = Hel. multif. d fl. doubles. 25 à 50 c.	Poconia albinora. Pall. = Pivoine blanche.
- Virgatus. Lam. = H. giganteus. = H. excelsus. Willd.	- Corallina, liety. P. mascula, L. Pivo
Melleborus sætidus. L. = Hellebore sétule. = pied de griffon. 50 c.	- Humilis. Retz. == P. villosa? == Pivoine vi
Lividus. Ait. = H. corsicus. Hortul. = Hellebore à feuilles	- Officinalis. Retz. = P. feemina. L. Pivoine
dentées. 2 f.	b. Rubra plena. Var. & d fleur double ponce
- Niger. L. = Hellebore à fleurs roses. = Rose de noël. 1 à 2 f.	- Lobata. Desf. = Pivoine lobée
- Viridis. L. = Hellebore a fleurs vertes. de 75 c. à 1 f. 50 c.	- Tenuitolia. L. = Pivoine à feuilles menu
Hesperis matronalis. L. = Julienne des jardins. † de 25 c. å 1 f.	Papaver orientale. L. = Pavot du levant. = P. de
b. Flore purpureo pleno. Var. d fleurs pourp. doub. 1 d 2 f. c. Flore albo pleno. Var. d fleurs blanches doub. 25 c. 1 f.	Pascalia glauca. Orteg.
Hibiscus militaris. Willd. de 1 à 2 f.	Passistora incarnata. L. == Grenadille couleur de ch
- Palustris. L. = Ketmie des marais de 50 c. à 1 f. 50 c.	— Lutea. L. — Grenadille jaune. S. * Peganum harmula. L. — Hermale à feuille découp.
- Moschentos. L. de 1 à 2 f.	Barrette accoupt
Speciosus. Air. = H. coccineus. Walth. * de 1 à 3 f.	Phlomis herba venti. L. = Phl. herbe du vent.
Nydrophyllun magellanicum. Lam. = Hydrophylle de magellan.	- Lychnitis. L. = Phlomide d mêche.
Hypericum hirsutum. L. = Millepertuis velu. de 50 c. à 1 f.	Tuberosa. L. = Phlomide inbereuse.
Inula helenium. L. = I. campana. Pharm. = Aunée officinale.	Phlox carolina. L. = Phlox de la Caroline. — Glaberrima. L. = Phlox glabre.
de 25 à 50 c.	- Ovata. Mill. = Phlox & feuilles ovales.
— Montana. L. A de 25 à 50 c.	— Paniculata, L. == Phlox paniculė.
- Squarrosa. L. = 1. spirceifolia. Lam. = Inule rude. 25 à 50 c.	- Pilosa. Mill. = P. aristata. id. = Phlor ve
Kittaibelia vitifolia. Willd. = Kitt. d feuilles de vigne 50 à 75 c. Lactuca perennis. L. = Laitue d fleurs bleues. * de 50 à 75 c.	- Suaveolens. Art. = P. candida. Pers. = Ph
	- Subulata. L. = Phlox subule.
- Garganicum, L. = Lamier d'Italie. de so à ze c	— Suffruticosa. Willd. Physalis alkekengi. L. — P. lalicacabum. See
Lathyrus latifolius. L. = Gesse d larges seuilles. de 40 à 75 c.	vesicarium. Bauh. = Alkekenge. = Coque
- Sylvestris. L. = Gesse des bois. de 40 à 75 c.	Plumbago europæa. L. = Dentelaire Europeenn
Leonurus crispus. L. = Agripaume d feuilles crépues. de 40 à 75 c.	Polemonium coeruleum. L. = Polemoine à fleurs
Linum campanulatum. Lam. = L. flavum. L. = Lin campanule. *	riane grecque.
— Maritimum. L. = L. maritime. de 25 à 50 c. — Narbonense. L. = Lin de Narbonne. = Lin d grandes	Delvoile milionie d fleurs blanches.
fleurs bleues. * de 50 à 75 c.	Polygula vulgaris. L. Polygonum historia I — Renoute historia
Lithospermum purpureo - cerulœum. L. de 50 à 75 c.	Polygonum bistorta. L. = Renouée bistorte. Polypodium filix femina. L. = Fougère femelle.
Lobelia cardinalis. L. = Lobelie cardinale. de 75 c. à 1 f.	- Filix max. L. = Fougere male.
- Fulgens. Willd. = L. éclatante. de 1 à 2 f.	- Vulgare. L. = Fougere commune.
— Siphilitice. L. = Lobélie siphilitique. de 50 c. à 1 f.	b. Cambricum. = Fougère lacinite.
Lemandra longifolia. Labill. = Lomandra d longues feuilles. de 2 d 3 f.	Pomederia cordata. L. = Pontederia en cour. *
we a a 3 1, 1	

Lotus cytisoides. L. = Lotier cotonneux. * de 50 à 75 c Lunaria rediviva. L. = Lunaria perennis. Mill. = Lunaire vicace. de razf. Lupinus perennis. L. = L. nortianus? Hortul. = Lupin vivace. Lychnis chalcedonica. L. === Lychnide de calcedoine. = = Croix de Jerusalem. == croix de Malie. b. Flore albo. de fleurs blanches. de 2 à 3 fi c. Flore roseo. Var. de fleurs roses. de 1 à 1 f. 50 c. d. Flore pleno. de jeurs doubles. de 1 à 2 f. Flore cuculi. L. _____ Lychnide lacinide. ____ Veronique des jardiniers. = Palamour. b. Plore pleno. de 15 à 25 c. Sylvestris. Hoppe. = L. dioica. b. L. = Jacte. = Robinet. == OEil de perdix. b. Flore pleno. de so à so c. Viscaria. L = Lychnide visqueuse. = Bourbonnaise des jardiniers de 50 à 60 c. Lysimachia ephemerum. L. = L. salicifolia. Mill. de 50 à 75 c. Vulgaris. L. de 25 à 50 c. Lythrum salicaria. L. = Salicaire commune. = S. d epis 15 à 25c. Melissa granditlora. = Mélisse à grandes fleurs 1 f. 50 c. Menyanthes nymphoides. L. = Villarsia nymphoides. Vent. = Waldschmidia. Hayn. = Lymnanthemun. = Menyanthe flottunt. * de 50 c à 11. de 50 à 75 c. Trifoliata. L. = Trefle d'eau. Monarda coccinea. Mich. = M. didyona. L. = M. purpurea. Lam. = Monarde écarlate. = The d'oswego. Fistulosa. L. = Monarde fistuleuse. de 75 c. à 1 f. Napoea lœvis. Ait. = N. hermaphrodita. L. = Sida napoea. Cav. = Napée lisse. de 50 à 75 c. de 1 à 2 f. Nymphæa alha. L. == Nenuphar blanc. * · Lutea. L. == Nenuphar jaune. * de 75 c. à 2 f. OEnothera rosea, L. = OE. rubra. Cav. = Onagre rose. 75 c. a 1 f. Ononis rotundifolia. L. == Bugrane à feuilles rondes, de 50 c. à 1 f. Onosma echioides, I. Anchusa lutea, Dalech. Cerithe echioides. Onosme vipériue, *

Pœonia albiflora. Pall. Pivoine blauche. de 2 3 f. - Corallina, Pety. = P. mascula, L. = Pivoine mdic, 50 à 75 e. - Humilis, Rety. = P. villosa? = Pivoine velue. - Officinalis. Rety. =: P. fœmina. L. Pivoine femelle.
b. Rubra plena.
c. Carnea plena.
Var. diffeur double ponceau. de 40 c. à 1 f.
c. Carnea plena. - Lobata. Desf. = Pivoine lobée de 2 à 3 f. Tenuifolia. L. = Pivoine à feuilles menues. de 1 à 2 f. Papaver orientale. L. = Pavot du levant. = P. de Tournesort. 1 à 2 f. Pascalia glauca. Orteg. Passillora incarnata. L. = Grenadille couleur de chair. § * 75 c. a 1 f. — Lutea. L. = Grenadille jaune. S. * de 75 c. à 2 l. Peganum harmala. L. = Ilermale à feuille découp. = Rue sauvage. de 50 75 c. Phlomis herba venti. L: = Phl. herbe du vent. de 50 à 75 c. - Lychnitis. L. = Phlomide d mêche. - Tuberosa. L. = Phlomide tubereuse. de 25 à 40 c. de 50 à 75 c. de 75 c. à 1 f. de 1 à 2 f. Phlox carolina. L. = Phlox de la Caroline. - Glaberrima. L. = Phlox glabre. Ovata. Mill. = Phlox à feuilles ovales. de 1 à 2 f. - Paniculata. L. = Phlox paviculé. de 50 c. à 1 f. - Pilosa. Mill. = P. aristata. id. = Phlox velu. 75 c. à 1 f. 50 c. - Suaveolens. Ait. = P. candida. Pers. = Phlox blanc. 1 1 2 f. - Subulata. L. = Phlox subule. de 75 c. à 1 f. - Suffruticosa. Willd. de ragf. Physalis alkekengi. L. = P. lalicacabum. Scop. = ⇒ Solanum vesicarium. Bauh. = Alkekenge. = Coqueret. 25 C. Plumbago europæa. L. = Dentelaire Europeenne. Polemonium curuleum. L. = Polemoine à fleurs bleues. = valériane grecque. 50 C. b. Album. Polemoine à fleurs blanches. 1 f. 25 c. Polygala vulgaris. L. 25 C. Polygonum bistorta. L. = Renouée bistorte. 25 c. Polypodium filix femina. L. = Fougère femelle. de 75 c. à 1 f. Filix max. L. = Fougere male. de 75 c. à 1 f. Vulgare. L. = Fougere commune. b. Cambricum. = Fougère lacinite.

de zázf.

Potentilla anserina. L. = Potentille anserine. = Argentine.
de 15 à 25 c. Primula auricula. L Oreille d'ours. (variétés nombreuses.) 1 de 25 c. à 1 f.
- Elatior. L. = Primevère. = Primerole. (varietés nombreuses.) de 20 à 80 c-
a. Modora. Hoff. = Primevère inodore. \$ b. Acaulis. Jacq. = Primevère unifiore. \$
Id. Flore pleno. c. Calycantha. Retz. = P. grandiflora? Lam. \$\frac{1}{2}\$
d. Officinalis. Jacq. P. veris. L. Primevère odorante. A P. crenata. Lam. de 1 à 1 f. 50 c.
Rainifeunis aconitionus. L. = Renoncule à jeuilles d'aconit.
b. Flore pleno: Bouton d'argent. de 50 c. à 1 f. Acris. L. Renoncule bassinet. T
b. Flore pleno. = Bouton d'or. \(\frac{1}{2}\) de 10 \(\frac{1}{2}\) f. Rhodiola rosea L. = Sedum roseum. Vill, = S. rhodiola. H. P. = Rhodiole odorante.
Rubia contifolia. Pull. = Garance à feuilles en cœur. * 1 à 2 f.
Rubus saxatilis. L. = Ronce des roches. de 1 à 2 f. Rudbeckia amplexicaulis: Vahl. 50 c.
Atropurpurea. L. = Rudbecque à fleurs pourpres. de 50 à 75 c. Ruellia strepens. L. = Ruelle verticillée. * de 1 à 1 f. 50 c. Rumex sanguineus. L. = Oseille sanguine. de 25 à 50 c.
Saccharim ravenna. = Andropogon ravenna. L. = Sucre ae
ravenne. Salvia glutinosa. L. = Sauge glutineuse. Pinnata. L. = Sauge pinnée. de 25 à 50 c. de 25 à 50 c. de 50 c. à 1 f.
— Pinnata. L. — Sauge pinnée. — Pulchella. D. C. — Sauge élégante. * — Sclarea. L. — Sauge sclarée. de 50 c. à 1 f. de 1 à 2 f. de 10 à 20 c.
Sanseviera carnea. Andrw. S. sessilis, Hort. Angl. Aletris essilis, Sansevière couleur de chair. * 1 de 75 c. 2 f.
Saponaria ocymoides. L. — Saponare rampante. \$\hat{x}\$ 50 \hat{a} 5 c. Officinalis. L. — S. vulgaris. — Lychnis officinalis. Neter.
= Saponaire commune.
b. Flore pleno. Saponaire à fleurs doubles. de 50 à 75 c. Saxifraga cotyledon. L. S. pyramidalis. Lapev. Sedum. Syramidale. Hortul. Saxifrage pyramidale. 50 c. à 1 f.
pyramidale. Hortul. = Saxifrage pyramidale. 50 c. à 1 f. — Crassifolia. L. = Saxifrage de sibérie. de 75 c. à 1 f. — Granulata. L. = Saxifrage granulée.
b. Flore pleno. de 75 c. à 1 f. Hirsuta. L. An Sax. punctata? L. Saxifrage velue. \$ 1 \$
— Hypnoides. Lapey. — S. gemmifera. — Sax. mousseuse.
Sarmentosa. L. F. = S. stolonifera. Jacq. = Saxifrage
de la Chine. S. stolonifère. S. sarmenteuse. 25 à 50 c. - Umbrosa. L. Saxifrage mignonette. S. amourette.
Scabiosa gramuntia. L. — Scabieuse à feuilles graminées. 25 c. — Leucantha L. — Scabieuse blanche. 50 c.
Scute laria galericulat. L. = Seutelluire toque. 40 c.
Sedum telephium. L. = Orpin commun. 1 25 c. Sempervivum arachnoideum. L. = Joubarbe arachnoide. 50 c.
— glohiferum? = Joubarbe globifere. 75 c. — Tectorum. L. = Joubarbe des toits. 25 e.
Senecio doronicum. L. == Seneçon doronic. 40 c. Silene giguntes. L. == Silene gigantesque. * 50 c.
Silphium connatum. L. = Silphie d feuilles réunies. de 50 à 75 c. Lacinitatum. L. = S. pinnatifidum. Hortul. = Silphie
lacinide. de 75 c. a 1 f. — Perfoliatum. L. = S. perfolite. de 50 à 75 c.
Terebinthinaceum. L. Silphie a feuilles en cœur. 75 c. à 1 f. Trifoliatum. L. Silphie trifolice. de 75 c. à 1 f. Sirphiachium hamadiana.
Sisyrinchium bermudiana. L. = Bermudienne bleue. * 50 à 75 c. = Gramineum. Cura = S. ancepe. Lam. = Bermudienne graminée. *
minée. * de 50 à 75 c. Palmifolium. Willd. S. latifolium. Ait. S. racemosum. Pers. Morcea plicata? Curtis. M. Palmifolia? Jacq. =
Marica plicata? Curtis, — Bermudienne nerveuse. * 75 C. 2 I Marica plicata? Curtis, — Bermudienne nerveuse. * 75 C. 2 I Striatum. Smith. — S. spicatum. Cav. — S. reticulatum.
Dum. Cours. = Morosa sertata. Jacq. = Bermudienne strice. * de 60 à 75 c.
Solidago bicolor. L. = Verge d'or de doux couleurs. 50 c.

· 1	
Solidago flexicaulis. L. = S. latifolia. = Verge d'or tortueu	
Mayicana I - Venge d'or du Manime de co	300
- Mexicana. L. = Verge a or au mexique. de 50	a 75 c
— Mexicana. L. = Verge d'or du Mexique. de 50 — Nutans. Desf. = Verge d'or panchée. — Procera. Ait. = Verge d'or élevée.	so c
— Procera. Ait. = Verge d'or élevée.	50 C
— Sempervirens. L. = Verge d'or toujours verte. de 50 — Virga aurea. L. = Verge d'or commune. de 40	à 75 C
- Virga aurea, L. = Verge d'or commune, de 40	à 50 C
Sophora alopecuroïdes. L. = Sophora queue de renard. de 50	3 70 0
Australia z Dadularia purturila 187111	4 75 6
Australis. L. Podalyria australis. Willd. P. cœrule	a. Pers
de 1 à 2	f. 50 c
Spigelia marilandica. L. == * de	2 á 3 f
Spiræa aruncus. L. = Spirée barbe de bouc. de 1 f. 50 c	4 2 F
- Kilingudula I - Snirde filingudula	
- Filipendula. L. = Spirée filipendule. b Flore pleno. = Fuipendule. à fleur double. so	25 C
b Flore pleno. = Fuipendule à fleur double. 50 c	. a I I
Lobata L. S. palmata. Pall. Spirée à feuil.lobées. Ulmaria. L. Spirée reine des près. Stachys cretica. L. Stachide de Créte. de 20	1 4 2 f
— Ulmaria. L. = Spirée reine des près.	40 6
Stachys cretica. L. == Stachide de Créte. de 20	à 50 C
Statice armeria. L. == S. coespitosa. ? Poir. == S. m	Antana
Mill. *	
-	25 C.
Bellidifolia. Gouan. * de 50	
- Fasciculata. Vent. de 1	1 2 f.
— Limonium. L. == Limonium siculum. Mill. * de 40	à ca c
- Tartarica. L. = S. trigonoïdes. Pall. = Limonium tart	aricum
Mill. * de 1	
Stellario balanca I Ceellain balante	à 2 f.
de 15	4 40 C.
Stellaria holostea. L. = Stellaire holostee. de 15 Stevia hyssopifolia. Cav. = S. punctata. Pers. = Ageratum p	ouncta-
tum? Orteg. = Stevie à feuilles d'hysope. * de 75 c. à 1 Stipa pennata. L. = Stipe peunée. * de 50 Feucrium hircanicum. L. = Germandrée d'Hircanie. * 40	. (O. C.
Stipa pennata. L. = Stipe pennee. *	à Ge c
Fourium historiana I - Germandele d'Historie & 40	4 60 0
Whatisamer and significant I to The absorption I am	4 00 C.
Thalictrum aquilegifolium L. = T. atropurpureum. Jacq. 75 c	
— Discolor. Hossul. de 50 — Flavum. L. = Pigamon des pres.	à 75 C.
- Flavum, L. = Pigamon des près.	20 C
— Fortidum. L. = Pigamon fatide. — Speciosum. = Pigamon elegant. H. P. de 1 Frachelium coeruleum. L. = Trachelie bleue. de 75 c	40 C
- Speciesum - Digamen degane H D	30.0
Prophelium complement Translation Live & James	a z L
Trachemmi coemieum. L. = Tracheme ofene de 75 c	. a z t.
Tradescantia virginica. L. = Ephemère de Virginie. 40 l'hymus serpillum. L. = Serpolet	à 50 c.
l'hymus serpillum. L. == Serpolet	16 C.
l'rollius europœus. L. = T. altissimus. Cranty. = Trolle d'E	Surone.
= Trolli. de 1	
Trolli. de 1	
l'ussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél	iotrope
Tussilago fragrans. Fill. = Tussilage oderant. = Hél d'hiver. de 25	iotrope à 40 C
Tussilago fragrans. Fill. = Tussilage oderant. = Hél d'hiver. de 25	iotrope à 40 C
Tussilago fragrans. Fill. = Tussilage oderant. = Hél d'hiver. de 25	iotrope à 40 C
Tussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél d'hiver. de 25. Uniola paniculata. Hortul. = U. latifolia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. = Ortie de la Chine. * de 1 à 1 î - Canadensis. L. = Ortie du Canada. de 7	iotrope à 40 c. à 75 c. . 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 î — Canadensis. L. — Ortie du Canada.	iotrope à 40 c. à 75 c. . 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 i Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 à 1 — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scandens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. —	iotrope à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. = Us-
Fussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. de 25: Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50: Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpanse. 6. *	iotrope à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. = Us-
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. de 25: Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50: Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * Valeriana officinalis, L. — Valeriane officinale.	iotrope à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. = Us-
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. de 25: Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50: Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * Valeriana officinalis, L. — Valeriane officinale.	iotrope à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. = Us-
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. de 25. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 î i — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria soiralis. L. — Valisnaire. *	iotrope à 40 c. à 75 c. 50 c. à 2 f. = Us- 25 c. 25 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. de 25. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 î i — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria soiralis. L. — Valisnaire. *	iotrope à 40 c. à 75 c. 50 c. à 2 f. = Us- 25 c. 25 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Velseria spiralis. L. — Valisnaire. * Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-avres. * so e	iotrope à 40 c. à 75 c. à 75 c. à 2 f. = Us- à 2 f. 25 c. 25 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Héle d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersiorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * Valeriana contra spiralis. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer	iotrope à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f Us- à 2 f. 25 c. 25 c. i 75 c. kicina.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 de 12 l'uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 de 12 l'uniola nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 12 l'uniola seundensis. L. — Ortie du Canada. de 12 l'elevita scandens. Cav. — Maurandia sempersiorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 12 de 12 de 13 de 14 de 14 de 15 de 16 d	iotrope à 40 c. à 75 c. à 50 c. à 2 f. : Us- : à 2 f. 25 c. 27 c. 27 c. xicina.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 de 1à 1	iotrope à 40 c. à 75 c. ; 50 c. à 2 f. à 2 f. 25 c. 27 c. icina. à 2 f. iculte-
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 1 Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mes Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasse de 22 c. de 22 c.	iotrope à 40 c. à 75 c. à 2 f. 25 c. 25 c. à 2 f. à 2 f. à 2 f.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 1 Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mes Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasse de 22 c. de 22 c.	iotrope à 40 c. à 75 c. à 2 f. 25 c. 25 c. à 2 f. à 2 f. à 2 f.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Héle d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersiorens. Cur. — trète grimpanse. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc. * Vernonia novœborascensis. Willd. — Seratula. avoæborascensis. Willd. — Seratula. avoæborascensis. Willd. — Seratula.	iotrope à 40 c. à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. 25 c. 25 c. à 2 f. iculte_ à 1 f. censis.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Héle d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersiorens. Cur. — trète grimpanse. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc. * Vernonia novœborascensis. Willd. — Seratula. avoæborascensis. Willd. — Seratula. avoæborascensis. Willd. — Seratula.	iotrope à 40 c. à 40 c. à 75 c 50 c. à 2 f. 25 c. 25 c. à 2 f. iculte_ à 1 f. censis.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — trète grimpanse. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 f. C. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc. * Vernonia noveeborascensis. Willd. — Seratula. noveeborasc. L. — Vernonia de Newyork. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c.	iotrope à 40 G. à 45 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 2 G. \$ 2 G. \$ 1 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — trète grimpanse. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 f. C. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc. * Vernonia noveeborascensis. Willd. — Seratula. noveeborasc. L. — Vernonia de Newyork. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c.	iotrope à 40 G. à 45 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 2 G. \$ 2 G. \$ 1 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifelia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — trète grimpanse. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 f. C. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc. * Vernonia noveeborascensis. Willd. — Seratula. noveeborasc. L. — Vernonia de Newyork. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c. — Presalta. Will. — Seratula. L. — V. gigantessue. de 75 c.	iotrope à 40 G. à 45 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 25 G. \$ 2 G. \$ 2 G. \$ 1 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * Valeriane sonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 75 c. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 de 75 c. — Strita. Vene. — V. ringens. Mich. — Verveine faste de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. — Seratula. aovæboras. L. — Vernonia de Newyort. de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Incana. L. — V. canescens. Schr. — V. neglecta. Vahl. — Incana. L. — V. canescens. Schr. — V. neglecta. Vahl.	iotrope à 40 G à 75 G . 50 G . 42 f 25 G 27 G id a f 25 G id a f iculte à 1 f censis à 1 f G 50 G
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hele d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasce de 75 c. — Vernonia novœborascensis. Willd. — Seratula. aovœborascensis. Willd. — Seratula. aovœborascensis. Willd. — Seratula. — V. gigantesque. de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. L. — V. neglecta. Vahl. — Laciniata. Schr. — V-tronique lacinide.	iotrope à 40 G. à 75 G. : \$0 G. : \$2 f. : \$2 f. : \$2 G. : \$2 G. : \$2 G. : \$2 f. : \$2 G. : \$3 G. : \$3 G. : \$5 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — trère grimpante. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valeriana bonariense. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 76 c. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 f. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasc de 75 c. — Vernonia novœborascensis. Willd. — Seratula. novœborascensis. Willd. — Seratula. novœborascensis. Willd. — Seratula. — V. gigantesque. de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Precalta. Will. — Serratula. L. — V. neglecta. Vahl. — Latiniata. Schr. — Veronique de larges seuilles.	iotrope à 40 G. à 475 G. à 50 G. à 2 f. 25 G. 275 G. à 2 f. iculte- à 1 f. G. 1 f. 50 G. 50 G. 50 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	iotrope à 40 G. à 75 G. : \$0 G. : \$2 f. : \$2 f. : \$2 G. : \$2 G. : \$2 G. : \$2 f. : \$2 G. : \$3 G. : \$3 G. : \$5 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Waleriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valeriana spiralis. L. — Valisnaire. * Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 70 Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer Gart. — Verveine du Mexique. * de 75 c. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasce * Vernonia novæborascensis. Willd. — Seratula. novæborascensis. Willd. — Seratula. novæborascensis. Willd. — Seratula. — Vernonia de Newyork. — de 75 c. — Prevalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Prevalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Incana. L. — V. canescens. Schr. — V. neglecta. Vahl. — Laciniata. Schr. — Véronique lacinide. — Latifolia. Ait. — Véronique de larges feuilles. — Maritina. L. — Véronique maritime. — Media. Schr. — Véronique moyenne.	iotrope à 40 G. à 475 G. à 50 G. à 2 f. 25 G. 275 G. à 2 f. iculte- à 1 f. G. 1 f. 50 G. 50 G. 50 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersorens. Cur. — tèrie grimpante. §. * de 1 Waleriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valeriana spiralis. L. — Valisnaire. * Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 de 70 Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer Gart. — Verveine du Mexique. * de 75 c. — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine fasce * Vernonia novæborascensis. Willd. — Seratula. novæborascensis. Willd. — Seratula. novæborascensis. Willd. — Seratula. — Vernonia de Newyork. — de 75 c. — Prevalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Prevalta. Will. — Serratula. L. — V. gigantesque. de 75 c. — Incana. L. — V. canescens. Schr. — V. neglecta. Vahl. — Laciniata. Schr. — Véronique lacinide. — Latifolia. Ait. — Véronique de larges feuilles. — Maritina. L. — Véronique maritime. — Media. Schr. — Véronique moyenne.	iculde- à 1 f. c. à 2 f. à 1 f. c. à 1 f. c. à 1 f. c. à 1 f. à 50 c. à 0 f. c. 40 c. 40 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 475 G. à 2 f. à 50 G. à 1 f. G. 50 G. 40 G. 50 G. 40 G. 50 G. 50 G. 50 G. 50 G. 50 G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 475 G. à 2 f. à 1 f. G. I f. G. I f. G.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	iotrope à 40 G. à 475 G. : 50 G. : 50 G. : 25 G. : 25 G. : 25 G. : 25 G. : 26 G. : 27 G. : 28 G. : 28 G. : 29 G. : 20
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Held d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 475 C. à 2 f
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Held d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 47 G. à 47 G. à 2 f. à 50 G. à 1 f. G. 50 G. G. 40 G. 50 G. G. \$50 G. G. \$50 G. \$50 G. \$50 G. \$70 G. \$7
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 475 C. à 2 f
Tussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. = U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. = Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. = Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 c. à 2 f. à 3 f. à 3 f. à 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. = U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. = Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. = Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 c. à 2 f. à 3 f. à 3 f. à 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. = U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. = Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. = Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 c. à 2 f. à 3 f. à 3 f. à 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. = Tussilage odorant. = Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. = U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. = Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. = Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 c. à 2 f. à 3 f. à 3 f. à 50 c.
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 50 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 27 G
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Hél d'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30 Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 de	intrope à 40 G. à 27 G
Tussilago fragrans. Vill. — Tussilage odorant. — Héld'hiver. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30. Uniola paniculata. Hortul. — U. latifolia. Mich. de 30. Urtica nivea. L. — Ortie de la Chine. * de 1 à 1 f. — Canadensis. L. — Ortie du Canada. de 1 Usteria scundens. Cav. — Maurandia sempersiorens. Cur. — trève grimpante. §. * Valeriana officinalis. L. — Valeriane officinale. — Phu. L. — Valeriane phu. * Valisneria spiralis. L. — Valisnaire. * 1 f. Verbena bonariense. L. — Verveine de buenos-ayres. * 50 a. — Mexicana. L. — Priva mexicana. Pers. — Blaeria mer. Gart. — Verveine du Mexique. * de 1 — Strita. Vent. — V. ringens. Mich. — Verveine sause. * Vernonia novæborascensis. Willd. — Seratula. novæborascensis. W	intrope à 40 G. à 27 G

PLANTES BULBEUSES ET OIGNONS A FLEURS.

AGAFANTHUS umbellatus. l'Hérit. == Crinum africanum. L. ==
Mauhlia africana. Dahl. = M. linearis. Thunb. = Tulba-
ghia heisteri? Fabr. = Tubéreuse bleue. = Agapanthe
ambellisere. V de 75 c. 23 f.
b. Minor. Var. petite. & de 1 à 3 f. Albuca altissima? Ait. = Albuca elevé. or de 1 à 3 f.
Major, L. = A. lutea Lam. = Albuca jaune, or, de 1 à 1 f.
— Major. L. = A. lutea. Lam. = Albuca jaune. or. de 1 à 2 f. — Minor. L. = Albuca petit. or. de 1 à 2 f.
Allium baicalense. Willd. = Ail du lac Balcal. pl. t. 50 c. 1 f.
Chame-molly, L. pl. t. de so c. h r f.
— Flavum. L. — Ail jaune pl. t. de 50 C. à 1 f. — Fragrans. Vent. — Ail odorant. de 25 C. à 1 f. — Moly. L. — A. aureum L. — Ail dorê. pl. t. de 10 à 25 C. Moly. L. — A. aureum L. — Ail dorê. pl. t. de 10 à 25 C.
- Fragrans. Vent. = Ail odordnt. & de 25 c. à 1 f.
Moly. L. = A. aureum L. = Ail doré. pl. t. de 10 à 25 c.
Monspessulanum. Gou. = A. multibulbosum. Jacq. = A. nigrum. Willd. pl. t. de 40 à 50 c.
Roseum. L. = Ail rose. pl. t. de 25 à 50 c.
Alstræmeria ligtu. L. = Pélegrine à fleurs rayées. or. de 2 à 3 f.
— Pelegrina. L. = Lis des Incas. = Pélegrine tachetée.
or. de 2 à 3 f.
Amaryllis atamosco. L. = Amaryllis de Virginie. or. 1 f. 50 c. à 2 f.
- Aurea. PHlerit. = Amaryllis dorée. = Lis jaune doré. or.
de 3 à 6 f. Formosissima. L. = Am. à fleurs en croix. = Lis de Saint-
Jacques. 8 de 1 ½ 2 f.
- Lineata, Lam. = A. zeilanica, PHérit, = Crinum latifolium.
Mill. — C. zeilanisum. L. — Amaryllis rayle. y 1 à 4 f. — Longifolia. L. — A. vivipara. Lam. — Crinum asiaticum. Mill.
— Longifolia. L. = A. vivipara. Lam. = Crimum asiaticum. Mill.
Amarvilis a longues teulles, or, que s'a c'i.
— Lutea. L. = Amaryllis jaune. pl. t. de 10 à 25 c. — Punicea. Lam. = A. equostris. Ait. = A. dubia. L. = A.
belladonna. Mill. Amaryllis écarlate. or. de 3 à 6 f.
belladonna. Mill. = Amaryllis tearlate. or. de 3 à 6 f Rosea. Lam. = A. belladonna. Ait. = A. regince. Mill.
= Amaryllis à fleurs roses. = Belladone, or. de 3 à 6 f.
- Sarniensis. L. = Amaryllis grenesienne, or. de 3 à 4 f.
— Undulata, L. = Amaryllis ondulee. de v à 2 f
Amomum granum paradisi? Willd. = Amome d grappes. S. ch.
de 3 à 6 f.
- Zerumbet. L. = Gingembre sauvage. or. \(\forall \) de \(\frac{3}{4} \) 6 f Zingiber. L. = Amome des Indes. = Gingembre. or. \(\forall \) 5 de f. Anemone coronaria. L. = Anemone des jardins. = d. des fleurisses
Anemone coronaria. L. = Anemone des jardins. = d. des fleuristes
Var. très nombreuses à fleurs doubles et de couleur variées. pl. t. de 5 à 25 f. le 9,
pl. t. de 5 à 25 f. le %
Hortensis. L. A. stellata. Lam. == Amemone étoilée.
Var. doubles et simples de couleurs variées. 25 c.
b. Pavonius. Lam. = Anemone equil de Paon. pl. t. de 50 c. à 1 f. 50 c. Asphaeloides. L. = Anthéric d feuilles d'aloès. or. 1 à 2 f. — Asphaeloides. L. = Librae l'or de 1 à 2 f. L. = Librae l'or = Phologogies l'or = 1 à 2 f.
Asthericum aloides. L. = Anthéric à Scuilles d'aloès or 122 f
- Asphadeloïdes. L. = Lis asphodèle. or. de 1 à 2 f.
— Liliago. L. = Phalangium liliago. Lam. pl. t. de 50 c. a 1 f. Antholyza orthiopica. L. = Antholyze d'Ethiopie. s ch. 40 à 75 c.
Antholyza othiopica. L. = Antholyze d'Ethiopie. s ch 40 à 75 c.
— Ringens. L. = Antholyze d fleurs ringentes. de 1 a 2 f. Arthropodium pendulum. D C. = A. elongatum. Hort. Monsp.
Arthropodium pendulum. D.C. A. elongatum. Hert. Monsp.
Phalangium pendulum. Red. — Anthericum pendulum. Hort. Hafn. or. de 1 à 2 f.
Arum arisarum. L. = Gouet à capuchon. pl. t. de 50 c. à 1 f.
- Bicolor. = Caladium bicolor. Vent. = Gouet bicolore.
S. Ch. de 2 à 4 f. l
- Corsicum. Lois. = Gouet de Corse. pl. t. de i à 2 f.
— Divaricatum. L. = A. proboscideum. Hortul. S. ch. 1 à z f1
- Dracunculus. L. = Gouet serpemaire. pl. t. de 1 à 2 f.
- Esculentum. L. = Caladium esculentum. Vent. = Gouet
mangéable. s. ch. de 3 à 4 f. Italicum. Lam. = Gouet d'Italie. pl. t. de 75 c. à 1 f.
a. Albo-variegatum. D.C. (à feuill nanachées de blanc 1
b. Immaculatum. DC. d feuilles vertes.
Arum vulgare. Lam. = A. maculatum. L. = Gouet commun.
pl. t. de 25 à 50 c.

Arum. vulg. a. Nigro- maculatum. DC. b. Immaculatum. D.C. Asparagus amarus. DC. = A. scaber? Bring. = Asperge amère. pl. t. de so c. à 1 f. Asphodelus fistulosus. L. = Asphodèle fistuleux. pl. t. 25 à 60 c. Luteus L. = Asphodèle jaune. pl. t. de 50 c. à 1 f.

Ramosus, L. = llastula regia. Hortul. = Asphodèle rameux,

A. blanc. pl. t.

Belamcanda chinensis. DC. = Ixia chinensis. Trew. = Morœa sinensis. L. = Pardanthus. = Jris tigré. = Morée de de 25 à 50 c. la Chine. pl. t. Bryonia dioica. Jacq. = Bryone diotque. = B. couleuvree. = Vigne blanche. pl. t. S. de 40 à 60 G Canna glauca. L. == Balisier glauque. or. de 1 a 3 f. - Flaccida, Salisb. or. de 3 a s f. - Indica. L. = Balisier d'Inde. = Plante à chapelet de 50 c. à 2 f. b. Coccinea. Mill. Var. ou Esp. a fleur écarlates y 1 à 3 f. c. Lutea. Ait. Colchicum autumnale. L. = Colchique d'automne, pl. t. 10 à 25 c. — Montanum. L. = Colchique de montagne. de 40 à 60 c. Convallaria japonica. Thunb. = Ophiopogon japonicum. Bot. Mag. - Muguet du Japon. pl. t. de 25 à 50 c.

- Majalis. L. = Muguet de mai. pl. t. de 10 à 15 c.

b. Flore pleno. Var. \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) pl. t. de 50 à 75 c. L. Polygonatum vulgare. P. uniflorum. multiflere. pl. t. - Polygonatum. Desf. = Sceau de salomon commum. pl. t. de 10 à 20 c. Crinum erubescens. L. F. — Crinole rougeâtre. S. ch. de 3 à 6 c.
Crocus sativus. L. — C. officinalis. Smith. — Saffran cultivé. —

S. des boutiques. pl. t. de 3 à 6 f. le 7.

Vernus L. — Saffran printanier. — Saffran de Hollande. (25 varietés de couleurs différentes.) pl. t. 3 à 10 f. le % b. Luteus. Lam. pl. t. Cyclamen europœum. L. = Cyclame d'Europe. = Pain de pourde 75 c. à 2 f. ceau. vulg. pl. t. - Hedercefolium. Ait. = C. vernum. = Cyclame d feuilles de lièrre. = C. d'alep. pl. t. de 3 4 f. - Persicum. Ait. = C. indicum? Hortul. = Cyclame de de ragf. Perse. & b. Limbo roso. Var. d fleur rosee. de ragfi Cyrilla pulchella. l'Hérit. = Gésneria pulchella. Swartz. = Columnea exerta. Lam: == Buchnera coccinea. Scop. == Achimenes coccinea. Pers. = A. minor. Brown. s. ch. I f. 50 c. 3 f. Dianella corulea. Red. = Dianelle bleue. or. Nemorosa. Lam. = D. ensifolia. D C. = de 2 à 3 f. = Dracena ensifolia. de 75 c. à 1 f. Dodecatheon meadia: L. = Gyroselle de Virginie. pl. t. de 1 f. 50 c. à 3 f. Eucomis punctata, l'Hérit. — Asphodelus comosus. Houttuyn. — Ornithogalum punctatum. Thunb. — Eucomis tacheté. ro. de 1 à 3 f. - Regia. Ait. = Fritillaria regia. Dill. = Basilea coronata. Lam. = Eucomis couromé. or. de ràzf. Ferraria undulata. L. = F. punctata. Pers. = Ferrare ondulec. de 1 f. 50 c. 2 2 f. Fritillaria imperialis L. == Ptilium. L. == Imperialis coronata Dum. Cours. == Couronne impériale. pl. t. b. Flore pleno.

c. Kroon-op-kroon.

d. Varlegata.

e. Chinensis.

f. Maxima.

g. Lutea. Lam.

b. Flore pleno.

double rouge. pl.t. 1f. 50c. 22f.

couronne sur couronne, de 2 à 3 f.

d feuil, panachées. pl. t. 1 à 2 f.

de la Chine? pl. t. 1 à 2 f.

d grandes fleurs. pl. t. 75 c. à 1 f.

d fleur jaune. pl. t. 75 c. à 1 f. - Meleagris. L. = Fritillaire panachée. = Meleagre. pl. t.

de 4 à 6 f la douz.

Fritillaria persica. L. = Fritillaire de Perse. pl. t. de 1 à 2 f. Fumaria bulbosa. L. = F. cava? Ehrh. = Corydalis bulbosa	Hyacinthus orientalis. L. = .
Pers. = C. tuberosa. Lam. = Fumeterre bulbeuse.	· 1
Gelanthus nivalis. L. — Perce neige. pl. t. de 75 c. à 1 f.	a. Flore simplici.
Georgina frustranea. DC. = G. coccinea. Will. = Dahlia. Cav.	
pl. t. de 50 c. à 2 f. a. Coccinea. DC. = Dahl'a ponceau. pl. t.	· į
b. Crocea. D.C. Dahlia couleur de feu. pl. t.	Nombreuses varietà,
c. Flava. D.C. = Dahlia jaune. pl. t. Superflua. D.C. = G. variabilis. Willd. pl. t. 50 c. 2 2 f.	1
a. Rubra. DC. = G. purpurea. Willd. = Dahlia mor-	
doré. pl. t. b. Purpurea D C. = Dahlia pinnata. Cav. = Dahlia	3
pourpre. Thouin. pl. t.	1
Id. Flore pleno. — Dahlia à fleur double, pl. t. de 2 à 5 f.	- Racemosus. L. = H. junc
c. Lilacina. DC. Georgina rosea. Willd. = Dahlia rosea.	D C. pl. t.
Cav. — Dahlia lilas. pl. t. d. Palida. D.C. — Dahlia påle. pl. t.	— Serotinus. L. = H. livi Destremx. = Zuccagnia
e, Flavescens. D.C. = Dahlia jaunatre. pl. t.	tina. Willd. == Jacinth
Geranium triste. L. = Pelargonium triste. Willd. = G. d odeur de géroffle. or. de 1 à 3 f.	Hypoxis villosa. L. = H. sol Lam. = Hypoxis velu
- Tuberosum. L. = Géranion tubéreux. pl. t. 75 c. à 1 f. 50 c.	Iris acuta. F. B. pl. t.
Gladiolus cardinalis. Curt.	- Fimbriata: Vent. = I. chi Dum. Cours.
- Carneus. Jacq. = Glayeul rose. or. ed 1 f. 50 c. à 2 f.	- Florentina, L. = Iris de
- Coccineus? Hort. Tel. or. de 2 1 3 f Communis. L. = Glayeul commun. pl. t. 1 f. la douz.	b. Alba. Savi id. d Iris fœtida. = J. fœtidissima. I
b. Albiflorus. D C. == G. major alb. Gou. pl. t. 3 f. la douz.	pl. t.
— Hyalinus. Willd = G. strictus. Jacq. or. de 2 à 3 f. — Lineatus. Curt. = Ixia squalida. Ait. = Glayeul jaunâtre.	. Variegata. pl. t. Germanica. L. = Iris d'
or. de 1 à 2 f.	b. Cœrulea. War S
— Merianellus, Willd. — Watsonia humilis, Mill. — Antholiza merianella, L. or. de 1 f. 50 c. à 2 f.	c. Purpurea.
b. Roseo - albus? Hort. Tel. or. de 2 à 3 f.	à fleurs pâles. p
— Merianus. Willd. — Antholiza meriana L. — Watsonia meriana. Mill. — Glaycul de mérian. or. de 1 à 2 f.	— Graminea. L. = Iris gra Lurida. Ait = Iris
- Plicatus L. = Lemonia. Pers. = Ixia plicata. Lin. or. 1 à 2 f.	- Lutescens. Lam. = Iris
b. Flore rubro. or. de 1 à 2 f. Securiger. Ait. = Ixia gladiolaris. Lam. = Glayeul cuivré.	— Ochroleuca. L. pl. t. — Pavonia. Thunb. pl. t.
or. de 1 f. 50 c. à 2 f.	- Persica. L. = Iris de Pe
— Sulphureus. Jacq. — Lemonia. Pers. — Glayeul jaunatre. — Tristis. L. — Glayeul bigarre. or. de 2 à 3 f.	— Plicata. Lam. — Iris plis — Pseudacorus L. — I. pa
- Tubatus. Jacq. = Lemonia. Pers. = Glayeul d long tube.	pl. t.
- Variegatus. Hort. Tel. or. de 1 f. 50 c. à 2 f Vitt tus. Jacq.	- Pumila. L. = Iris naine. a. Flore cœruleo. Var.
Globba japonica? Thunb. = Globbée du Japon. or. de 3 à 5 f.	D. THOIR AIDO.
Nutans. Willd. = Renealmia nutans. Andrws. = Zerumbet speciosum Jacq. = Globbée pendante. & S. ch. 2 à 4 f.	— Sambucina. L. = Iris d o — Squallens. L. = I. variega
Glycine apios. L. == Glycine tubéreuse. S. & pl. t. de 1 à 2 f.	
Hoemanthus coccineus. L. = Hémanthe écarlate. = Tulipe du cap. s. ch. de 10 à 12 f.	— Sibirica, L. = I. pratensis — Spatulata, Lam. = I. spurid
— Puniceus. Ait. — Hémanthe ponceau. S. ch. de 4 à 6 f. Hemerocallis alba. Adrews. — H. japonica. Thunb. — H. cordata?	- Swertii. Lam. = I. desert
= H. plantaginea. Lam. = Hémerocale du Japon. & 1 à 2 f.	— Suziana. L. — Iris de Sus
— Cœrulea. Andrews. = Lilium cordifolium? Willd. = Hê-	— versicolor. L. = Iris var — Xiphium. L. = I. variabili
merocale bleue. or. de 2 à 3 f. Flava. L. = Hemerocale jaune. = H. odorate. = Lis	Iris bulbeuse. == I. ch
jonquille. pl. t. de 75 c. à 1 f. b. Graminea. Andrews. pl. t. de 1 à 2 f.	(varietées nuancées de vi
- Fulva. L. = Hémerocale rouge. pl. t. de 25 à 50 c.	- Xiphioïdes L. = I. xiph
Hoffmanseggia falcaria. Cav. = Larrea glauca. Orteg. pl. t. 50 c. 1 f. Hyacinthus amethystinus. L. = H. hispanicus. Lam. pl. t. 1 f. 25 c.	pl. t. Ixia bulbocodium. L. == I. eu
Botryoides L' Muscari botryoides. Mill. = jacinthe botri-	— Crocata. L. — Gladiolus
otde. pl. t. 25 c. — Comosus. L. — Muscari comosum. Mill. — Jacinthe à toupet.	or. b. Ceccinea:
== Muscari chevelu. pl. t. 25 c.	a Dassa
b. Monstrosus. L. = II. paniculatus. Lam. = Muscari monstrosum. DC. = Muscari monstrueux. = Jacinthe.	d. Punicea. Hort. Tel. Var.
paniculée. pl. t. de 50 c. à 1 f.	- Erisagan? Hert. Tel. or.
— Muscari, L. — H. suaveolens, H. P. — Muscari ambrosiaceum. Mounch. — M. moschatum, Willd. — Jacinthe	- Longiflora. Jacq. = Glad = Ixia & longues fleur
musquée. = Muscari odorant. pl. t. de 25 à 50 c.	- Monadelphia major ? Hort.
	- Serotina? Hort, Tel. or.

Jacinthe orientale. = J. des fleuristes.

de 15 à 100 f. le % rouge. de 4 à 20 f. la dous. rose et couleur de chair. fleurs simp. de 3 à 15 f. la douz. blanche. de 3 à 10 f. id. id. centre violet, jaune rose et pourpre. de 6 à 20 f. la douz. de couleurs. jaune de 9 à 24 f. id. bleue. de 3 à 10 f. id. id. fonce et clair. 4 à 10f. la dours. id.porcelaine et agathe. fleurs doub. de 4 à 10 f. id. id. noirâtre. 6 à 20 f. id. ifolius Lam. = Muscari racemosum. de 40 à 50 c. idus. Pers. — Coursetia serotina. serotina. Targ. = Lachenalia serobolifera, Jacq. = H erecta, Var. de 75 c. à 1 f. de 75 c. à 1 f. ie. or. y nensis. Curtis. == Morcea fimbriata: de 75 c. à 2 f. de 25 à 50 c. de 1 à 2 f. florence. pl. t. fleurs blanches. & de 1 & 2 f. L. = Iris fætide. = Glayeul puant. ²25 c. 50 C. Allemagne. pl. t. de 10 à 25 c. bleu fonce. pl. t. de 25 à 40 c. pourpre violet. pl. t. de 40 à 50 c. 1. pallide-cerulea. Willd. = Iris de 50 à 60 c. de 50 à 60 c. pe 75 c. à 1 f. ol. t. minée. pl. t.
pale. pl. t. de 25 à 50 c. de 60 c. à 1 f. jaunatre. pl. t. de 1 à 2 f. erse. pl. t. de 25 à 60 c. ssée pl. t. 50 à 60 c. aludosa. Pers. = Iris des marais. de 15 à 25 c, pl. t. § à fleur bleue. pl. t. de 25 à 50 c. d fleur blanche, pl. t. 25 à 50 c.

deur de sureau, pl. t. de 40 à 60 c.

ata. Jacq. = Iris jaune sale, pl. t.

de 75 c. à 1 f. s. Lam. pl. t. de 50 à 60 c. a. L. = I. spatulée. pl. t. 50 c. à 1 f. torum. Balbis. = Iris de Hollande. de 1 d 2 f. de 75 c. d 1 f. de 1 u 2 f. e. 😾 pl. t. rice. pl. t. de 1 u 2 f. is. Jacq. = Xiphium vulgare. Mill. namolette. = I. d'Espage. pl. t. olct, de bleu, jaune, panaché. etc.) de 1 à 4 f. la douz. de 75 c. 4 1 f. ropæa. Pers. pl. t. de 40 à 60 c. crocatus. W'endl. = Ixia safrant. de 40 2 60 c. de 1 1 2 f. de 1 1 2 f. écarlate. or. rose. ur. ponceau. or. de 1 à 2 f. d corolle aigue. or. de 1 à 2 f. de 1 à 2 fe liolus. Thunb. = Lemonis. Pers. de 1 à 2 f. de 1 à 2 f. or: Tel. or. de razt.

Ixia zeylanica? Hort. Tel. or. Lachenalia pendula. Jacq. - Phormium bulbiferum. Cyrill. -Lachenalia à fleurs pendantes.
b. Tricolor? Jacq. = L. tricolore. or. de 2 à 3 f. de 2 à 3 f. Lathyrus tuberosus. L. = Gesse tubereuse. S. pl, t. de 25 à 50 c. Leucoium æstivum. L. = Leucolum d'été. pl. t. de 20 à 50 c. de 20 à 35 c. Vernum. L. = Leucoium printanier. pl. t. Lilium bulbiferum. L. = L. philadelphicum? Thunb. = Lis bulde 4 à 8 f. la douz. bifère. pl. t. b. Croceum. = L. aurantiacum. = Lis orangé. pl. t. 1 à 2 f. c. Hunile. Mill. pl. t. de 1 à 2 f. - Canadense. = L. pendulistorum. DC. = Lis du Canada. pL t. de 2 à 3 f. - Candidum. L. = Lis blanc. pl. t. de 15 à 25 c. b. Flore pleno. == Lis blanc d fleurs doubles. pl. t. 1 i 3 f. c. Sanguineum. = Lis blanc raye de rouge, = L. ensanglante. pl. t. de zagf. - Chalcedonicum. L. = Lis hémérocale. pl. t. - Martagon. L. = Lis martagon. pl. t. de 50 c. à 1 f. de 2 à 3 f. b. Album. = Martagon blanc. pl. t. de 1 f. 50 c. à 3 f. Pomponium. L. = Lis turban. pl. t. - Pyrenaïcum. Gouan. = Lis des Pyrennées. pl. t. de 1 à 2 f. - Superbum. == Lis superbe. pl. t. de 3 å 4 f. - Tigrinum. Curtis. = L. speciosum? Andrews. = L. sinense. Lis élégant. = L. tigré. v pl. t. de 3 à 5 f. Limodorum purpureum. Lam. = Limodre pourpre. s. ch. 3 à 5 f. — Tankervillice. Ait. = L. incarvillei. Pers. = Phajus grandiflorus. Lour. = Limodore de la Chine. s. ch. de 4 à 6 f. Methonica superba. Juss. = Gloriosa superba. L. = Superbe du Malabar. S. S. ch.

Musa coccinea? Andrews. = Bananier écarlate. S. ch. 10 à 30 f.

— Paradisiaca. L. = Bananier commun. = B. cultivé. = B. de Paradis. = Figuier d'Adam. = Culotte du père Adam. = Plantain. = Platanier. S. ch. de 8 à 15 f. - Sapientum? L. == Bananier des sages. = Figue banane. de 9 à 18 f. S. ch. Narcissus bicolor. L. = N. sylvestris. b. Lam. = Narcisse bicolore. de 40 à 60 c. pl. t. Bistorus. Curtis. = Narcisse bistore. pl. t. - Bulbocodium. L. = Narcisse bulbocode. = = Trompette de méduse. pl. t. de 20 à 50 c. Dubius. Gouan. = N. compressus. Haw. = N. pallidus. Lam. de 20 à 50 c. pl. t. Gonani. Roth. = N. odorus. Gouan. = = N. incomparabilis. Curt. = Narcisse de Gouan. = N. nonpareil. pl. t. de z à 3 f. la douz. b. Flore pleno. pl. t. de 3 å 4 f. la douz.

Intermedius. Lois. Narcisse intermediaire. pl. t. 25 à 50 c. nquilla. L. = N. jonquille. pl. t. de 2 à 10 f. le %]. b. Flore pleno. == jonquille double. pl. t. 15 à 30 f. le %]. - Junquilla. L. = N. jonquille. pl. t. Nivœus. Lois = Narcisse blanc de neige. pl. t. de 50 à 75 c. - Ochroleucus. Lois. = Narcisse jaune blanc. pl. t. 50 à 60 c. - Odorus. L. = N. lobatus. Lam. = Narcisse odorant. == grande jonquille. de 2 à 3 f. la douz. de 50 à 75 c. Narcisse des Patulus. Lois. pl. t. - Poeticus. L. = N. angustifolius. Curtis. poëtes. = Jannette. = Genette. pl. t. de 2 à 4 f. la douz. b. Flore pleno. = Narcisse des poètes d fleurs doubles. — Polyanthos. Lois. = Narcisse multiflore. = N. tout blanc. pl. t. de 3 à 5 f. la dour.

- Pseudo-narcissus. L. Narcisse faux narcisse. N. sauvage. = N. des près. = Porillon. = Aiault. = fleurs de coucou. pl. t. b. Flore pleno. pl. t. de 2 à 4 la douz.

Tezeta. L. = N. multiflorus. Lam. = Nercisse tazette. de 5 à 30 f. la % (Plusieurs varietés.) pl. t. b. Aureus. — Narcisse jaune d'or. prov. pl. t. 10 à 15 f. le %. Neottia spiralis. Sw. — Ophris spiralis. L. pl. t. 40 c. Nyetago dichotoma. D C. — (Mirabilis. L.) — Belle de nuit. pl. t.

Jalapæ. D.C. = N. hortensis. Dum. Cours. = Mirabilis. L. pl. t. Nyetago longiflora. D C. = (Mirabilis, L.) = M. mexicana. Hern. == Admirable du Pérou. * de 40 à 60 c.

de 1 à 2 f. | Ophris insectifera. L. = Ophris insecte. pl. t. de 20 à 40 c. b. Muscifera. Hud. - O. myodes. Jacq. = = 0. mouche. de 20 à 40 E. c. Apifera. Sm. = Ophris abeille. pl. t. de 20 à 40 c. Orchis maculata. L. = Orquis male. pl. t. de 20 à 30 c. - Morio. L. = Orquis bouffon. pl. t. de 20 à 50 c. - Robertiana. Lois. = Orquis de Robert. pl. t. de 1 à 2 f. Ornithogalum arabicum. L. = Ornithogale d' Arabie. pl. t. 50 c. à 1 f. Caudatum? Ait. = Ornith. à queue. or. 1 f. Longibracteatum. Jacq. = Ornith. à longues bractées or. 1 à 2 f. Luteum, L. = O. pratense. Pers. = Gangea lutea. Curtis. — Ornith. jaune. pl. t. 25 c. Narbonnese. L. — Ornith. de Narbonne. pl. t. de 50 75 c. Nutans. L. = Ornith. d fleurs penchées. pl. t. de 50 à 75 c. Pyrenaicum. L. = Ornith. des Pyrenées. pl. t. de 50 à 75 c. Umbellatum. L. = Ornith. ombellifere. = Dame de 11 heures. pl. t. Oxalis cernua. Thunb. = Oxalide peuchée. or. b. Maculata. D.C. or. de 20 à 50 c. c. Expansa. DC. or. - Mutabilis. DC. == Oxalide changeante. or. de so c. à I f. a. Purpurea. Jacq. = O. speciosa? Willd. = Oxalide pourpre. or.
b. Alba. D.C. = Ox. à fleurs blanches. or. Polyphylla. Jacq. = Ox. polyphylle. or. Rubella. Jacq. = Oxalide rouge. or. de So c. a r f. - Rubella, Jacq. = de 50 c. à 1 f. de 50 c. à 1 f. b Lilacina. DC. or. Tetraphylla. Cav. = Oxalide à 4 folioles. pl. t. de 50 c. à 1 f. – Variabilis. Jacq. == Oxalide variable. or. dé 1 à 2 f. Pœonia. (vide pag. 32) Paneratium illyricum. L. = P. stellare. Salisb. = Pancrais d'Illyrie. pl. t. de 1 a 3 i.

Maritimum. L. = P. verecundum? Ait = Paucrais maritime. Phormium tenax. Forster. = Chlamydia tenacissima. Gart. = 1.achenalia ramosa. Lam. = Lin de la nouvelle Zelande * 2 à 4 f. Polianthes tuberosa. L. = Tuberense des jardins. * b. Flore multiplici. — Tubéreuse à fleurs multiples. —
Tubéreuse quadruple, vulg. * de 3 à 4 f. la douz.
Ranunculus asiaticus. L. — Renoncule des jardins. pl. t. 4 à 20 f. 10 Var. à fleurs doubles ou semi doubles de toutes couleurs: pl. t. de 4 à 20 f. le of. Satyrion hircinum. L. — Orchis hircina. Sw. — Satyrion bouquin. pl. t.
Sanseviera guinensis. Willd. = S. thyrsiflora? Thunb. = Aletris

Sanseviera de Guinte. or. de 2 à 3 f. guinensis. Jacq. = Sanseviera de Guinée. or. de 2 à 3 f. Zeylanica. Willd. = S. Æthiopica? Thunb. = Aletris = Aletris chinensis. Jacq. = A. hyacinthoïdes, L. = Liriope spicat 1. Lour. = Salmes spicats. Cav. or.
Scilla amoena. L. = Scille agréable. pl. t. de 3 à 5 f. 25 C. - Campanulata. Ait. = S. hyacinthoïdes. Jacq. = S. hispanica. Mill. pl. t. de 25 à 50 c. Hyacinthoides. L. = Scille jacinthe pl. t. - Maritima L. = Ornithogalum scilla. Curtis. = O. maritimum. Lam. = Scille maritime. = S. marine. pl. t. de 1 & 3 f. Peruviana. L. = Scille du Pérou. pl. t. de 25 à 75 c. b. Alba. = Scille d steurs blanches, pl. t. de 50 c. a 1 f. Serapias latifolia. L. = Epipactis latifolia. Willd. pl. t. 50 c. Tigridia pavonia. Desf. = Ferraria pavonia. L. = Tigride à grandes fleurs. * de razf. Tulipa celsiana. DC. = Tulipe de cels. pl. t. de 25 à 50 c. - Clusiana. D C. = Tulipe de Perse. = Tulipe de l'Ecluse. de 20 i 30 c. Gesneriana. L = Tulipe des jardins. b. Acutiflora. = Tulipe à pétales aigus. c. Flore pleno. = Tulipe à fleur double. Nombreuses varie-tés. de 1 f. pièce tés. de 1 f. pièce d. Precox. = Tulipe hative. à 5 f. le % e. Monstrosa. = Tulipe dragone. Oculus-solis. Saint. Am. = T. agenensis. D.C. = Tulipe

Digitized by Google

œuil de Soleil. pl. t. de 25 à 50 c. Suaveolens. Roth. = Tulipe odorante. = Duc de thol. pl. t.

— Sylvestris. L. = Tulipe sauvage. pl. t. de 5 à 10 f. le 10 Veltheimia capensis. = V. viridiflora, Willd. = Aletris capensis.

L. = Veltheimia du Cap. or.

de 15 à 25 f. le %

Tulipa

GRAINES DE PLANTES D'ORNEMENT.

🛎 et 🗗


```
ADORIS annua, Gouan. = A. Estivalis. B. = Adonide annuelle.
                                                                                Cosmos bipinnatus. Cav. - Cosmen. Willd. - Cosmos bipinne.
b. Miniata. Jacq. = Adonide écarlate.

Agrostemma cœlirosa. L. = Lychnis cœlirosa. Lam. = Coque-
                                                                                a. Purpureus.
b. Pallidus.

Var. d. fleurs ponteau.
d. fleurs rose-pale.

Cucumis acutangulus. L. = Concombre d angles tranchants.
        lourde caryophyllee.
Alyssum clypeatum. L. = Draba clypeata. Lam. = Lunaria.

Tournef. = Alysse à fruit de lunaire.
                                                                                 Cucurbita melopepo. Li = Courge melopepon. ( Poyez fruits legu-
                                                                                                  miers.)
                                                                                           b. Aurantiiformis. Var. sen forme d'orange. en forme de poire.
Amaranthus candatus. L. = Amaranthe d queue. = Cordon d'Éve-
        que. vulg.
                                                                                 Cuphea viscosissima. Jacq. = Lythrum cuphea. L. = Cuphee
     Lividus. L. = Amaranthe livide.
   - Tricolor. L. = Amaranthe tricolore.
                                                                                        visqueuse.
Argemone mexicana. L. = Argemone du Mexique. = Pavot
                                                                                 Datura ceratocaula. Jacq. = D. stucro-cellis. Roth. = Stramoine
                                                                                        cornue.
        épineux.
                                                                                    - Fastuosa. L. = Stramoine fasturuse.
Aster chinensis. L. = Aster de la Chine. = Reine marguerite.
                                                                                           a. Purpurea.
                                                                                                                      Var. d fleurs violettes.
            Flore albo pleno.
                                                d fleur bleue double.
                                                                                           b. Flavo - albicans.
           Flore purpureo pleno:
                                                d fleur pourpre double.
                                                                                      Ferox. L. - Stramoine feroce.
           Flore roseo pleno.
                                                à fleur rose double.
                                                                                     I.ovis. L. = Stramoine lisse.
Metel. L. = Stramoine velue.
                                               d fleur bleue double.
           Flore cœruleo pleno.
                                               à fleur violette double
           Flore violaceo pleno.
                                                                                   - Stramonium. L. - Stramoine commune.
        Flore variegato pleno.

b. Pavislora. — Keine
                                                à fleur panachée double.
                                                                                    – Tatula. L. == Stramoine à fleurs violettes:
                                                                                 Delphinium ajacis. L. == Pied
                                                à petit disque.
             marguerite pompon.
                                                                                            d'alouette des jurdins.
                                                                                                                                à fleurs doubles.
                                                                                                                         Var. {
Blitum capitatum. L. = Blètte éffilée.

— Virgatum. L. = Epinard fraise
                                                                                         b. Pyramidata. = Pied
                                                                                                                                de plusieurs couleurs.
                                                                                            d'alouette julienne.
Brassica oleracea variegata. = B. sabellica tricolor. = Chou
                                                                                    - Consolida. L. = Duuphinelle des blés. = Pied d'aloueste
              panaché. = Chou tricolore.
b. Prolifera. = Chou prolifere panaché de rouge.
                                                                                         sauvage.
                                                                                      Staphys gria. L. = Staphysaigre. = Herbe aux poux.
              c. Pennata. = Chou plume.
d. Quercifolia. = Chou d feuilles de chêne.
                                                                                 Dipsacus laciniatus. L. == Cardere laciniee.
                                                                                 Dolichos lablab. L. . Dolic d'Egypte.
                                                                                    - Purpureus. L. Dolic pourpre.
- Sexquipedalis. L. Dolic du Japon.
              e. Cabousta. = Chou frangé du nord. = C. de
Sibérie, = C. en arbre.
Briza media. L. 

B. tremula 

Brize tramblaste.

Cacalia sonchifolia. L. 

C. coccinea. Curtis.

Calendula officinalis. L. 

Souci des jardins.
                                                                                    - Soja. L. = Dolic velu.
                                                                                Echium plantagineum. L. — Vipérine à feuilles de plantain.

— Pyrenaicum. L. — Vipérine des pyrendes.

b. Itslicum. L. — Vipérine d'Italie.
         b. Flore aureo. = Souci orangé.
         c. Flore luteo. = Souci annemone. = Souci de la Reine.
                                                                                 Fuphrasia lutea. L. = Euphraise jaune.
— Pluvialis. L. — Souci pluvial. — S. hydrométre.

Campanula speculum. L. — Prismatocarpus speculum. l'Hérit.

Cardiospermum halicacabum. L. — Corinde glabre. — Lanterne
                                                                                 Fumaria spicata. L. = Fumeterre à épis.
                                                                                Gaura hiennis. L. = Gaura bisannuel.

Gomphrena globosa. L. = Amarantine globuleuse.

a. Rubra.
b. Alba.

Var. d fleurs rouge. = Immortelle rouge.

b. Alba.

Immortelle blanche.
        de Panurge.
 Caucalis grandiflora. L. = Caucalide à grandes fleurs:
                                                                                 Gypsophila elegans. Hort. Nois. = Gypsophile élégante.
Celosia coccinea. L. = Passe velours écarlate.
                                                                                 Helianthus annuis. L. # Helianthe à grandes fleurs. = Soleil.
    - Cristata. L. = Passe velours à crête. = Crête de coq.
         b. Lutea. = Passe velours jaune.
 Celsia arturus. L. = Celsie A longs pédoncules.
                                                                                 Hesperis maritima. Lam. = Cheiranthus maritimus. L. = Girofflee.
                                                                                = Gazon de Mahon. = Julienne maritime.

Hibiscus cannabinus. L. = Ketmie d feuilles de chanvre.

Trionum. L. = Ketmie trifolite.
 Centaurea moschata. L. = Amberboa moschata. Pers. = Cen-
        taurée musquée. == Ambrette.
 Cheiranthus annuus. L. = Hesperis ztiva. Lam. = Giroffice
                                                                                 Hippocrepis multisiliqosa. L. = Hippocrepis d plusieurs gousses. Iberis umbellata. L. = Iberide de crête. = Thlaspi des jardiniers.
 annuelle. (vide pag. 31)

Chelidonium corniculatum. L. — Glaucium phæniceum. Smith. —
                                                                                 b. Flore albo. = Var. d fleur blanche.
Impatiens balsamina. L. = Balsamine des jardins. ( Nombreuses
        Chelidoine à fleurs rouges.
      Glaucium. L. = Glaucium luteum. Smith. = Pavot cornu.
 Chenopodium scoparia. L. = La belvédère
                                                                                         varietés à fleurs doubles et de couleurs variées et panachées.
 Chironia centaurium. Willd. = Chironie d fleurs rouges. = Petite
                                                                                 Jpomœa coccinea. L. = Jpomæa écarlate. = Jasmin d'Amérique.
        centaurée. vulg.
                                                                                           b. Luteola. Jacq. = J. angulata? Orteg. = Liseron
 Chrysanthemum carinatum. Schousb. = C. tricolor. Andrews. =
         Chrysanthéme carené.
                                                                                                 jaune. S.
                                                                                    - Pillosa? Cav. = Convolvulus pentaphyllus? L. S.
      Coronarium. L. = Chrysantheme des jardins. ( d fleurs
blanches et sleurs orangées.)
Cleome viscosa. L. = Mozambé visqueuse.
Coix lacrima jobi. L. = Lithagrostis, Gart. = Larmile des Indes.
                                                                                 - Purpurea. Lam. = Convolvulus purpureus. L. S.
                                                                                                            Var. d fleurs violettes. S.
                                                                                           b. Violacea.
                                                                                           c. Rosea.
            = Larme de Job.
                                                                                           d. Discolor.
                                                                                                                  d fleurs raybes. S.
 Convolvulus tricolor. L. = Liseron tricolore. = Belle de jour.
```

Jpomœs quamoclit. L. == Convolvulus pennatus. Lam. § OEnothers tetrapters. Cav. = OE. candids. Dum. Court. == Triloba. L. = Quamoclit à trois lobes.

Lathyrus odoratus. L. = Gesse odorante. = Pois de senteur. §. Onagre blanche. Papaver thœas L. = Coquelicot à fleurs doubles variées en couleurs.

— Somniferum. L. = Pavot à fleurs doubles de toutes couleurs. a. Purpureo-violacea. Var. d fleurs violettes. S. b. Albo-rosea. et mélangées. Lopezia racemosa. Cav. = L. mexicana. Jacq. = Lopégie à Parthenium histerophorus. L .= Parthénium lacinié. Phaseolus multiflorus. Lam. = P. coccinens. Ait. = Haricot d'Espagne. = H. écarlate. S. b. Albus. = Haricot multiflore à fleurs blanches. Lotus tetragonolobus. L. = Lotier rouge. = Pois café?
Lunaria annua. L. = L. bisannua. Dum. Cours. = Bulbonach. - Semierectus. L. = Haricot à fleurs pourpres. = Médaille. = Satin blanc. Lupinus hirsutus. L. = Lupin velu. — Luteus. L. = Lupin jaune. Polygonum orientale. L. = Renouée du levant. = Grande persicaire. Varius. L. == L. semiverticillatus. Lam. == Lupin varie.
b. Coeruleus. Vac \ grand bleu. Rezeda odorata L. == Rézeda odorant Var. grand bleu. Scabiosa atropurpurea. L. = Scabieuse des jardins. = fleur c. Roseus. de veuve. Martynia annua. L. = M. alternifolia. Lam. = M. proboscidea. b. Flore rubro. = Scabieuse à fleurs rouges. Glox. = M. louisiana? Mill. = Martynia de vera-crux. - Stellata. L. = Scabieuse étoilée. = Cornaret. Silene armeria. L. = Silène fasciculée. = Atrape-mouche. Medicago elegans. = Lugerne élégante.

Mesembrianthemum chrystalinum. L. = Ficolde cristalin. = Bipartita. Desf. = Silene divise. - Quinquevulnera. L. = Silène panaché. Glaciale, vulg.

Molucella lœvis. L. = Molucelle lisse. Solanum ovigerum. Dun. = Melongena ovata Mill. = Plante à œuf. Momordica balsamina. L = Pomme de merveille. S. Stewia pedata. Cav. = Ageratum pedatum. Orteg. — Charantia. L. — Momordique de feuilles de vigne. S. — Elaterium. L. — Momordique piquante. — Giclet. — Concombre sauvage. — C. d'âne. — C. d'attrape.

Myosotis annua. Manch. — Oreille-de-rat à fleur bleue. Tagetes erecta. L. = Tagette droite. = Okillet d'Inde. b. Crocea.

Var. d fleurs doubles orangées.

c. Sulfurea.

Var. d fleurs jaune-pâle. - Patula. L. = Tagette étalée. = Passe-velours. Prov. b. Crocea. (jaune Ricandra physalodes. Adans. — Atropa physaloides. L.

Nigella damascena. L. — Nielle bleue. — Patte d'araignée.

— Orientalis L. — Nielle du levant. Var. { jaune Var. { ponceau. panachée. c. Coccinea.
d. Variegata. Tropocolum majus. L. = Capucine d grandes fleurs. Nolana prostrata. L. = Walkeria. Ehret. = Zwingera. Act. helv. b. Hybridum. = Capucine hybride. Verbascum. L. (Plusieurs espèces.) = Neudorssia peruviana. Adans. == Terganium procumbens. Smith: Verbena aubletia. Air. = Buchnera canadensis. L. Viola tricolor. L. = Pensée. Ocymum basilicum. L. = Basilic commun. b. Nigrum. DC.
c. Valentinum. DC. Var. d feuilles moyennes. d feuilles pourpres. b. Grandistora.
c. Luteo-variegata.

Var. de grandes sleurs tricolores.
de fleurs jaunes panachéese

Immortelle annuelle. c. Valentinum. DC. Var.) à feuilles moyennes.
d. Atropurpureum. DC. l'à feuilles pourpres.

— Bullatum. Lam. = Basilic à feuilles bullées.
— Minimum. L. = Basilic à petites feuilles. = B. fin.
— Monachorum. Hortul. = Basilic des moines.
— Thyrsiforum? Murr. = Basilic à odeur de rue. Acranthemum annuum. L. = Immorteite annuesse.

a. Alba. Var. { d fleurs blanches.
b. Purpurea. { d fleurs pourpres. }
Zinnia elegans. Jacq. = Z. violacea. Cav. = Zinnia élégantes.

— Multiflora. Cav. = Z. multiflore.

— Pauciflora. L. = Z. lutea. Gart. = Zinnia pauciflore. OEnothera biennis. L. = Onagre commune = Herbe aux ânes.

— Grandiflora. Ait. = Onagre d grandes fleurs.

— I ongiflora. 5. = Onagre longiflore. - Tenuislora. Jacq. = Z. revoluta. Cav. = Zinnia roulee. - Simuata. Mich. == Onagre simuée.

Nota: Presque toutes les graines de plantes d'ornement se vendent au détail par paquets de 50 à 75 centimes.

GRAINES DE PLANTES ECONOMIQUES.

1°. LES CÉRÉALES.

b. Mutica. = Avoine sans barbe. Hordeum distichum. L. = Orge à deux rangs. = O. pamelle. = 0. Baillard.

AVENA sativa. L. = Avoine cultivée.

b. Nudum. = Orge nue. = 0. mondee. = 0. bleue. id. zestivum. = Orge nue d'été. id. sibiricum? = Orge nue de Sibérie.

- Hexastichum. L. = H. polystichum. = Orge d six côtes. = Orge d six rangs. = O. escourgeon. = O. sucrion. = Orge d'hiver. = O. hexagóne.

Hordeum vulgare. L. = Orge commune.

b. Nanus. = H. precox. = Orge naine.
c. Serotinum. = Orge eardive. = O. soumoule. Prov.

d. Nigrum. — Orge noire d'Amérique.
e. Celeste. — Orge celeste. — O. nue:
id. Microsperma. — H. membranacenm.

f. Tortile. Hort. Tel. = Orge à épis contournés.

- Zeocritum. L. = Orge faux-riz. = Faux riz de montagne. = Orge éventail.

Mays zen. Gart. = Zen mays. L. = Mals cultivé. = Ble d'Inde. B. de Turquie (varietés à semences blanches, jaunes, dorées, bleues, violettes, pourpres, ardoisées, panachées. etc.)
b. Microstachya, D.C. = Zea precox. = Mais quarantin. Oryza sativa. L. = Rip cultiwe.
b. Mutica. = Rip sans barbe.
Panicum italicum. L. = Panis d'Italie. = Millet. Milliaceum, L. == Millet commun. Pennisetum thyphoideum. Pers. - Holcus spicatus, L. - Penicillaria spicata? Willd. Polygonum fagopyrum. L. = Sarrazin. = Blt noir. = Bucail. Tartaricum. L. = Sarrazin de tartarie. Secale cereale. = Seigle cultivé. Sorghum nigricans. Hortul. = Sorgho à graines noirâtres. Rubens. Willd. — Sorgho rougeatre.

Vulgare. Willd. — Holcus sorghum. L. — Gros millet. —
Millet d balais. Triticum monococcum. L. = Froment locular. = Petit épautre, = Engrain. - Polonicum. L. = Froment de Pologne. = Seigle de Pologne, vulg.

Triticum sativum. Lam. = Proment cultivs. = Ble. Seisette de Provence. id. rousse. id. noire. Ble paulard. b. Touzelle. = Froment touzelle. Var. \{ d tige rouge.

Var. \{ blanche de pertuis. = Froment de Provence.

Blé blancrée.

c. Compositum. = Blé de miracles. = Froment d épis. rameux. = Ble de Smyrne. d. Hybernum. = Ble tamuas. = B. Anglais. = B. d'Ardennes. = Chicot-rouge. = Blé rouge de Saint-Pierre. e. OEstivum. = T. siculum. = Blé de Sicile, = Blé de printems. = Blé de trois mois.

Se le rouge. = Blé de Sicile rouge.

Var. Blé barbe noire.

Blé de Tangarok. f. Turgidum. L. = Blé velu à barbes. = Pésanielle,

d épis blancs. = Gros blé blanc. Var. d épis gris. = Blé de Barbarie. d épis rouge. = Blé rouge velu. Spelta. L. = Froment épautre.

LES PLANTES POTAGÈRES.

RACINES NOURRISSANTES.

ALLIUM ascalonicum. L. = Echalo e. - Cepa. L. = Cepa vulgaris. Tournef. = Oignon. = Cébou. Prov. rouge de Montfrin. au % rouge fonce. rouge pale. id. blanc. id. id. petit de Florence. b. Pyriformis. = Oignon pyriforme. Var. \{\} Oignon de Bellegarde. = 0. d'Espagne? Oignon jaune. = 0. paille. e. Vivipara. Walt. = Oignon d'Egypte. = Oignon de Wurtemberg. = O. bulbifère. = O. prolifère. Nigrum. L. = Monspessulanum. Gouan. = = A. multibulbosum. Jacq. = A. magicum. L. = Gros. ail. Porrum. L. = Poirreau. b. Major. = Poirreau grosse espèce. Sativum. L. = Ail cultivé. Schoenoprasum. L. = Ail civette. Scorodoprasum. L. = Ail rocambolle. Apium dulce tuberosum. = Céleri navet. == Céleri à grosses racines. au % - Petroselinum tuberosum. = Persil à grosses racines. Beta cicla. L. = Betterave. au % b. Alba. Betterave. blanche longue. id. jaune longue. c. Lutea. id. id. courte de Castelnaudary. d. Sanguinea. id. rouge longue.
id. de Castelnaudary. id. e. Precox. id. id. ronde hative. f. Exterts. Thouin, id. racine de Disette. = B. champêtre. Helianthus tuberosus. L. = Topinambour. = Poire-de-terre.

Brassica ol. gongylodes. Desf. == Chou rave. a. Alba. = Chou - rave blanc. = Chou de Siame id. Precox. = Chou - rave blanc hatif. b. Violacea. = Chou-rave violet. c. Crispa. == Chou-rave frist de Naples. Rapa. L. = Sinapis tuberosa, Lam. = Chou turneps. = Rabioule. Napus, L. = Navet. de Belleville. blanc rond. de Freneuse. jaune rond de Hollande. long de campagne. = Gros navet de Berlin. long gris de Proyence, au % au % noir. Napo-brassica. = Chou navet blanc. b. Rutabaga. = B. napus hybrida. = Navet de Suède. = Rutabaga.
c. Rubra. = Chou navet rouge. Bunium bulbocastanum, L. = Terre-noise bulbeuse. = Noix de terre. Campanula rapunculus. L. = Raiponse des jardins. Convolvulus batatas. L. = Patate d'Amérique. Cyperus esculentus. L. = Souchet comestible. Dancus carota L. = Carotte cultivée. = Pastenade. jaune longue. id. courte, rouge longue, id. courte. blanche, violette. etc. Lathyrus tuberosus. L. = Gesse tubereuse. = Macuson.

HERBAGES LEGUMIERS.

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FEUILLES.


```
APIUM graveolens. L. == Céleri.
                                                                         Brassica ol. d. Viridis.
                                                                                                     Chou frange. = C. frise d'Allemanne.
                                                               211 º/o
                                   Céleri creux:
                                                                                                       Chou à rejets du Brabant. == Spruitjes.
                                                                                       e. Perennis. Thouin. = Chou vivace de Daubenton.
                                  Celeri à couper. = Petit celeri.
       b. Dulce Mill.
                           Var. Celeri plein blanc.
                                                               au %
                                 Céleri rouge ou rose.
Céleri Ture ou de Prusse.
                                                                                      f. Selenisia. Chou de Touraine. = Chou pancalier.
Chou branchu. = C. mille-tétes de Poitou.
  - Petroselinum. L. = Persil commun.
       b. Crispum. = Persil frise.
                                                                                                     Chou de Bauvais grosse côte.
Asparagus officinalis. L. = A. sativus. = Asperge commune.
                                                                                                     Chou vert à larges côtes.
                                                                                                    Chou blond à larges côtes.
             Asperge cultivée.
          b. Albus.
                                  Var. blanche de Hollande.
         c. Amethystimus. d. Viridis.
                                                                                    Choux fleurs et brocolis. ( Voyez Fleurs legumières. )
                                                                         Nota: Plusieurs sortes de choux aux plantes fourragères es quelques-unes aux graines de plantes a'ornement.

Beta vulgaris. L = B. hortensis. Mill. = Poirée. = Bette,
                                        verte d'Ulm.
Atriplex hortensis. L. = Arroche-bonne-dame. = Folette.
         a. Rosea. = Arroche rouge.
Brassica oleracea. L. = Chou commun.
        b. Capitata. = Chou pommė. = Chou pomme.
                                                                                                 à couper verte.
                        petit cabage. (Precox. cabus du Puis-de-Dôme. cabus d'Uzès.
                                                                                      Varietés. d couper blonde. d carde blanche. à carde blonde.
                                           ( Precox. )
                         blanc d'Alsaces
                                                                                               d carde verte.
                         d'Yorck.
                        tardif d'Allemagne. = Chou quintal.
                                                                          Chenopodium bonus henricus. L. = Bon henri. = Epinard
                        de Saint Denis. = Chou d'Aubervilliers:
                                                                                 sauvage.
                        royal håtif.
                                                                         Crambe maritima: L. = Chou marin.
                         americain hatif.
                                                                          Crithmum maritimum. L. = Perce-pierre. = Bacille maritime.
                         cour de bouf.
                                                                                = Fenouil marin
                         blanc hatif de bonneuil.
                                                                          Cynara cardunculus. L. = Cordon d'Espagne. = Carde.
                        de battersea hatif.
                                                                                                      Var. Epineux.
Incrme.
Ploin incrme.
                        pain de sucre. (Pyramidalis.)
                                                                                     a. Spinosa.
                 Var. { rouge d'Allemagne.
     c. Rubra.
                                                                                     b. Inermis.
                        petit rouge d'Utrecht.
blanc de Hollande.
                                                                                         id. plena.
                         de Brounswich.
                                                                             Laitues et chicorées à cuire.' (Voyeg La serie des salades.)
                                                                         Portulaca oleracea. L. = Pourpier des jardins.
                       des vertus.
       e. Sabellica. = B. sabauda. = Chou pomme frise. =
                                                                                   b. Aurea. = Pourpie dore.
              Chou de Milan.
                                                                         Rumex acetesa. L. - Oseille commune.
                     milan d'été.
                                                                            - Montams. H. P. = R. arifolius. Allioni. = Oseille Vierge.
                     milan petit batif.
                                                                             - Scutatus. L. = Oscille à écusson.
                     milan dore. = Chou de Savoie:
                                                                            - Tuherosus L. = Oseille ronde.
                     milan trapu. — Chou frisé court.
milan tête longue. — Chou frisé tête longue.
                                                                         Spinacia oleracea. L. = Epinard potager.
b. Lœvis. H. P. Epinard rond. = Epinard de Hollande.
                     frise d'Allemagne tardif.
                                                                                     Id. Latifolia. = Var. à larges feuilles.
                     frise de Saint Denis. = Milan d'automne.
                     milan tardif.
                                                       au 10
                     milan moyen.
                                                        au %
                     milan gros.
                     chou frist du mans.
```

FLEURS LEGUMIÈRES.

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FLEURS.

BRASSICA eleracea botrytis. = Chou-fleur.

dur d'Angleterre.

de Hollande.

de Malte.

mi-dur de Paris.

b. Brocolis. = Chou-brocoli.

blanc.
cendré.
tardif.
vert ou commun.
violet ou de Malte.
id. très hâtif.

Cynara scolymus. z. = Artichaut.

b. Viridis.
c. Inermis.
d. Rubra.
Violacea:

Var. le blanc.
le rouge.
le violet.

Nota: On mange aussi les fleurs des varietés, de la capucine commune que je placerai page 43 aux fournitures de salades.

FRUITS LEGUMIERS.

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FRUITS.

CAPSICUM annum. L. = Piment annuel. = Grossum. L. = Piment à fruit en caur. b. Cydoniforme. = Piment doux. = Poivron d'Espagne. Longum. DC. = Piment allongé. = Corail des jardins. Cucumis melo: L. = Melon. = Concombre réticulé. a. Saccharinus. = Melon brode. (Plusieurs varietes.) Melon de Cavaillon. = Melon cantalou. (Plusieurs varietés.) = Melon vert. == M. de Morée. == b. Cantalou. c. Viridis. M. de Candie. = M. de Malte. = M. d'hiver. Flexuosus L. == Concombre serpent. - Sativus. L. == Concombre commun. blanc. Var.) blanc hatif. jaune. b. Minor. H. P. (à cornichous. Encurbita citrullus. L. = Pasteque. = Citre. Prov. b. Sativus. == Melon d'eau. Leucantha. Duch. = Courge à fleurs blanches. b. Lagenaria. H. P. (Cougourde. H. P. c. Latior. Gourde. d. Pyrotecha. H. P. c. Longa. H. P. Poire à poudre. c. Longa. Calebasse. b. Verrucosus. H. P. Tu Tuberculeux. c. Aurantiiformis. H. P. Orange. d. Pyriformis. H. P. Var. < Pyriforme. e. Clypeatus. H. P. Bonnet d'electeur. == Patisson. - Pepo. L. == Courge potiron. = 📤 Citrouille. . b. Viridis. H. P. § vert commun. gros vert de Barbarie de deux quintaux. c. Luteus. H. P. | jaune rond. | Courge musquée. Fragaria ananassa. Duch = F. grandiflora. Ehr. = Fraisior ananas = Quoimio de Harlem. Chiloensis. Ehr. = Fraisier du Chili. = Frutiller. - Sylvestris. Duch. = Fraisier des bois. = F. commun.

Fragaria. b. Abortiva. Duch. == Fraisier coucou. == Breslinguecoucou. c. Bifera. Duch. = F. coesalpini. = Fraisier de Bargemon. = Majaufe. de Provence. d. Calyculata. Duch. = Fraisier de bath. = Quoimie de Bath. e. Dubia. Duch. = Fraisier vineux. = Majaufe de champagne. f. Efflagellis. Duch. = Fraisier buisson. = F. sans courant. g. Hortensis. Duch. = Fraisier fressant. = F. de Montreuil. = Caperon. vulg.

h Minor. Duch. = Fraisier d'Angleserre. F. d chassis.

i. Monophylla. Duch. - Praisier de Versailles. = F. d. feuilles simples. j. Moschata. Duch. = F. pratensis. = F. elatior. Willd. = Fraisier de Bruxelles. = Caperonnier royal. k. Moschata dioica. Duch. = Faisier abricot. = F. framboise. = Caperonnier uni-sexuel. l. Nigra. Duch. = Fraisier breslingue. = Breslingue d'Allemagne. m. Semperstorens. Duch. = Fraisier des Alpes. = F. des mois. = F. perpetuel. Id. Alba. = Fraisier perpetuel d fruit blanc. n. Viridis. Duch. = Fraisier vert. = Breslingue d'Angleterre. o. Vulgaris flore semi - pleno. Duch. = Fraisier double = F. couronné. = F. Trochet. p: Carolinensis. Duch. = Fraisier de Caroline. = Quoimio de Caroline. q. Virginiana. l'Hérit. = Fraisier écarlate. = Quoimio de Virginie. Hibiscus esculentus L. = H. fiscifolius. Mill. = Ketmie gombaud. Lycopersicum cerasiforme. Dun. — Solanum pseudo - lycopersicum.

Jacq. — S. spurium. Gm. — Tomate ronde.

— Esculentum. Mill. — Solanum lycopersicum. L. — Pomme d'amour. = Tomate. Humboltii. Dun. = Solanum kumboltii. Willd. = Petite tomatte roude.

Lycopersicum pyriforme, Dun. Solanum pomiferum. Cav. —

Tomatte - poire.

Physalis edulis. Cyr. — P. pubescens. — P. Barbadensis? —

alis edulis. Cyr. = P. pubescens. = P. Barbadensis? = Kinkingari. Ital. = Alkekenge. = Coqueret. = Groseille du Chili, vulg.

Solanum esculentum. Dun. = S. melongens. L. = Melongène.

— Aubergine. = Viedaze. Lang.
a. Oblongs. = Aubergine longue violette.
b. Rotunda, = Aubergine ronde violette.

Trape nataus. L. = Macre flotante. = Chataigne d'eau.

SEMENCES LEGUMIÈRES:

QU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES GRAINES.

Haricot coco barriole à cosses rouges, CICER arietinum. L. Pois ciches. P. pointu. Sere. Phaseolus vulgaris. Haricot nankin rond pále. Haricot bicolor ovale. Dolichos sinensis. L. = Dolic de la Chine. = Haricot escloupet. Lang. Haricot bicolor rend. Ervum lens. L. = Lentille. = Ers. Haricot coco rose. (d la reine. = Lentille grise. Haricot gros coco violet. Haricot gros coco rouge. Haricot Sophie. id. rougeatre. id. de Soisson. = Lentille large blonde. Fava vulgaris. Manch. - Vicia faba L. - Fève cultivée. -Harisot bleu. Haricot barraquet raye F. des jardins. Haricot nankin påle. b. Minor. = Fève julienne. b. Millot. = Feve juitenne.
c. Major. H. P. = Feve de marais. = F. Picarde.
d. Viridis. H. P. = Fève verte.
e. Nana. = Fève naine d'Angleterre,
f. Longissiliqua. = Fève à longues cosses. Haricot jaune. Haricot couleur de chair. Incarnatus. Abyssinicus. Haricot d'abyssinie. Aureus. Hort. Monsp. Haricot dore. = Jaune quarantain. B. Rotunda. = Fève de windsor.
h. Equina, = F. minor. H. P. = Fève des champs. == Haricot de la Cochinchine. Haricot nain biche. Lathyrus sativus. L. = Gesse cultivée. = Lentille d'Espagne. Haricot blanc hatif de Hollande. Haricot quarantain blanc. Haricot rond blanc. Phaseolus. L. = Haricot. Varietés à graines elliptiques, reniformes, un peu applaties Haricot riz. Haricot coco blanc nain. tiges grimpantes. Haricot ail de Perdrix. - Multiflorus. Willd. Dolichos coccineus. Lam. = Haricot rouge Pictactus. Balbis. Haricot peint. Haricot pois. Haricot exotique. d'Espagne. Subrotundus. Haricot blanc d'Espagne. - Exoticus. Ceratonoïdes. Balbis. Haricot sabre. Cylindricus ? D.C. Haricot cylindrique. Pisum sativum. L. = Pois cultivé. Vulgaris. L. Haricos de Soisson. Pois baron. Haricot rognon de coq. Haricot blanc commun. Pois carré blanc. Pois carré vert. Quadratum. } Haricot blanc à rames sans parchemin. Pois à cul noir. = Pois fève. Domingensis. Haricot de Saint Domingue. Pois clamart. = P. carré-fin. Pois dominé. Varietés à graines presque cylindrique, subreniforme Pois à longue cosses dit gouvigny. tiges non grimpantes. Pois marly. Pois michaut de Hollande, = P. de Haricot blanc de Picardie dit flageolet. Francfort. Haricot à fleurs verdâtres. Haricot Suisse gris. - Inamanus. Balbis. Pois michaut ordinaire. = P. quarantain. Haricot Suisse barriolé dit dent de vieille. Haricot Suisse rouge. Pois nain vert. Haicot Suisse panaché. Pois nain à bouquet .. Haricot Suisse rose. Humile. Pois nain sans parchemin. Haricot Suisse blanc. Pois nain de Barbentane. - Tridentatus. Haricot tridenté. Haricot jaune clair. Pois sans pareil. Varietés à graines ovales ou presque rondes sans échancrures. (Pois sans parchemin. Pois rouge sans parchemin. = P. ail de Perdrix. Excorticatum. Haricot rouge d'Orléans. Haricot rouge de Pragues. Haricot de sienne. Pois vert gros Normand. Vicia sativa alba = Vesce blanche. = Lennille du Canada. Haricot de sienne fonce. Haricot petit coco brun.

SALADES: LES

CICHORIUM intybus. L. = Chicorde sauvage. = Barbe de | Latuca capitata. Capucin. = Cheveux de paysan. vulg. b. Maculata. = Chicorée panachée. - Indivia. L. = Chicoree cultivee. = C. frisée. = Endive. vulg. b. Angustifolia. — Chicorée toujours blanche.
c. Italica. — Chicorée fine d'Italie. — C. d la régence
d. Latifolia. — Chicorée scarrolle. Hybrida. = Scarole blonde ou hybride. e. Crispa. = Chicorée. friste. au 10 Var. de Meaux. Brosse frisée. Lactuca sativa. L. = Laitue cultivée. au %.

a. Quercina. L. = Laitue à feuilles de chêne.
b. Capitata. = Laitue pommée. au %. Laitue bapaume. Laitue batavia. Brassicata Laitue batavia brune. = Laitue chou. Laitue de Berg-op-goon. Laitue de Berlin. Laitue cocasse. Laitue coquille. = L. d'hiver. Laitue crêpe. = L. petite noire. Crispa. Laitue dauphine. = L. de printemps. Sang. vari. Laitue flagellee. = L. sanguine. Laitue de Génes verte. Laitue george. Laitue Botte. = L. gau. Laitue grosse rouge.

Laitue de Hambourg.

Laitue de Hollande. = L. grosse brune. Germanica. Laitue impériale. = L. grosse Allemande. Italica. Laitue d'Italie. Laitue mousserone. Laitue palatine. Laitue paresseuse. Laitue passion d'hiver Laitue perpignane. = L. d grosses côtes. Laitue pomée rose. = Rougette. Prov. Regia. Laitue royale. Laitue sans pareille. Laitue Turque. Laitue de Versailles. Laitue. verte == L. hâtive de Pollande. Viridis. c. Longa. Thouin. = L. romana. H. P. = L. romaine. = Chicon. Macrophylla. Romaine alphange.
Romaine blanche. au 10 Romaine blonde. Obscura. Romaine grise ou brune. Romaine panachée.
Romaine rouge. Variegata. Rubra. Viridis. Romaine verte. 20 °10 Viridis. Willd. V. locusta. L. Pedia olitoria. Vahl. = Mache. = Doucette. = Blanchette. b. Italica. = Mache d'Italie. Nota: Les Salades auraient du se trouver avec les herbages legu-

miers, mais en raison de leur usage j'ai cru devoir en

faire un groupe particulier que j'ai placé à la fin des

FOURNITURES DE SALADES.

ALLIUM fissile. L. = Ciboule. - Schoenoprasum. L. = Civette. = Cive. = Ciboulette. = Appetit. Artemisia dracunculus. L. = Estragon. Brassica eruca. L. = Roquette cultivée.

Cardamine fontana. Lam. = Sisymbrium nasturtium. L. = Crésson de fontaine. — Hirsuta. L. = Cresson velu. Lepidium sauvum. L. = Thlaspi sativum. H. P. = Cresson alenois. = Nasitor. b. Latifolia. Var. d larges feuilles. c. Crispa.

Plantago coronopus. L. = Plantain corne de cerf. Poterium sanguisorba. L. = Petite pimprenelle .. Scandix cerefolium. L. = Cerfeuil cultive. - Crispum. L. == Cerfeuil crépu. Scorplurus echinata. Lam. = Chenille herissée..

Vermiculata. L = Chenille vermicule. Tropœolum majus. L. = Grande capucine. b. minus = Petite Capucine.

plantes potageres.

Nota: Le Pourpier ; l'Ail ; l'Oignon ; le Céleri; l'Échalotte etc. sont aussi employés pour fournitures de salades.

PLANTES AROMATIQUES.



ABETHUM dulce. DC. = Fenouil deux d'Italie. = F. de | Chenopodium botrys. L. = Anserine botride. Florence. au °10
Forniculum. L. = Fenouil usuel. Angelica archangelica. L. = Angélique. Ammi majus. L. = Ammi commun. Artemisia absinthium. L. = Absinthe commune. Chenopodium ambrosioides. L. = Ambroisie. = The du Mexique. | Hyssopus officinalis. L. = Hysope officinale.

Coriandrum sativum. L. = Coriandre cultivé.

Cuminum siminum. L. = Cumin officinal. an %10 Dracocephalum maldovica. L. = The maldovie. Erigeron graveolens. L. = Inula graveolens. H. P. = Solidago. Lam. = Vergerole odorante.

7 44 5

Lavandula (vide pag. 17.) Obs. Lavandula augustifolia. N. est L. vera. D C. Supp. fl. fr. Lepidium latifolium. L. = Grande passe-rage. Ligusticum levisticum. L. = Angelica paludapifolia. Lam. = Livéche. = Ache de montagne. Melissa hortensis. = M. officinalis. L. = Citronelle. = Melisse. Mentha cervina. L. = Pulegium cervinum. Mill. = Menthe cervine. Gentillis. L. = M. rubra. Sole. = M. pratensis? = Baume. = Menthe des jardins.
Piperita. L. = Menthe poivrée.
Sativa. L. = menthe cultivée. Nigelle sativa. L. = Nielle de Crète. = Toute-épice. Ocymum basilicum. L. = Basilic commun. (vide pag. 38.) au 10

Origanum creticum. Mill. = Origan de Crête. Majoranoides. Willd. = Marjolaine. Vulgare. L. = Origan commun. Pimpinella anisum L. = Anisum vulgare. Gart. = Anis. au %. Spilanthus oleracea. L. = Cresson de para.

Satureja hortensis. L. = Sariete des jardins. = Savourée. Sadrée.

Montana. L. = Thymus montanus. Dum. Cours = Sariette vivace. = S. de montagne. Scandix odorata. L. = Myrrhis odorata. Pers. = Cherophyllum.

Lam. = Cerfeuil musqué. = C. d'Espagne. = Myrhide.

odorante. Dum. Cours. = Fourgère musquée.

Nota: La Camomille; les Sauges; le Serpolet; le Romarin; le

Tym et autres plantes que j'ai indiquées ailleurs, devroient être comprises dans la série des plantes aromatiques,

PLANTES OLEIFÈRES.

ARACHIS hypogon. L. = Arachide. = Casachuate. = Pistache | Ricinus lividus L. = R. communis. Thunb. = an R. rutilans de terre. Brassica arvensis. = B. campestris: = Chou colga. Napus sylvestris. = Navet sauvage. = Navette. Myagrum sativum. L. = Cameline. Papaver somniferum. L. = Pavot oliette. = OEillette. Ricinus africanus. Mill. = R. Communis. Desf. = Ricin de Barbarie. * au °10

— Communis. L. = Ricin commun. = Palma - Christi. 2u °10 (1) - Inermis. Jacq. = Ricin inerme. *

H. P. = Ricin pourpre.

Viridis? Willd. = Ricin verdatre.

Sinapis alba. L. = Moutarde blanche. - Nigra. L. = Moutarde noire.

du Lin, du Sésame, du Chanvre, du Hêtre, des Noix, des Amandes, des Pignons, de l'Oliver, de l'Azcdarach, On obtient encore de l'huile par expression. du Laurier, etc.

5°. PLANTES TEXTILLES.



Æвситномени sesban L. = Sesbania ægyptiaca. Pers. == | Legard d'Egypte. vulg. * Agave americana. L. = Agavé d'Amérique. *
Asclepias syriaca. L. = Ouate de syrie.

— Fruticosa. L. = Asclépias d feuilles de saule. * Broussonetia papyrifera. l'Hérie. = Murier à papier de la Chine. (vide pag. 13.)
Cannabis sativa. L. = Chanvre cultivé. b. Gigantes. — Chanvre de Piemont. — C. gigantesque. Gossypium herbaceum. L. — Cotonnier herbacet. — C. de Malte. * Peruvianum. Cav. = Cotonnier d'Iviça. * - Religiosum? L. = G. tricuspidatum? Lam. = G. siamense.

Lasteyrie. = Cotonnier de Siam. b. Fulva. = Cotonnier nankin. *

Hibiseus mutabilis. L. = Ketmie changeante. * (vide pag. 16.)

Linum perenne. L. = Lin vivace. = Lin de Sibérie. = L. de Riga.

Linum usitatissimum. L. = Lin usuel. Lygeum spartum. L. = Sparte à feuilles de jonc. Phormium tenax. Forster. = Lin de la nouvelle Zélandel (vide pag. 36.) Stipa tenacissima. L. = Stipe sparte. Trachynotia cynosuroides. Mich. = Limnetis cynosuroides. Pers. = Dactylis. L. Urtica cannabina. L. - Ortie de Sibérie. Niscea, L. = Ortie cotonneuse. *

Nota: Le Tilleul; l'Orme; l'Eupatoire; plusieurs malvacées; le Genet d'Espagne ; l'Arundo de Barbarie et plusieurs autres gramines; le Bannanier; divers palmiers etc. produisant de la filasse peuvent être compris dans la série des plantes textilles.

PLANTES TEINTORIALES.

Reseda luteola. L. = Gaude.

Archus A tinctoria. L. = A. monspeliaca. G. Bauh. = Orchanette.

(teinture rouge.)

Berberis vulgaris. L. = Epine vinette. (t. jaune.)

Carthamus tinctorius. L. = Carthame officinal. = Graine de perroquet. = Saffran bâtard. (t. jaune.)

Crocus officinalis. L. = C. sativus. = Saffran cultivé. (t. jaune.)

Crocus officinalis. L. = Tournesol. (t. bleue.)

Evonymus europeus. L. = Fusain commun. (t. jaune.)

Genista tinctoria. L. = Genêt des teinturiers. (t. jaune.)

Indigofera anil. Lam. = Indigotier franc. (t. bleue.)

— Indica. Lam. = I. tinctoria. L. = Indigotier des Indes. (t. bleue.)

Iris germanica. L. = Iris d'Allemagne. (t. verte.)

Isatis tinctoria. L. = Pastel des teinturiers. = Guède. = Vouède. (t. bleue.)

— Lusitanica. L. = Pastel du Portugal. (t. bleue.)

Medicago sativa. L. = Luyerne cultivée. (t. bleue.)

Milleria contrayerva. Cav. = Flaveria peruvlana. Juss. = P. contrayerva. Pers. (t. jaune.)

Phytolacca decandra. L. = Raisin d'Amérique. (t. rouge.)

Rhamnus alaternus. L. — Nerprun alaterne. (t. verte.)
— Catharticus. L. — Nerprun commun. (t. verte.)
— Infectorius. L. — Graine d'Avignon. (t. jaune.)
Rhus cotinus. L. — Fustet. (t. jaune.)
— Coriaria. L. — Sumac des corroyeurs.
— Glabrum. L. — Sumac glabre.
— Typhinum. L. — Sumac de Virginie.
— Radicans. L. — Sumac de Virginie.
— Toxicodendrum. L. — Sumac poison.

Rubia tinctorum. L. — Garance cultivée. (t. rouge.)
Rota: Le troëne teint en pourpre; les racines de plusieurs rubiacées en rouge; l'Ephemère commune en jaune; la Baselle rouge en rouge; les fleurs de pieds d'alouette en bleu; le Pigamon jaune en jaune; les fleurs de millepertuis en jaune; l'Anthemis des teinsturiers en jaune; le Bleuet, la Violette, le Mûrter noir, les Galles de chêne, le Datisca etc.

pourroient aussi être employés pour teinture.

PLANTES A FOURRAGE.

Aira cespitosa. L. = Canche en gazoni
— Flexuosa. L. = Canche flexueuse.

Alopecurus pratensis. L. = Vulpin des près.

Anthoxanthum odoratum. L. = Flouve odorante. Avena elatior. L. = Avoine elevée. = Fromental. Astragalus galegiformis. L. = Astragale à feuilles de galega.

— Glyciphyllos. L. = Astragale reglissier Beta vulgaris campestris. = Betterave champêtre. = Racine de Disette. Brassica ol. arvensis. = B. campestris. = Chou colqu. Var. Chou à faucher. b. Procera. = B. vaccina. = Chou cavalier. = Chou à vaches. Var. Chou moëllier. Chou caulet de Flandre. c. Viridis. == Chou vert commun. - Fimbriata. == Grand chou vert frise du nord. Id. Rubra = Chou frise ronge du nord. Nota: Plusieurs varietés de choux indiquées dans la section des herbages légumiers peuvent aussi servir pour la nourriture des bestiaux. Bromus arvensis. L. = Brome des champs. - Mollis, L. = Brome doux. - Secalinus. L. = Brome seglin. Cichorium intybus. L. = Chicoree sauvage. Dactylis glomerata. L. Bromus glomeratus. Kal. Festuca glomerata. Vill. Dactyle pelotonó. Daucus carota. L. = Carotte à fourrage. Faba vulgaris equina. == Féverole. Festuca fluitans, L. = Poa fluitans. Kal, = Fétuque flottante. = Manne de Prusse. = Manne de Pologne. - Ovina. L. = Fétuque des moutons. = Coquiole. - Pratensis. L. = Fetuque des pres.

AGROSTIS stolonifera. L. = Fiorin.

Galega officinalis. L. = Galéga officinal. = Rue de chèvre. Hedysarum coronarium. L. = Suinfoin d'Espague. = Sulla. — Onobrychis. L. = O. sativa. Lam. = O. vicicefolia. Scop. O. vulgaris. Jaume Saint-Hill. = O. spicata. Manch. = Sainfoin cultive. = Bourgogne. = Esparcette. Helianthus tuberosus. L. = Topinambour. Holcus halepensis L. = Sorghum halepense. Schreb. = Houque d'alep. Lanatus. L. — Avena lanata. Willd. — Houque laineuse. — Mollis. L. — Avena mollis. Willd. — Houque molle. Hordeum pratense. Roth. = H. secalinum? Lam. = H. no-dosum. L. = Orge des près.

Lathyrus palustris. Willd. = Gesse des marais. Lolium perenne. L. = Ivraie vivace. = Ray - grass. = Gazon Anglais. - Multiflorum. Lam. = Ivraie annuelle. = Margail. Prov. Lotus corniculatus. L. = Lotier corniculé. - Rectus. L. = Lotier glomérulé. Lupinus albus. L. = Lupin blanc. Medicago sativa. L. = Luqerne cultivée.

— Lupulina. L. = Luqerne lupuline. = Trefle jaune. =

T. noir. = Minette. Melilotus officinalis. Lam. == Melilot commun. a. Alba. = Melilot de Sibérie. — Sulcata. Desf. = Trifolium Mauritanicum? Willd. Phalaris arundinacea. L. = Alpiste roseau. Phleum pratense. L. = Fléau. = Thymothy. Poterium sanguisorba. L. = Pimprenelle à fourrage.

Pisum arvense. L. = Pois gris. = Pisaille. = Pois de pigeon.

Plantago lanceolata. L. = Plantam des près.

Poa pratensis. L. = Paturin des près. Psoralea bituminosa. L. = Psoralee bitumineuse. = Trefle

bitumineux.

(46")

Raphanus sativus oblongus. — Grosse rave à fourrage. — Raifort des champs. — R. des bœufs. — Rave commune.

Spergula arvensis. L. — Spargeute des champs.

Sanguisorba officinalis. L. — Sanguisorbe officinale.

Tritolium incarnatum. Le — Trefle rouge de Roussillon. — Farouche.

— Pratense. L. — Trefle des près — Grand trefle rouge de Hollande. — Clave.
— repens. L. — T. album. — Trefle blanc. — Fin houssy.

Trigonella fœnum grœcum. L. — Fenugrec.

Vicia cracca. L. = Vesse multiflore.

Sativa. L. = Vesse cultivée.

Var.) grise.
b. Alba. blanche. = Lentille du Canada.
Nota: L'achillée, l'Avoine, l'Orge, le Scigle, l'Elymus, diverses centaurées, la Coronille variée, le Robinier, plusieurs Saules, l'Ajonc d'Europe, la Moutarde, la Pomme de terre, le Millet commun, le Panais, le Pastel etc. sont aussi d'usage pour fourrage.

PLANTES PROPRES A DIVERS ARTS ET USAGES.

Cochlearia glastifolia. L. = Choclearia à feuilles de pastel.
 Officinalis. L. = Cochlearia officinal. = Cranson. = Herbe aux cuillers.
 Dipsacus fullonum. L. = Cardère à foulon. = Chardon à bonnetier.
 Humulus lupulus. L. = Houblon cultivé.
 Nicotiana glutinosa. L: = Tabac glutineux.

– Paniculata. L. == Tabac paniculė,

Nicotiana tabacum. L. = Tabac de Virginie.
Rheum palmatum. L. = Rhubarbe palmée.
— Undulatum. L. = Rhubarbe ondulée.
Sinapis alba. L. = Moutarde blanche.
— Nigra. L. = Moutarde noire. = Sénevé.
Salsola sativa. L. = Soude cultivée.
— Soda. L. = Soude commune.

NOMS D'AUTEURS.

(Ait.) Aiton; (Adans.) Adanson; (And.) Andrews; (Bast.) Bastard; (Bauh:) Bauhin; (Le Berr.) Le Berryais; (Brouss.) Broussonet; (Brow.) R. Brown; (Calv.) Calvel; (C. de char.) Catalogue des Chartreux. (Chap.) Chantal; (Clus.) Clusius; (Comm.) Commerson; (Curt.) Curtis; (Cyrill.) Cyrillo; (Dalech.) Dalechamp; (DC.) de Candolle; (Desf.) Desfontaines;) Desv.) Desvaux; (Duch.) Duchesne; (Duf.) Dufrêne; (Duh.) Duhamel; (Duh. ed. nov.) Duhamel editio nova. = Nouveau Duhamel. (Dum Cours.) Dumont Courset; (Dun.) Dunal; (Erh.) Erhart; (F. B.) Frères Baumann; (Forsk.) Forskall; (Forst.) Forster; (Gart.) Gærtner; (Gard.) Garidel; (Glox.) Gloxin; (Gm.) Gmelin; (Gou.) Gouan; (Hall.) Haller; (Haw.) Haworth; (Hoff.) Hoffmann; (Hort. Angl.) Hortus anglicus; (Hort. Haff.) Hortus Haffiniensis; (Hort. Mass.) Hortus massiliensis; (Hort. Nois.) Hortus Noisette; (H. P.) Hortus Parisiensis. = Jardin des plantes de Paris. (Hor Tel.) Hortus Telonensis; (Hortul.) Hortuslni; (Humb. et Bonpl.) Humboldt et Bonpland; (Jacq. B.) Jacqueme Bonnefont; (Jacq.) Jacquin; (Journ. de Bot.) Journal de Botanique; (Juss.) de Jussieu; (La Bill.) La Billardière; (Labr.) Labrousse; (Lam.) de Lamarck; (Lapey.) Lapeyrouse; (PHérit.) l'Héritier; (Lin.) Linneus; (L. F.) Linneus filius; (Lois.) Loiseleur des longchamps. (Lour.) Loureiro; (Mal.) Malmaison; (Marsch.) Marschall-Bieberstein; (Mass.) Masson; (Mich.) Michaws; (Mill.) Miller; (Murr.) Murray; (Orteg.) Ortega; (Pall.) Pallas; (Parck.) Parckinson; (Pers.) Persoon; (Pharm.) Pharmacle; (Pluk:) Plukenet; (Poir.) Poiret; (Pom. Austr.) Pomona austriaca; (Red.) Redouté; (Rety.) Retzius; (Roz.) Rozier; (Rui; et Pav.) Ruiz et Pavon; (Salisb.) Salisbury; (Schl.) Schleicher; (Schreb.) Schreber; (Scop.) Scopoli; (S. Rox. Cle.) Dons Simon Roxas Clemente; (Spreng.) Sprengel; (de Suff.) de Suffren; (Sw.) Swartz; (T. obstg.) Sicklers teusche Obstgarner. (Thuill.) Thuillier; (Th.) Thunberg; (Tournef.) Tournefort; (Vent.) Ventenat; (Vill.) Villars; (Wang.)

Il est quelques graines de plantes que j'ai peu multipliées, mais il n'en est aucune dont je ne puisse étendre la culture en proportion des demandes qu'on pourrait m'en faire.

Pai soin d'élevèr en pot, pour mieux en assurer la réusite, toutes les plantes d'une reprise incertaine, tels que Pins, Sapinettes, Cèdres, et autres arbres toujours verts.

On ne sera pas étonné s'il existe une différence de prix entre les plantes du nord acclimatées et celles qui ne le sont pass

FIN,

3 2044 102 815 149

Digitized by Google

